Quiz 1
Fundamentos de Mecánica (1000019)

1. Suponga que tiene los vectores $\vec{A} = \hat{i} + 7\hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{B} = 3\hat{i} - 4\hat{j}$ y $\vec{C} = 2\hat{i} + 3\hat{k}$. Determine: $(\vec{A} \times \vec{B}) + \vec{C}$.
2. Un jugador de béisbol, después de ganar un partido, se quita la gorra y la lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 20 m/s. La gorra experimenta una desaceleración de 9,8 m/s^2.
   a) ¿Cuánto tiempo le toma a la gorra alcanzar su altura máxima?
   b) ¿Cuál es esa altura máxima?
   c) Si la gorra es atrapada a la misma altura desde la que fue lanzada, ¿cuál es su tiempo total de vuelo?

Quiz 1
Fundamentos de Mecánica (1000019)

1. Suponga que tiene los vectores $\vec{A} = \hat{i} + 7\hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{B} = 3\hat{i} - 4\hat{j}$ y $\vec{C} = 2\hat{i} + 3\hat{k}$. Determine: $(\vec{A} \times \vec{B}) + \vec{C}$.
2. Un jugador de béisbol, después de ganar un partido, se quita la gorra y la lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 20 m/s. La gorra experimenta una desaceleración de 9,8 m/s^2.
   a) ¿Cuánto tiempo le toma a la gorra alcanzar su altura máxima?
   b) ¿Cuál es esa altura máxima?
   c) Si la gorra es atrapada a la misma altura desde la que fue lanzada, ¿cuál es su tiempo total de vuelo?

Quiz 1
Fundamentos de Mecánica (1000019)

1. Suponga que tiene los vectores $\vec{A} = \hat{i} + 7\hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{B} = 3\hat{i} - 4\hat{j}$ y $\vec{C} = 2\hat{i} + 3\hat{k}$. Determine: $(\vec{A} \times \vec{B}) + \vec{C}$.
2. Un jugador de béisbol, después de ganar un partido, se quita la gorra y la lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 20 m/s. La gorra experimenta una desaceleración de 9,8 m/s^2.
   a) ¿Cuánto tiempo le toma a la gorra alcanzar su altura máxima?
   b) ¿Cuál es esa altura máxima?
   c) Si la gorra es atrapada a la misma altura desde la que fue lanzada, ¿cuál es su tiempo total de vuelo?