

1.3 Limite e continuidade

Limites

Resultados sobre limites

Limites laterais

Limites no infinito e limites infinitos

Continuidade

Descontinuidades

Resultados sobre continuidade pontual

Resultados sobre funções contínuas

Limite de uma função

Sejam $f: D \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função e $a \in D'$.

- [Limite] O número real ℓ é o limite segundo Cauchy de $f(x)$, quando x tende para a , e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

quando

$$\forall \delta > 0, \exists \varepsilon > 0 : (x \in D \wedge 0 < |x - a| < \varepsilon) \implies |f(x) - \ell| < \delta.$$

Observação

- ▶ $\forall \delta > 0, \exists \varepsilon > 0 : (x \in D \wedge 0 < |x - a| < \varepsilon) \implies |f(x) - \ell| < \delta$
ler-se-á, por exemplo, “dado um número positivo δ ,

arbitrariamente pequeno, existe um número real positivo ε , suficientemente pequeno, tal que, se $x \in D$, $x \neq a$ se a distância de x a a é menor do que ε , então a distância do correspondente $f(x)$ a ℓ é menor do que δ ”.

- ▶ A definição de limite apresentada permite calcular $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ com $a \in D' \setminus D$, ou seja, o ponto a pode não pertencer ao domínio de f .
- ▶ Caso $a \in D \cap D'$, o $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ não tem de ser $f(a)$; o valor que f toma em a é irrelevante no cálculo do limite, já que só são considerados pontos do domínio de f próximos de a mas diferentes de a .

Resultados sobre limites

Teorema (Unicidade do limite)

Sejam $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in D'$. Se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell_1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell_2 \quad \text{então} \quad \ell_1 = \ell_2.$$

Teorema

Seja $a \in \mathbb{R}$.

- ▶ Se k é uma constante então $\lim_{x \rightarrow a} k = k$;
- ▶ $\lim_{x \rightarrow a} x = a$.

Teorema

Sejam $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in D'$. Se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ e f é limitada em $D \setminus \{a\}$ então

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = 0.$$

Teorema (Enquadramento)

Sejam $f, g, h: D \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in D'$ tais que

$$h(x) \leq f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in D \setminus \{a\}.$$

Se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$ então também

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Teorema (Aritmética dos limites)

Sejam $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D'$. Suponha-se que existem

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \text{e} \quad m = \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

Então:

- ▶ $\lim_{x \rightarrow a} (f \pm g)(x) = \ell \pm m;$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \ell m;$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g}(x) = \frac{\ell}{m}, \quad \text{desde que } m \neq 0.$

Limites laterais

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$.

- ▶ Seja $a \in D'_+$. O número real ℓ diz-se o **limite lateral à direita** de $f(x)$ quando x tende para a (por valores superiores a a) e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell$$

quando

$$\forall \delta > 0, \exists \varepsilon > 0 : (x \in D \wedge 0 < x - a < \varepsilon) \implies |f(x) - \ell| < \delta$$

- ▶ Seja $a \in D'_-$. O número real ℓ diz-se o **limite lateral à esquerda** de $f(x)$ quando x tende para a (por valores inferiores a a) e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$$

quando

$$\forall \delta > 0, \exists \varepsilon > 0 : (x \in D \wedge -\varepsilon < x - a < 0) \implies |f(x) - \ell| < \delta$$

Teorema

Sejam $f: D \longrightarrow \mathbb{R}$ e $a \in (D'_- \cap D'_+)$. Então

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

se e só se existem e são iguais a ℓ os correspondentes limites laterais, isto é,

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff \left(\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell \right)$$

- Para os limites laterais valem, com as devidas adaptações, os resultados anteriores sobre o limite.

Exemplo

1. Não existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$.

De facto, os limites laterais são diferentes pois

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

pelo que o limite proposto não existe.

Observação

- São exemplos de casos em que não existe

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ onde

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ é racional;} \\ 0, & x \text{ é irracional} \end{cases} \quad \text{e } a \in \mathbb{R}.$$

Limites no infinito e limites infinitos

Seja $f: D \longrightarrow \mathbb{R}$.

- O que acontece se D for ilimitado, à direita ou à esquerda, e se fizer $x \in D$ tender para $+\infty$ ou $-\infty$?
Qual o significado de

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell?$$

- Dado $a \in D'$, qual o significado de

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty?$$

► [Limites no infinito] Seja $f: D \longrightarrow \mathbb{R}$. Se D é um conjunto não majorado, diz-se que:

- $f(x)$ tende para ℓ quando x tende para $+\infty$, e escreve-se

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} f(x) = \ell,$$

quando

$$\forall \delta > 0, \exists A > 0 : (x \in D \wedge x > A) \implies |f(x) - \ell| < \delta$$

- $f(x)$ tende para ℓ quando x tende para $-\infty$, e escreve-se

$$\lim_{x \longrightarrow -\infty} f(x) = \ell,$$

quando

$$\forall \delta > 0, \exists A > 0 : (x \in D \wedge x < -A) \implies |f(x) - \ell| < \delta$$

► [Limites infinitos] Sejam $f: D \longrightarrow \mathbb{R}$ e $a \in D'$. Diz-se que:

- $f(x)$ tende para $+\infty$ quando x tende para a e escreve-se

$$\lim_{x \longrightarrow a} f(x) = +\infty$$

quando

$$\forall A > 0, \exists \varepsilon > 0 : (x \in D \wedge 0 < |x - a| < \varepsilon) \implies f(x) > A$$

- $f(x)$ tende para $-\infty$ quando x tende para a , e escreve-se

$$\lim_{x \longrightarrow a} f(x) = -\infty$$

quando

$$\forall A > 0, \exists \varepsilon > 0 : (x \in D \wedge 0 < |x - a| < \varepsilon) \implies f(x) < -A$$

► [Indeterminações] Se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty,$$

o que se pode dizer sobre o limite

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]?$$

- Diz-se que $+\infty + (-\infty)$ é uma indeterminação.
- Outras indeterminações são:

$$0 \cdot \infty, \frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, 1^\infty, 0^0, \infty^0.$$

Continuidade

► [Função contínua] Seja $f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $a \in D$.

A função f é **contínua em** $a \in D$ quando

- ★ a é ponto isolado de D
ou
- ★ $a \in D'$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.


► A função f é **contínua à direita em** $a \in D$ quando $a \in D'_+$ e $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

► A função f é **contínua à esquerda em** $a \in D$ quando $a \in D'_-$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$.


Exemplo

1. As funções a seguir são contínuas.


$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$



$$\begin{array}{ccc} g : [0, 2] \cup]4, 6] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$



2. [Função característica] A função $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = \max\{z \in \mathbb{Z} : z \leq x\}$ e denotada por $[x]$



- A função é contínua em $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.
- Para cada inteiro $z \in \mathbb{Z}$, a função é contínua à direita e descontínua à esquerda.

► Diz-se que:

- $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ é **contínua em a** quando $f(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$;
- $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ é **contínua em b** quando $f(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$;
- $f: D \longrightarrow \mathbb{R}$ é **contínua em D** quando f é contínua em todo $x \in D$.

Descontinuidades

Seja $f: D \longrightarrow \mathbb{R}$.

- Diz-se que **$a \in D$ é um ponto de descontinuidade de f** , ou que f possui uma descontinuidade no ponto $a \in D$, quando se verificar uma das duas condições seguintes:
- $a \in D'$ e não existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$;
 - $a \in D'$ existe $\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\ell \neq f(a)$.

Destacam-se dois tipos particulares de descontinuidade:

- **descontinuidade removível**, quando

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \quad \wedge \quad \ell \neq f(a);$$


- **descontinuidade de essencial**, quando não existe limite. Em particular, diz-se que uma descontinuidade essencial é de **salto** quando

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell_1 \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell_2 \quad \wedge \quad \ell_1 \neq \ell_2.$$

Exemplo: descontinuidades


Descontinuidade de salto na origem

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$$




Descontinuidade removível na origem

$$g(x) = \begin{cases} 2, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$



Descontinuidade na origem que nem é de salto nem removível

$$h(x) = \begin{cases} |x|, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ -1, & x \in \mathbb{Q} \end{cases}$$



Resultados sobre continuidade pontual

► [Aritmética das funções contínuas]

Sejam $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções contínuas em $a \in D$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ uma constante. Então as funções

- $f + g$, αf e fg são contínuas em a ;
- $\frac{f}{g}$ é contínua em a desde que $g(a) \neq 0$.

► [Continuidade da função composta]

Sejam $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ tais que $f(D) \subset B$.

Se f é contínua em $a \in D$ e g é contínua em $b = f(a)$, então $g \circ f$ é contínua em a .

► [Continuidade da função inversa]

Se I e J são intervalos reais e $f : I \rightarrow J$ é uma função bijetiva e contínua, então f^{-1} existe e é contínua.

Exemplo

Aqui $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Composição de duas funções contínuas: $g \circ f$ é contínua:

$$f(x) = 2x, \quad g(x) = x^3 \quad \text{e} \quad (g \circ f)(x) = 8x^3, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

2. Composição de uma função contínua, f , e uma função **descontínua**, g : $g \circ f$ contínua:

$$f(x) = 2, \quad g(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 5 \\ 0, & x = 5 \end{cases} \quad \text{e} \quad (g \circ f)(x) = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

3. Composição de uma função **descontínua**, f , e uma função contínua, g :: $g \circ f$ contínua:

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq 0 \\ -2, & x > 0 \end{cases}, \quad g(x) = 5 \quad \text{e} \quad (g \circ f)(x) = 5, \forall x \in \mathbb{R}.$$

4. Composição de duas funções **descontínuas**:: $g \circ f$ contínua:

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq 0 \\ -2, & x > 0 \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 5 \\ 0, & x = 5 \end{cases}$$

e

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \begin{cases} 1, & f(x) \neq 5 \\ 0, & f(x) = 5 \end{cases} = 1, \text{ pois } f(x) \neq 5 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Exemplo



1. Haverá contradição com o teorema da continuidade da função inversa?

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & 0 \leq x < 1 \\ x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

f é contínua

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} x - 1, & 1 \leq x < 2 \\ x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

f^{-1} é descontínua



Resultados sobre funções contínuas

Teorema (de Cantor)

Seja $f: D \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Se D é fechado e limitado então $f(D)$ é fechado e limitado.

Teorema (de Weierstrass)

Se $f: D \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ é contínua e D é fechado e limitado então f é limitada e atinge os seus extremos em D , isto é,

$$\exists a, b \in D : f(a) \leq f(x) \leq f(b), \quad \forall x \in D$$

Teorema (de Bolzano)

Seja $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Então $f([a, b])$ contém o intervalo fechado de extremos $f(a)$ e $f(b)$.

Corolário

Seja $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Então

$$\exists c \in]a, b[: f(c) = 0$$