

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
ANÁLISE MATEMÁTICA II – 2022/23

EER, EGI, EI, EM, FQ, M, MAEG

3.^a Frequência

20/05/2023

Observação: Justifique cuidadosamente todos os passos que efectuar nas resoluções.

1) Sejam $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e S a região definida por

$$\left\{ \begin{array}{l} (\rho, \theta, z) \\ x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{array} \right. \quad \text{Então,} \quad S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 4 \wedge 0 \leq z \leq x^2 + y^2\}.$$

$\rho \cos \theta + \rho \sin \theta = \rho^2 (\cos \theta + \sin \theta) =$

\swarrow
 $0 \leq z \leq 2$

$$\iiint_S f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \, \rho \, dz \, d\theta \, d\rho,$$

onde (ρ, θ, z) são as coordenadas cilíndricas.

2) Sejam $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e M a região definida por

$$\left\{ \begin{array}{l} (r, \theta, \varphi) \\ x = r \cos \theta \sin \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \varphi \end{array} \right. \quad \text{Então,} \quad M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \geq 4 \wedge x^2 + y^2 + z^2 \leq 9 \wedge y \geq 0\}.$$

$$\iiint_M f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(r \cos \theta \sin \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \varphi) \, r^2 \sin \varphi \, dr \, d\phi \, d\theta,$$

onde (r, θ, ϕ) são as coordenadas esféricas.

3) Considere o triângulo \mathcal{C} de vértices $(0, 0)$, $(0, 4)$ e $(2, 0)$.

a) Calcule, usando integrais de linha, o comprimento de \mathcal{C} .

b) Calcule, usando integrais de linha, o trabalho realizado por $\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (1 + xy, x - y)$ ao longo do triângulo \mathcal{C} , orientado no sentido indirecto.


c) Pode aplicar-se o Teorema de Green para determinar o trabalho realizado por \mathbf{F} ao longo do triângulo \mathcal{C} ? Em caso de resposta afirmativa, confirme o resultado obtido na alínea b).

3. a) Setze (1) $\varphi(t) = (0, t)$, $t \in [0, 4]$

(2) $\psi(t) = (t, 4-2t)$, $t \in [0, 2]$

(3) $\beta(t) = (t, 0)$, $t \in [0, 2]$

$$\int_C f ds = \int_{C_1} f ds + \int_0^4 \|\varphi'(t)\| ds +$$



b) $w_1 = \int_C f | ds = \int_a^b f(\varphi(t)) | \varphi'(t) | dt =$

$$= \int_0^4 (1, -t) | (0, 1) | dt = \int_0^4 -t dt =$$

$$= \left[-\frac{t^2}{2} \right]_0^4 = -\frac{4^2}{2} = -8$$

$$w_2 = \int_a^b f(\psi(t)) | \psi'(t) | dt =$$

$$= \int_0^2 (1+t, 4-2t) | (1, -2) | dt =$$

$$= \int_0^2 (1+2t, -4+3t) | (1, -2) | dt =$$

$$= \int_0^2 (1+2t, 8-6t) dt = \dots$$

$$w_3 = \dots$$

c) $4/3$

4) Considere o campo vectorial definido por $\mathbf{F}(x, y) = (e^{3y} + y \operatorname{sen} x, 3xe^{3y} - \cos x)$ e \mathcal{C} a curva definida por $\mathcal{C} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 9 \wedge y \geq 0\}$ e orientada no sentido directo.

a) Mostre que F é conservativo e determine uma função potencial de F .

b) Calcule, usando o Teorema fundamental dos integrais de linha, o integral $\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} |ds|$.

c) Diga, justificando, se a afirmação seguinte é verdadeira ou falsa: “Existem curvas $\tilde{\mathcal{C}}$ para as quais o integral $\int_{\tilde{\mathcal{C}}} \mathbf{F} |ds| = 0$ ”.

5) Considere a função $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y, z) = 1 + x^2 + y^2$ e seja \mathcal{S} uma superfície parametrizada por $\phi : [0, 1] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\phi(u, v) = (u \cos v, u \operatorname{sen} v, u)$.

Então,

$$\begin{aligned} \iint_{\mathcal{S}} f dS &= \int_{\dots\dots\dots} \int_{\dots\dots\dots} \dots\dots\dots \|(\dots\dots\dots, \dots\dots\dots, \dots\dots\dots)\| \, dudv = \\ &= \int_{\dots\dots\dots} \int_{\dots\dots\dots} \dots\dots\dots (\dots\dots\dots) \, dudv = \dots\dots\dots \end{aligned}$$