

Modelo Babesia bigemina

Miguel Angel Rodriguez Feregrino

19 de septiembre de 2026

1. Primer modelo

Este modelo se planteo unicamente con datos bibliograficos. El objetivo de este primer modelo es representar la dinamica celular existente en **una infeccion experimental *in vitro* de *Babesia bigemina***. La primer aproximacion por tanto es:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dB}{dt} = -\beta BE - \mu_B B + \rho(\mu_I I) \\ \frac{dE}{dt} = -\beta BE - \mu_E E \\ \frac{dI}{dt} = \beta BE - \mu_I I \end{array} \right. \quad (1)$$

Donde se describe la dinamica entre las poblaciones de Babesias infecciosas libres (B), eritrocitos sanos en circulacion (E) y eritrocitos infectados (I).

Las reacciones por tanto se pueden describir como:

- **Reaccion 1:** Infeccion de eritrocitos sanos, accion de la interaccion con babesias infectivas. βBE .
- **Reaccion 2:** Muerte natural de babesias infectivas en circulacion. $\mu_B B$.
- **Reaccion 3:** Muerte natural de eritrocitos sanos. $\mu_E E$.
- **Reaccion 4:** Muerte de eritrocitos infectados.. $\mu_I I$.
- **Reaccion 5:** Liberacion de babesias infectivas al ambiente resultado de la muerte de eritrocitos infectados. $\rho(\mu_I I)$.

Se trabaja bajo varios supuestos.

Para empezar consideramos que no hay tasas de introduccion al sistema de eritrocitos sanos, eritrocitos infectados o de babesias infectivas libres como terminos que afectan la interaccion. En un cultivo celular estos elementos son introducidos a lo largo de intervalos de tiempos definidos, por lo

que se considera que esta perturbacion en las poblaciones del sistema esta dada por cambios en condiciones iniciales.

La tasa de infeccion es constante a lo largo de la infeccion.

La tasa de muerte de los eritrocitos infectados es constante y lleva a la liberacion de la misma cantidad de babesias infectivas.

No hay factores externos que alteran la dinamica infectiva.

Las fases asexuales que estan involucradas en el cultivo celular (merozoitos, trofozoitos y en pequenas proporciones gametocitos y esporozoitos) son consideradas como "babesias infectivas", por lo que la tasa de infeccion, muerte y proporcion liberada es un promedio de estas poblaciones.