

Diskretna matematika - Zadatak 1

Grupa 10

Oktober 2024

1 Uvod

Skup je neuredjena kolekcija unikatnih objekata, odnosno elemenata. Pisemo $a \in A$ da pokazemo da je a element skupa A . Notacijom $a \notin A$ prikazujemo da a nije element skupa A .

Cesto se skupovi obeležavaju velikim latinicnim slovima, gde se malim slovima obeležavaju elementi nekog skupa.

2 Kardinalnost

2.1 Definicija

Prazan skup je konačan skup kardinalnosti 0. Ako postoji jedan na jedan korespondencija između skupa A i skupa $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, tada je A konačan skup kardinalnosti n .

2.2 Primer

Skup $\{a, p, r, x, z\}$ ima kardinalnost 5 pošto postoji jedan na jedan korespondencija $\phi: \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{a, p, r, x, z\}$ definisana sa $\phi(1) = a$, $\phi(2) = p$, $\phi(3) = r$, $\phi(4) = x$, $\phi(5) = z$.

2.3 Definicija

Skup A je prebrojivo beskonačan ako postoji jedan na jedan korespondencija između skupa A i skupa pozitivnih celih brojeva $\{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$. Skup je prebrojiv ako je konačan ili prebrojivo beskonačan.

2.4 Teorema

- (a) Neka su A i B disjunktne konačne skupovi. Tada je skup $A \cup B$ konačan. Ako skup A ima kardinalnost n , i skup B ima kardinalnost m , tada skup $A \cup B$ ima kardinalnost $m + n$.

- (b) Neka su A i B disjunktni, prebrojivo beskonačni skupovi. Tada je skup $A \cup B$ prebrojivo beskonačan.
- (c) Neka su A i B disjunktni, prebrojivi skupovi. Tada je skup $A \cup B$ prebrojiv.

2.5 Dokaz

- (a) Pošto su A i B konačni skupovi, postoje jedan na jedan korespondencije $\phi_1 : \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow A$ i $\phi_2 : \{1, 2, 3, \dots, m\} \rightarrow B$ za cele brojeve n i m . Definišemo korespondenciju $\phi : \{1, 2, 3, \dots, m+n\} \rightarrow A \cup B$ sa $\phi(k) = \phi_1(k)$ za $1 \leq k \leq n$ i $\phi(n+i) = \phi_2(i)$ za $1 \leq i \leq m$. Funkcija ϕ predstavlja jedan na jedan korespondenciju između skupa $\{1, 2, 3, \dots, m+n\}$ i skupa $A \cup B$.
- (b) Pošto su skupovi A i B prebrojivo beskonačni, postoje jedan na jedan korespondencije $\phi_1 : \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\} \rightarrow A$ i $\phi_2 : \{1, 2, 3, \dots, m, \dots\} \rightarrow B$. Definišemo korespondenciju $\phi : \{1, 2, 3, \dots\} \rightarrow A \cup B$ sa $\phi(n) = \phi_1((n+1)/2)$, ako je n neparan broj, i $\phi(n) = \phi_2(n/2)$, ako je n paran broj. Funkcija ϕ predstavlja jedan na jedan korespondenciju između skupa $\{1, 2, 3, \dots\}$ i skupa $A \cup B$.
- (c) Neka su A i B disjunktni, prebrojivi skupovi. Tada je jedini slučaj koji nije pokriven stavovima (a) i (b), onaj u kome je ili skup A ili skup B konačan, dok je drugi prebrojivo beskonačan. Pretpostavimo da je skup A konačan. Tada postoji jedan na jedan korespondencija $\phi_1 : \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow A$, i pošto je skup B beskonačno prebrojiv, postoji funkcija $\phi_2 : \{1, 2, 3, \dots, m, \dots\} \rightarrow B$. Definišemo funkciju $\phi : \{1, 2, 3, \dots\} \rightarrow A \cup B$ sa $\phi(k) = \phi_1(k)$ za $1 \leq k \leq n$ i $\phi(k) = \phi_2(k-n)$ za $k > n$. Funkcija ϕ predstavlja jedan na jedan korespondenciju između skupa $\{1, 2, 3, \dots\}$ i skupa $A \cup B$.

3 Prebrojavanja

Recimo da je S skup. Ako ima tačno n različitih elemenata u S gde je n nenegativan ceo broj, onda kažemo da je S **konačan** skup i da je broj n kardinalnost skupa S . Kardinalnost skupa S bi se u ovom primeru obeležavalo kao $|S|$

Primer 1

Ako je $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ onda je $|A| = 5$

Def. 1 Za konacne skupove A i B kažemo da imaju istu kardinalnost ako i samo ako postoji bijekcija $f : A \rightarrow B$. Kada A i B imaju istu kardinalnost to zapisujemo kao $|A| = |B|$

Za beskonacne skupove definicija kardinalnosti se ogleda u relativnoj razlici velicine dva skupa, umesto da se gleda tacna velicina jednog odredjenog skupa.

Takodje mozemo definisati sta znaci kada jedan skup ima manju kardinalnost od drugog skupa.

Def. 2 Ako $f : A \rightarrow B$ predstavlja injektivno preslikavanje, kardinalnost A je manja ili iste kardinalnosti kao B i pisemo $|A| \leq |B|$.

Postoje dve vrste beskonacnih skupova, takvi da im je kardinalnost ista kao i kardinalnost skupa prirodnih brojeva i takvi koji su razlicite kardinalnosti

Def. 3 Skup takav da je konacan ili ima istu kardinalnost kao skup pozitivnih celih brojeva se naziva **prebrojivim**. Skup koji nije prebrojiv je neprebrojiv. Kada je beskonacan skup S prebrojiv, tada mu kardinalnost oznacavamo kao \aleph_0 (Alef nula). Skup $|S| = \aleph_0$ ima kardinalnost "alef nula".

Primer 2

Pokazacemo da je skup svih neparnih celih brojeva prebrojiv.
Posmatrajmo funkciju $f : N \rightarrow Z^+$:

$$f(n) = 2n - 1$$

Moramo dokazati da je funkcija bijektivna.

Dokaz. Da dokazemo da je funkcija f injektivna pretpostavimo da je $f(n) = f(m)$. Onda je $2n - 1 = 2m - 1$, odnosno $n = m$. Da bismo dokazali da je surjektivna pretpostavimo da je t neparan pozitivan ceo broj. Onda je t za 1 manji od parnog intedzera $2k$, gde je k prirodan broj. Time je $t = 2k - 1 = f(k)$.

Drugim recima, beskonacan skup je brojiv ako i samo ako je moguće navesti elemente skupa kao neki niz gde su indeksi prirodni brojevi. Razlog ovoga je cinjenica da se funkcija $f : N \rightarrow S$ moze izraziti kao niz a_1, a_2, \dots, a_n gde su $a_1 = f(1), a_2 = f(2), \dots, a_n = f(n), \dots$

4 Princip proizvoda

Pretpostavimo da je dat niz događaja:

$$E_1, E_2, E_3, \dots, E_m,$$

gde se događaj E_1 može odigrati na n_1 načina, i da se, ako su se događaji $E_1, E_2, E_3, \dots, E_{k-1}$ odigrali, događaj E_k može odigrati na n_k načina, za $1 \leq k \leq m$.

Tada postoji tačno

$$n_1 \times n_2 \times n_3 \times \dots \times n_m$$

načina na koji se ceo niz događaja može odigrati.

4.1 Primer 1

Koliko ima funkcija "jedan na jedan" sa domenom u skupu S koji ima n elemenata i kodomenom u skupu P koji ima m elemenata?

Ako je $n > m$, tada nema funkcija jedan na jedan, pa pretpostavimo da važi $n \leq m$. Takođe, pretpostavimo da su elementi domena obeleženi sa $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$.

Ima m mogućnosti za preslikavanje elementa a_1 . Kada se odredi slika elementa a_1 , ima još $m - 1$ mogućnosti za preslikavanje elementa a_2 , budući da se on ne može preslikati u isti element kao a_1 . Prema tome, ima $m - 2$ načina za preslikavanje elementa a_3 , $m - 3$ načina za preslikavanje elementa a_4 , i tako dalje.

Iz ove pravilnosti, vidi se da ima $m - i + 1$ načina za preslikavanje elementa a_i . Stoga, prema pravilu proizvoda, ima

$$m \times (m - 1) \times (m - 2) \times \dots \times (m - n + 1)$$

načina za preslikavanje svih elemenata skupa S u elemente skupa P , pri čemu se nijedna dva elementa skupa S ne preslikavaju u isti element skupa P . Dakle, ima tačno

$$m \times (m - 1) \times (m - 2) \times \dots \times (m - n + 1)$$

funkcija jedan na jedan iz skupa S na skup P .

4.2 Primer 2

Niska bitova je niz simbola od kojih svi mogu imati vrednosti 1 ili 0. Koliko ima niski bitova dužine 5? Koliko ima niski bitova dužine k ?

Budući da svaki simbol mora biti ili 1 ili 0, za svaki simbol u niski postoje dva izbora. Prema tome, ima

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$$

niski dužine 5. Po istom principu, postoji 2^k niski bitova dužine k .

5 Princip zbira

Neka su $S_1, S_2, S_3, \dots, S_m$ disjunktni skupovi (tj. $S_i \cap S_j = \emptyset$ za svako $i \neq j$), i neka svaki S_i sadrži n_i elemenata. Broj elemenata koji se mogu izabrati iz S_1 ili S_2 ili S_3 ili ... ili S_m jednak je $n_1 + n_2 + \dots + n_m$.

Teorija skupova:

$$|S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots \cup S_m| = |S_1| + |S_2| + |S_3| + \dots + |S_m|$$

gde je $|S|$ broj elemenata u skupu S .

5.1 Primer 1

Koliko ima celih brojeva između 0 i 1000 koji na samo jednoj poziciji imaju cifru 6?

Neka je skup S skup celih brojeva između 0 i 1000 sa svojstvom da im je cifra 6 samo na jednoj poziciji. Neka je S_1 podskup skupa S , pri čemu S_1 sadrži samo jednocifrene brojeve čija je cifra 6; neka je S_2 podskup skupa S , koji sadrži samo dvocifrene brojeve, i neka je S_3 podskup skupa S , koji sadrži samo trocifrene brojeve sa ovim svojstvom.

Skup S_1 ima samo jedan element i to je broj 6.

U skupu S_2 , svaki broj čija je samo jedna cifra 6 ili ima 6 kao prvu cifru, ili kao drugu cifru. Ako je druga cifra 6, ima 8 mogućnosti (jer prva cifra ne može biti 0 ili 6). Ako je prva cifra 6, ima 9 mogućnosti za drugu cifru. Prema tome, S_2 ima $8 + 9 = 17$ elemenata.

Element skupa S_3 ima cifru 6 na prvoj, drugoj ili trećoj poziciji. Ako je 6 prva cifra, ima 9 mogućnosti za drugu cifru i 9 mogućnosti za treću cifru, što daje $9 \times 9 = 81$ broj. Ako je 6 druga cifra, ima 9 mogućnosti za treću cifru i 8 mogućnosti za prvu cifru, što daje $9 \times 8 = 72$ broja. Slično, u S_3 postoji 72 broja kod kojih je 6 treća cifra.

Dakle, S_3 ukupno ima $81 + 72 + 72 = 225$ elemenata.

Kako važi da je $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$, to znači da skup S ima ukupno $1 + 17 + 225 = 243$ elemenata.

6 Princip uključenja - isključenja

Do ovog trenutka smo, prilikom primene pravila zbira, nailazili samo na disjunktne skupove. Pretpostavimo da skupovi S i T nisu disjunkt i želimo da nađemo $|S \cup T|$. Kada broj elemenata skupa S saberemo sa brojem elemenata u skupu T , dva puta računamo elemente koji su u $S \cap T$. Stoga moramo oduzeti broj elemenata skupa $S \cap T$. Iz ovoga proizlazi sledeća teorema.

6.1 Teorema

Neka su S i T skupovi. Broj elemenata koji se mogu izabrati iz S ili T jednak je:

$$|S \cup T| = |S| + |T| - |S \cap T|.$$

Drugim rečima,

$$|S \cup T| = |S| + |T| - |S \cap T|.$$

6.2 Dokaz

Skup $S \cup T$ može se zapisati kao:

$$S \cup T = (S - T) \cup (T - S) \cup (S \cap T),$$

gde su $S - T$, $T - S$, i $S \cap T$ u parovima disjunktne. Prema tome, važi:

$$|S \cup T| = |S - T| + |T - S| + |S \cap T|.$$

Takođe, imamo da je $S = (S - T) \cup (S \cap T)$ i $T = (T - S) \cup (S \cap T)$, pa je:

$$|S| = |S - T| + |S \cap T|$$

i

$$|T| = |T - S| + |S \cap T|.$$

Prema tome,

$$|S| + |T| = |S - T| + |S \cap T| + |T - S| + |S \cap T| = |S - T| + |T - S| + 2|S \cap T|.$$

Oduzimanjem $|S \cap T|$ dobijamo:

$$|S \cup T| = |S| + |T| - |S \cap T|.$$

6.3 Primer

Koliko ima načina da se celi brojevi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poredaju tako da je prvi broj veći od 1, a poslednji manji od 7?

Neka je U skup svih mogućih rasporeda ovih cifara, a neka je S skup svih rasporeda pomenutih celih brojeva za koje važi da je prvi broj veći od 1, a poslednji broj manji od 7. Da bi se utvrdio $|U|$, uočavamo da postoji deset načina da izaberemo prvi broj, devet načina da izaberemo drugi broj, osam načina da izaberemo treći broj, itd., dok za deveti broj imamo dva načina, a za deseti jedan način. Prema tome, primenom pravila proizvoda, ima $10! = 3628800$ načina da se izabere mogući raspored celih brojeva, te je $|U| = 3628800$.

Kao i u prvom primeru, za prebrojavanje skupa S koristimo "zaobilazni put", tako što ćemo pronaći broj rasporeda celih brojeva koji nisu u S i taj broj ćemo oduzeti od $|U|$. Neka je A skup svih rasporeda kojima je prvi broj manji ili jednak 1. Brojanjem elemenata u A , nalazimo da za prvi broj ima dva izbora, konkretno 0 i 1. Za drugi broj ima devet mogućnosti, za treći osam, i tako dalje, dok za deveti broj postoje dva izbora, a za deseti jedan. Odnosno, A ima $2 \times 9! = 725760$ elemenata.

Neka je B skup svih rasporeda kojima je poslednji broj veći ili jednak sa 7. Prebrojavajući elemente u B , nalazimo da za poslednji broj ima tri mogućnosti. Koristeći isti postupak kao i za A , otkrivamo da ima $9!$ načina da se izaberu ostali brojevi. Konačno, $|B| = 3 \times 9! = 1088640$.

Skup $A \cap B$ sastoji se od svih rasporeda celih brojeva kojima je prva cifra manja ili jednaka 1, a druga veća ili jednaka 7. Prebrojavanjem elemenata u $A \cap B$, nalazimo da postoje dve mogućnosti za prvu cifru i tri mogućnosti za poslednju cifru. Koristeći raniji postupak, dobijamo da se ostalih osam cifara može izabrati na $8!$ načina.

$$|A \cap B| = 3 \times 2 \times 8! = 241920$$

$$|A \cup B| = 725760 + 1088640 - 241920 = 1572480.$$

Skup rasporeda brojeva u kojima je prvi broj veći od 1, a poslednji broj manji od 7 predstavlja skup $(A \cup B)'$, a takvih rasporeda ima:

$$|U| - |(A \cup B)| = 3628800 - 1572480 = 2056320.$$

7 Dirihleov princip

Pretpostavićemo da je jato golubova doletjelo u golubarnik. U originalnoj verziji Dirihleov princip kaže da ako ima više golubova nego kućica u golubarniku, tada će se bar u jednoj kućici naći bar dva goluba.

7.1 Teorema

Ako je $n + 1$ ili više objekata smješteno u n kutija, tada se bar u jednoj kutiji nalaze bar dva objekta.

7.2 Dokaz

Pretpostavimo da svaka kutija sadrži najviše jedan objekat. Tada je ukupan broj objekata najviše n , što je u suprotnosti sa pretpostavkom da ima bar $n + 1$ objekata.

7.3 Primer

Nekoliko direktnih primjera Dirikleovog principa:

- (a) U svakom skupu od 13 ili više osoba, postoje bar dvije koje su rođene istog mjeseca.
- (b) U svakom skupu od 367 ili više osoba, postoje bar dvije koje su rođene istog datuma.
- (c) U svakom skupu od milion osoba, postoje bar dvije koje imaju isti broj dlaka na glavi.

7.4 Teorema

Uopšteni Dirihleov princip. Ako je m objekata smješteno u n kutija i $m > n * r$, tada se bar u jednoj kutiji nalazi bar $r + 1$ objekat.

7.5 Primer

- (a) Koliko najmanje karata treba izvući iz standardnog špila sa 52 karte da bi se među izvučenim kartama sigurno nalazile četiri sa istim znakom?
 - (b) Koliko najmanje karata treba izvući da bi se našle bar tri sa znakom srca?
 - (c) Dokazati da u svakom skupu od šest osoba postoje tri osobe tako da se one uzajamno poznaju ili se uzajamno ne poznaju.
- (a) Možemo da pretpostavimo da postoje četiri kutije i, kako se karte izvlače, tako se stavljaju u kutiju rezervisanu za odgovarajući znak. Iz opšteg Dirihleovog principa, vidi se da je dovoljno izvući bar $13 (= 4 \times 3 + 1)$ karata da bi bile izvučene bar tri istog znaka. Ovo je i najmanji traženi broj, jer je moguće da se među 12 izvučenih karata nađu po tri karte od svakog znaka.
- (b) U ovom slučaju se koristi uopšteni Dirihleov princip, jer želimo da se uvjerimo da postoje tri karte određenog znaka, a ne tri karte nekog znaka! U najgorem slučaju moguće je izvući sve pikove, sve trefove i sve karoe, što čini 39 karata, prije nego što se izvuče makar i jedno srce. Sledeće tri karte će da imaju znak srca, pa onda $39 + 3 = 42$ najmanji broj karata koje treba izvući da bi se došlo do tri srca.
- (c) Neka je a proizvoljna osoba iz nekog skupa i smjestimo preostalih pet osoba u dvije prostorije: prva prostorija sadrži osobe koje poznaju a , a druga prostorija sadrži osobe koje ne poznaju a . Pošto je $5 > 2 \times 2$, jedna od ovih prostorija sadrži bar tri osobe. Možemo da pretpostavimo da 1. prostorija sadrži osobe b, c i d (a možda i još neke). Ako se bilo koje dvije od osoba b, c i d poznaju, recimo b i c , tada je a, b, c podskup od tri osobe koje se uzajamno poznaju, pa ovaj podskup takođe zadovoljava uslove tvrđenja. U slučaju da 2. prostorija sadrži tri ili više osoba, sličnim razmatranjem se dolazi do istog zaključka.