

# Домашняя работа по дискретной математике №19

Михайлов Никита Маратович, БПМИ-167

**1. Решение.** По условию нам дан граф  $\Rightarrow$  мы знаем какие ребра выходят из каждой вершины. На вход функции поступает  $\binom{n}{2}$  ребер. Применим конъюнкцию ко всем ребрам, идущим из общей вершины. Итого будет  $n$  выходов. На каждом выходе получим 1, если из вершины выходит хотя бы одно ребро, и 0, если вершина изолирована. Далее применим к каждому выходу отрицание. Затем ко всем выходам применим дизъюнкцию. Получим 1, если есть хотя бы 1 изолированная вершина, и 0 иначе.

Пронумеруем произвольно вершины. Обозначим за  $x_{ij} \in \{0, 1\}$  - ребро между  $i$ -й и  $j$ -й вершиной. Тогда функция принимает вид:

$$f = \bigvee_{i=1}^n \left( \overline{\bigvee_{j=1, j \neq i}^n x_{ij}} \right)$$

Данная схема имеет размер  $O(n^2)$ .

**2. Решение.** Пронумеруем вершины произвольно от 1 до  $n$ . Будем смотреть на каждую тройку. Применим дизъюнкцию к ребрам, которые их соединяют, тогда функция имеет вид:

$$f = \bigvee_{i=1}^n \bigvee_{(j=1, j \neq i)}^n \bigvee_{(k=1, k \neq j, k \neq i)}^n \overline{x_{ij} \wedge x_{jk} \wedge x_{ki}}$$

Схема имеет размер  $O(n^3)$ .

**3. Решение.** Проверка графа на связность осуществляется возведением матрицы смежности (ее мы можем составить по входным данным) в степень  $n$ . Если матрица такая, что  $\forall i, j : i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 1$ . Возведение матрицы в степень имеет схему размера  $n \cdot O(n^3) = O(n^4)$ .

Эйлеров цикл существует тогда и только тогда, когда все степени вершин четные. Пронумеруем вершины от 1 до  $n$ . Убедившись в связности графа, пробежимся по всем вершинам и посчитаем четность выходящих ребер:

$$f = \bigwedge_{i=1}^n \overline{x_{i1} \oplus \dots \oplus x_{in}}$$

Размер такой схемы  $O(n^2)$ , так как XOR имеет константный размер. Общий размер  $O(n^4)$ .

**4. Решение.** Пусть функция начинает принимать значение 1 при  $i$  единиц в наборе. Тогда данную функцию можно задать, пробежавшись по всем возможным наборам из  $i$  элементов.

$$f = \bigvee_{\sigma \in S_i} x_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge x_{\sigma(i)},$$

где  $S_i$  – множество всех последовательностей от 1 до  $i$ , где порядок не важен (123 и 321 – одинаковые).  $|S_i| = \binom{n}{i}$ . Следовательно, размер схемы равен  $O(i \cdot \binom{n}{i}) = O(n2^n)$

**5. Решение.** Рассмотрим "худший" многочлен Жегалкина из №6. Нам как минимум нужно будет вычислить  $2^n$  сложений по модулю 2, что асимптотически больше, чем  $n^{100}$ . Как бы мы не преобразовывали полином, кол-во сложений не изменится.

**6. Решение.** Заметим, что данным базисом можно задать любой многочлен Жегалкина.

$$P(n) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n \oplus a_{12} x_1 x_2 \oplus a_{13} x_1 x_3 \oplus \dots \oplus a_{1\dots n} x_1 \dots x_n$$

Рассмотрим худший случай, когда в нашей сумме все константы  $a$  равны единице. Тогда всех слагаемых будет  $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = (1+1)^n = 2^n$ . В каждом из слагаемых добавится еще одна операция – конъюнкция переменных. Таким образом, размер схемы не более чем  $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ . Очевидно, что в случаях, когда некоторые из  $a$  равны 0, размер схемы будет меньше.

**7. Решение.** Рассмотрим суперпозицию функций.  $f_i$  – линейная функция.

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= f(f_1(x_{11}, \dots, x_{1n}), \dots, f_n(x_{n1}, \dots, x_{nn})) = a_0 \oplus a_1 f_1 \oplus \dots \oplus a_n f_n = \\ &= a_0 \oplus a_1 (b_{10} \oplus b_{11} x_{11} \oplus \dots \oplus b_{1n} x_{1n}) \oplus \dots \oplus a_n (b_{n0} \oplus b_{n1} x_{n1} \oplus \dots \oplus b_{nn} x_{nn}) = \\ &= a_0 \oplus a_1 b_{10} \oplus a_1 b_{11} x_{11} \oplus \dots \oplus a_1 b_{1n} x_{1n} \oplus \dots \oplus a_n b_{n0} \oplus a_n b_{n1} x_{n1} \oplus \dots \oplus a_n b_{nn} x_{nn} \end{aligned}$$

Получили, что класс линейных функций замкнут, а значит если в функции использовать только линейные, то на выходе будет линейная функция.

**8. Решение.** Рассмотрим некоторую нелинейную функцию  $f(x_1, \dots, x_n)$ . В ее записи полинома Жегалкина есть произведение двух переменных, так как функция нелинейна. Не ограничивая общности рассуждений, пусть это  $x_1$  и  $x_2$ , тогда разобьем полином на 4 группы:

1. Содержат конъюнкцию  $x_1x_2$ ;
2. Содержат  $x_1$ , но не содержат  $x_2$ ;
3. Содержат  $x_2$ , но не содержат  $x_1$ ;
4. Все остальные.

Перепишем нашу функцию с учетом разбиения:

$$f = x_1x_2p_1(x_3, \dots, x_n) \oplus x_1p_2(x_3, \dots, x_n) \oplus x_2p_3(x_3, \dots, x_n) + p_4(x_3, \dots, x_n),$$

где  $p_i$  – некоторые функции. Первая группа всегда существует по нелинейности. Так как мы выражаем конъюнкцию  $x_1 \wedge x_2$ , то вместо  $x_3, \dots, x_n$  можем подставлять все, что угодно. Тогда в  $p_1$  подставим такой набор, что  $p_1 = 1$ . Следовательно, остальные  $p_i$  станут константами. Перепишем функцию.

$$f = x_1x_2 \oplus x_1C_1 \oplus x_2C_2 \oplus C_3$$

Так как константы можно вычислить независимо, то передадим на вход  $f$  следующие аргументы:  $a, b, x_3, \dots, x_n$ , где  $\begin{cases} a = x_1 \oplus C_2 \\ b = x_2 \oplus C_1 \end{cases}$  Подставим их:

$$\begin{aligned} f &= (x_1 \oplus C_2)(x_2 \oplus C_1) \oplus (x_1 \oplus C_2)C_1 \oplus (x_2 \oplus C_1)C_2 \oplus C_3 = \\ &= x_1x_2 \oplus \cancel{x_1C_1} \oplus \cancel{x_2C_2} \oplus C_1C_2 \oplus \cancel{x_1C_1} \oplus \cancel{C_1C_2} \oplus \cancel{x_2C_2} \oplus \cancel{C_1C_2} \oplus C_3 = \\ &= x_1x_2 \oplus C_1C_2 \oplus C_3 = \begin{cases} C_4 = C_1C_2 \oplus C_3 \\ x_1x_2 \oplus C_4 \end{cases} \end{aligned}$$

На выход подадим  $\begin{cases} f, & \text{если } C_4 = 0 \\ \bar{f}, & \text{если } C_4 = 1 \end{cases}$  Конъюнкция  $x_1 \wedge x_2$  получена.