

Algèbre L3 MAA

Claire Amiot

Automne 2026

Table des matières

I	Préliminaires de théorie des ensembles et de structures algébriques	5
1	Applications	5
2	Relations d'équivalence et ensembles quotient	6
2.1	Définition	6
2.2	Classes d'équivalence	7
2.3	Quotient par une relation d'équivalence	8
2.4	Théorème de factorisation	9
3	Groupes, anneaux corps	9
3.1	Lois de composition interne	9
3.2	Groupes, Anneaux, Corps	11
II	Généralités sur les groupes	15
1	Définition, premiers exemples	15
1.1	Définition	15
1.2	Groupes finis, table de multiplication	16
1.3	Exemples	17
2	Morphismes	19
2.1	Définition et exemples	19
2.2	Noyau et image	21
2.3	Conjugaison et automorphismes intérieurs	22
3	Sous-groupes	23
3.1	Définition	23
3.2	Exemples	24
3.3	Sous-groupes distingués	25
3.4	Sous-groupes de $\mathbb{Z}$	26
3.5	Sous-groupes engendrés	26
3.6	Groupes cycliques, ordre d'un élément	28
4	Quotients de groupes	29
4.1	Classes à gauche (et à droite)	29
4.2	Théorème de Lagrange	31

4.3	Groupe quotient	33
4.4	Théorème de factorisation	34
4.5	Autres théorèmes d'isomorphismes	36

III Le groupe symétrique 39

1	Permutations	39
1.1	Définition et notations	39
1.2	Support d'une permutation	40
1.3	Orbites	41
2	Cycles et décompositions	43
2.1	Cycles	43
2.2	Théorème de décomposition	43
2.3	Classes de conjugaison dans $\mathfrak{S}_n$	45
2.4	Générateurs de $\mathfrak{S}_n$	46
3	Signature et groupe alterné	48
3.1	Signature	48
3.2	Le groupe alterné	51
3.3	Simplicité du groupe alterné	52

Chapitre I

Préliminaires de théorie des ensembles et de structures algébriques

1 Applications

Soient E et F deux ensembles non vides, et soit $f : E \rightarrow F$ une application de E dans F .

Définition 1.1 — L'application f est dite *injective* si pour tous éléments x, y de E , on a

$$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y,$$

autrement dit pour tout z de F , l'équation $f(x) = z$ a au plus une solution.

— L'application f est dite *surjective* si pour tout élément z de F , il existe x dans E tel que $f(x) = z$.

Autrement dit, pour tout z dans F l'équation $f(x) = z$ a au moins une solution.

— L'application f est dite *bijjective* si elle est injective et surjective. Autrement dit si pour tout z de F , l'équation $f(x) = z$ a exactement une solution.

Proposition 1.2

L'application $f : E \rightarrow F$ est bijective si et seulement si il existe une application $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ g = \text{Id}_F$.

L'application g est unique, et elle est notée f^{-1} .

Définition 1.3 — Soit $E' \subset E$ un sous-ensemble de E . On note l' *image* de E' par f le sous-ensemble de F défini par

$$f(E') := \{f(x), x \in E'\}.$$

On note $f|_{E'} : E' \rightarrow F$, l'application f *restreinte* à E' .

Pour $f(E)$ on notera aussi $\text{Im } f$ et on parlera de l'image de f .

— Soit $F' \subset F$ un sous-ensemble de F . On note l' *image réciproque* de F' par f le sous-ensemble de E défini par

$$f^{-1}(F') := \{x \in E \mid f(x) \in F'\}.$$

Une application est surjective si et seulement si $\text{Im } f = F$, ou si pour tout z dans F , $f^{-1}(\{z\})$ est non vide.

Une application est injective si pour tout z dans F , $f^{-1}(\{z\})$ contient au plus un élément.

Une application injective induit toujours une bijection sur son image.

2 Relations d'équivalence et ensembles quotient

2.1 Définition

Soit E un ensemble non vide.

Définition 2.1 Une *relation* $\sim$ sur E est la donnée d'un sous-ensemble de $P_\sim \subset E \times E$. On notera $x \sim y$ pour tout couple $(x, y) \in P_\sim$, et on dira que x est en relation avec y .

Définition 2.2 Une relation $\sim$ sur E est appelée *relation d'équivalence* si elle vérifie les propriétés suivantes :

1. $\sim$ est *réflexive*, c'est-à-dire $x \sim x$ pour tout $x \in E$;
2. $\sim$ est *symétrique*, c'est-à-dire $x \sim y$ si et seulement si $y \sim x$;
3. $\sim$ est *transitive*, c'est -à-dire si $x \sim y$ et $y \sim z$ alors $x \sim z$.

Exemple 2.3 1. L'égalité est une relation d'équivalence correspondant au sous-ensemble $\{(s, s) \mid s \in E\} \subset E \times E$.

2. Soit $E = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$. La relation $(p, q) \sim (p', q')$ si et seulement si $pq' = p'q$ est une relation d'équivalence.

3. Soit $E = \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{Z}$. La relation définie par $m \sim n$ si et seulement si $m - n$ est divisible par p est une relation d'équivalence. On note $m = n \bmod p$ ou $m = n [p]$.
4. Soit $f : E \rightarrow E'$ une application d'ensembles. Alors on définit $x \sim y$ si et seulement si $f(x) = f(y)$. C'est une relation d'équivalence. Les 3 exemples ci-dessus sont de cette forme.

Dans le premier $f = Id_E$. Dans le deuxième $E' = \mathbb{Q}$ et $f(p, q) = \frac{p}{q}$ et dans le troisième, $E' = \{0, 1, \dots, p-1\}$ et f est l'application qui à un entier n associe le reste de la division euclidienne de n par p . On verra ensuite que toutes les relations d'équivalence sont de cette forme.

2.2 Classes d'équivalence

Définition 2.4 Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur E . Soit $x \in E$, la *classe d'équivalence* de x est le sous-ensemble $\{y \in E \mid x \sim y\}$ souvent noté C_x ou $\bar{x}$.

Tous les éléments de C_x sont appelés *représentants* de la classe de x .

Exemple 2.5 1. Pour l'égalité, on a $\bar{x} = \{x\}$ pour tout $x \in E$.

$$2. \overline{(p, q)} = \{(p', q') \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \mid \frac{p}{q} = \frac{p'}{q'}\}$$

$$3. \overline{m} = \{n \in \mathbb{Z} \mid m - n \in p\mathbb{Z}\} = \{m + kp \mid k \in \mathbb{Z}\} = m + p\mathbb{Z}.$$

Si $p = 2$ alors $C_0 = 2\mathbb{Z} = \mathcal{P}$ l'ensemble des nombres pairs, et on a

$$C_0 = C_2 = C_4 = C_{-2} = \dots = C_{2k} \text{ pour tout } k \in \mathbb{Z}$$

De plus $C_1 = 1 + 2\mathbb{Z} = \mathcal{I}$ est l'ensemble des nombres d'impairs, et on a

$$C_1 = C_{2k+1} \text{ pour tout } k \in \mathbb{Z}$$

Lemme 2.6

Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur E . Alors pour tout $x \in E$ on a $x \in C_x$. De plus on a

$$x \sim y \Leftrightarrow y \in C_x \Leftrightarrow x \in C_y \Leftrightarrow C_x = C_y.$$

Proposition 2.7

Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur un ensemble E . Alors on a les propriétés suivantes :

1. Pour tous x, y dans E , les classes C_x et C_y sont soit disjointes ($C_x \cap C_y = \emptyset$) soit égales.
2. L'ensemble E est l'union des classes d'équivalences pour la relation $\sim$.

On dit que l'ensemble des classes d'équivalence de $\sim$ forme une *partition* de E .

Démonstration :

1. Soient $x, y \in E$ tels que $C_x \cap C_y \neq \emptyset$. Alors il existe $z \in C_x$ et $z \in C_y$, autrement dit, $x \sim z$ et $y \sim z$. Par symétrie, $z \sim y$, et par transitivité $x \sim y$ donc $C_x = C_y$.
2. On a $x \in C_x$ pour tout x de E , donc $E = \bigcup_{x \in E} C_x$.

Exemple 2.8 Décrire les partitions dans les exemples précédents. On pourra aussi considérer la relation d'équivalence donnée par $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(z) := |z|$.

□

2.3 Quotient par une relation d'équivalence

Définition 2.9 Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur E . Le *quotient* de E par $\sim$ est l'ensemble des classes d'équivalence de E . Il est noté $E/\sim$.

L'application $p : E \rightarrow E/\sim$ qui à x associe C_x est appelée *projection canonique associée à $\sim$* . Elle est toujours surjective.

Exemple 2.10 — Pour l'égalité, on a $E/ = \{\{x\}, x \in E\}$, la projection canonique est une bijection entre E et $E/ =$.

- On a $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*/\sim$ est en bijection avec $\mathbb{Q}$. (exercice)
- Soit $n \in \mathbb{Z}$ et la relation définie précédemment. Alors on a

$$\mathbb{Z}/\sim = \{C_0, C_1, \dots, C_{p-1}\} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}.$$

On notera $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/\sim$. Le cardinal de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est n .

2.4 Théorème de factorisation

Théorème 2.11

Soit E un ensemble muni d'une relation d'équivalence $\sim$, on note $p : E \rightarrow E/\sim$ la projection canonique. Soit $f : E \rightarrow E'$ une application d'ensemble. Alors on a les équivalences

1. il existe $\bar{f} : E/\sim \rightarrow E'$ telle que $f = \bar{f} \circ p$;
2. $\forall x, y \in E, x \sim y \Rightarrow f(x) = f(y)$.

Dans ce cas, $\bar{f}$ est unique.

Démonstration : Supposons que $f = g \circ p$ pour une certaine application $g : E/\sim \rightarrow E'$. Alors si $x \sim y$, on a $C_x = C_y$ donc $p(x) = p(y)$. D'où $f(x) = g \circ p(x) = g \circ p(y) = f(y)$.

Réciproquement, supposons que si $x \sim y$ alors $f(x) = f(y)$. Soit $C \in E/\sim$. Alors $C = C_x$ pour un $x \in E$. On pose $g(C) := f(x)$. Il faut vérifier que c'est bien une application. En effet si $C = C_y$, alors $C_x = C_y$, donc $x \sim y$, donc par hypothèse $f(x) = f(y)$, la valeur $g(C)$ est donc bien définie. $\square$

Exercice 2.12 Soit $f : E \rightarrow F$ une application d'ensemble et soit $\sim$ la relation d'équivalence définie par $x \sim y$ si et seulement si $f(x) = f(y)$. Montrer qu'il existe $\bar{f} : E/\sim \rightarrow F$ telle que $f = \bar{f} \circ p$. Montrer que $\bar{f}$ est injective.

Exercice 2.13 Soit F un ensemble non vide Montrer qu'il existe une bijection canonique entre les applications de E dans F constantes sur les classes, et les applications de $E/\sim$ dans F .

3 Groupes, anneaux corps

3.1 Lois de composition interne

Soit E un ensemble non vide.

Définition 3.1 Une *loi de composition interne* $*$ sur E est la donnée d'une application

$$\begin{aligned} E \times E &\rightarrow E \\ (x, y) &\mapsto x * y \end{aligned}$$

. Elle est dite *associative* si pour tous x, y et z éléments de E , on a $(x*y)*z = x*(y*z)$.

Elle est dite *commutative* si pour tous x, y de E , on a $x*y = y*x$.

Exemple : $+$ et $.$ sont des lci associatives et commutatives sur $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$.

Définition 3.2 Soit $*$ un lci sur E . Un élément $e \in E$ est dit *neutre* pour $*$ si pour tout x de E , on a $e*x = x*e = x$.

Proposition 3.3

Si $*$ possède un neutre dans E , il est unique.

Définition 3.4 Soit $*$ une lci sur E de neutre e . Un élément $x \in E$ possède un *inverse* (ou *symétrique*) si il existe $x' \in E$ tel que $x*x' = x'*x = e$. on dit que x est *inversible*.

Proposition 3.5

Soit $*$ une lci associative, et e un élément neutre. Si x possède un inverse, il est unique. On le notera x^{-1} .

Si x est inversible, alors x^{-1} est inversible et on a $(x^{-1})^{-1} = x$.

Si x et y sont inversibles, alors $x*y$ aussi et on a $(x*y)^{-1} = y^{-1}*x^{-1}$.

Démonstration : Soient y et z deux inverses de x , alors

$$\begin{aligned} y &= y * e && \text{car } e \text{ est neutre} \\ &= y * (x * z) && \text{car } z \text{ est un inverse de } x \\ &= (y * x) * z && \text{car la loi est associative} \\ &= e * z && \text{car } y \text{ est inverse de } x \\ &= z && \text{car } e \text{ est neutre.} \end{aligned}$$

□

3.2 Groupes, Anneaux, Corps

Définition 3.6 Un *groupe* $(G, *)$ est un ensemble G muni d'une application (appelée *loi de composition interne*)

$$\begin{aligned} G \times G &\rightarrow G \\ (x, y) &\mapsto x * y \end{aligned}$$

telle que

- (G1) pour tous x, y et z éléments de G , on a $(x * y) * z = x * (y * z)$ (la loi $*$ est *associative*);
- (G2) il existe $e \in G$ tel que, pour tout $x \in G$, $x * e = e * x = x$;
- (G3) pour tout $x \in G$ il existe $y \in G$ tel que $x * y = y * x = e$.

Lorsque la loi $*$ est aussi commutative (i.e. pour tous x, y dans G , $x * y = y * x$) alors le groupe G est dit *abélien*.

Soit E un ensemble non vide.

Définition 3.7 Soit $+$ et $.$ deux lois de composition interne sur E . On dit que $.$ est *distributive* par rapport à $+$ si pour tous x, y et z dans E on a

$$x.(y + z) = (x.y) + (x.z) \text{ et } (y + z).x = (y.x) + (z.x)$$

Définition 3.8 Un *anneau* est un triplet $(A, +, .)$ où $+$ et $.$ sont des lois de composition internes telles que

1. $(A, +)$ est un groupe abélien;
2. la loi $.$ est associative et possède un neutre noté 1_A ;
3. $.$ est distributive par rapport à $+$.

Lorsque $.$ est commutative, $(A, +, .)$ sera dit *commutatif*.

Remarque 3.9 Les lois $+$ et $.$ ne sont pas a priori supposées distinctes. On peut alors facilement vérifier (exercice) que l'anneau a un unique élément $0_A = 1_A$.

Définition 3.10 Un *corps* est un triplet $(K, +, .)$ où $+$ et $.$ sont des lois de composition interne telles que

1. $(K, +, .)$ est un anneau;
2. $1_K \neq 0_K$;
3. tout élément de $K \setminus \{0_K\}$ possède un inverse pour la loi $.$.

On parlera de corps commutatif lorsque $.$ est commutative.

Groupes

Chapitre II

Généralités sur les groupes

1 Définition, premiers exemples

1.1 Définition

Définition 1.1 Un *groupe* $(G, *)$ est un ensemble G muni d'une application (appelée *loi de composition interne*)

$$\begin{aligned} G \times G &\rightarrow G \\ (x, y) &\mapsto x * y \end{aligned}$$

telle que

- (G1) pour tous x, y et z éléments de G , on a $(x * y) * z = x * (y * z)$ (la loi $*$ est *associative*);
- (G2) il existe $e \in G$ tel que, pour tout $x \in G$, $x * e = e * x = x$;
- (G3) pour tout $x \in G$ il existe $y \in G$ tel que $x * y = y * x = e$.

Lorsque la loi $*$ est aussi commutative (i.e. pour tous x, y dans G , $x * y = y * x$) alors le groupe G est dit *abélien*.

Exemple 1.2 — $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe. Le neutre est 0, l'inverse de $x \in \mathbb{Z}$ est $-x$.

- $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe. 0 est neutre, mais les éléments ≥ 1 n'ont pas d'inverse.
- $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe, mais $(\mathbb{R}, \cdot)$ n'est pas un groupe. 1 est neutre pour tous les $x \neq 0$, mais $0 \cdot 1 = 0 \neq 1$.
- $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ est un groupe. L'élément neutre est 1, l'inverse d'un $x \in \mathbb{R}$ est donné par $x^{-1} = \frac{1}{x}$. $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ est aussi un groupe.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ muni de la loi $(x, y) \mapsto x^y$ n'est pas un groupe. La loi puissance n'est pas associative. $3^{(1^2)} = 3^1 = 3 \neq (3^1)^2 = 3^2 = 9$.

Tous ces exemples de groupes sont abéliens.

Notation : Pour un groupe quelconque, on prend souvent la notation multiplicative, c'est-à-dire on note xy , ou $x.y$ au lieu de $x * y$. Dans ce cas, le neutre est noté 1_G ou 1 . Si x est dans G et $n \in \mathbb{Z}$, on définit

$$\begin{aligned} x^n &= \underbrace{x.x.\dots.x}_{n \text{ fois}} & \text{si } n \geq 1 \\ &= \underbrace{x^{-1}.x^{-1}.\dots.x^{-1}}_{-n \text{ fois}} & \text{si } n \leq -1 \\ &= 1 & \text{sin } n = 0 \end{aligned}$$

Attention, si G n'est pas commutatif, $(xy)^n \neq x^n y^n$ en général.

Lorsque G est abélien, on prend aussi souvent la notation additive, c'est-à-dire, on note $x + y$. Dans ce cas le neutre est noté 0_G ou 0 et l'inverse $-x$. Si x est dans G et $n \in \mathbb{N}$, on note nx l'élément $nx = \underbrace{x + x + \dots + x}_{n \text{ fois}}$.

On peut noter G le groupe $(G, .)$ lorsque la loi est sous-entendue.

Proposition 1.3

Soit G un groupe. On a les propriétés suivantes

1. $\forall m, n \in \mathbb{Z}, \forall x \in G, x^{n+m} = x^n . x^m,$
2. $\forall x, y \in G, (xy)^{-1} = y^{-1} x^{-1}.$

Démonstration : laissée en exercice

□

1.2 Groupes finis, table de multiplication

Définition 1.4 Lorsque l'ensemble G est fini, on dit que le groupe G est fini. Le cardinal de G est appelé *l'ordre* de G , il est noté $|G|$ ou $\#G$.

Soit $(G, .)$ un groupe fini de cardinal n . Notons $g_1, g_2, \dots, g_n$ ses éléments. On peut alors écrire sa table de multiplication :

	g_1	g_2	g_3	$\cdots$	g_n
g_1	g_1^2	g_1g_2	g_1g_3	$\cdots$	g_1g_n
g_2	g_2g_1	g_2^2	g_2g_3	$\cdots$	g_2g_n
g_3	g_3g_1	g_3g_2	g_3^2	$\cdots$	g_3g_n
$\vdots$	$\vdots$				
g_n	g_ng_1	g_ng_2	g_ng_3	$\cdots$	g_n^2

La table de multiplication décrit entièrement la loi du groupe.

Exercice 1.5 Vérifier que la table suivante correspond à une loi d'un groupe à deux éléments :

	a	b
a	a	b
b	b	a

Montrer que la loi donnée par la table suivante n'est pas une loi de groupe :

	a	b
a	a	b
b	b	b

1.3 Exemples

1. Si E est un espace vectoriel (sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), alors $(E, +)$ est un groupe, de neutre le vecteur nul. Par exemple $(\mathbb{R}^n, +)$ est un groupe, ou bien encore $(\mathbb{R}[X], +)$ ou $(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}), +)$.
2. Pour $k = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Le groupe $(\text{GL}_n(k), \cdot)$ est un groupe non abélien pour $n \geq 2$.
3. Soit E un k -espace vectoriel, alors l'ensemble des applications linéaires bijectives de E dans E (ou endomorphismes inversibles de E) muni la loi de composition $\circ$ est un groupe. Le neutre de $(\text{GL}(E), \circ)$ est l'application identité Id_E . C'est aussi un groupe non abélien si la dimension de E est ≥ 2 .
4. Notons s_x la symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x dans $\mathbb{R}^2$, s_y la symétrie orthogonale par rapport à l'axe des y , et s_0 la symétrie centrale de centre 0. Alors l'ensemble $\{Id_{\mathbb{R}^2}, s_x, s_y, s_0\}$ muni de la loi de composition est un groupe fini. Sa table de multiplication est la suivante :

	I	s_x	s_y	s_0
I	I	s_x	s_y	s_0
s_x	s_x	I	s_0	s_y
s_y	s_y	s_0	I	s_x
s_0	s_0	s_y	s_x	I

5. Pour $p = 0, \dots, 3$ notons r_p la rotation de centre 0 d'angle $\frac{p\pi}{2}$ dans $\mathbb{R}^2$. Alors l'ensemble $\{r_0, r_1, r_2, r_3\}$ muni de la composition est un groupe. Sa table de multiplication est la suivante :

	r_0	r_1	r_2	r_3
r_0	r_0	r_1	r_2	r_3
r_1	r_1	r_2	r_3	r_0
r_2	r_2	r_3	r_0	r_1
r_3	r_3	r_0	r_1	r_2

6. Soit n un entier non nul. On considère l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ muni de la loi $+$ définie par

$$\bar{x} + \bar{y} := \overline{x + y}.$$

On peut vérifier que cela définit bien une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et muni $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'une structure de groupe abélien.

On peut définir de même une loi $\cdot$ sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et montrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif.

7. Soit E un ensemble fini, alors l'ensemble des bijections de E dans E muni de la loi de composition est un groupe. Il est non abélien dès que $\#E \geq 3$. Il est fini et son cardinal est $(\#E)!$. On l'appelle le *groupe des permutations* de E , ou le *groupe symétrique de E* . On le note $\mathfrak{S}_E$. On l'étudiera plus en détail dans un autre chapitre.

8. Soit $(G_1, \bullet)$ et $(G_2, \star)$ deux groupes. Alors on peut munir $G_1 \times G_2$ d'une structure de groupe en posant $(x_1, x_2) * (y_1, y_2) := (x_1 \bullet y_1, x_2 \star y_2)$ pour tous $x_1, y_1 \in G_1$ et $x_2, y_2 \in G_2$.

Le groupe $G_1 \times G_2$ est appelé le *produit direct* de G_1 par G_2 .

Par exemple, le groupe $(\mathbb{R}^2, +)$ est le produit direct de $(\mathbb{R}, +)$ par $(\mathbb{R}, +)$.

9. Soit X un ensemble et $(G, \cdot)$ un groupe. Alors l'ensemble G^X des applications de X dans G est un groupe pour la loi $*$ définie par : $(\phi * \psi)(x) := \phi(x) \cdot \psi(x)$ pour tout $\phi, \psi \in G^X$ et tout $x \in X$. (Expliciter l'élément neutre et le symétrique d'une fonction.)

Par exemple, $(\mathcal{F}([a, b], \mathbb{R}), +)$ est un groupe.

Si X est réduit à un élément, alors G^X est canoniquement isomorphe à G . Si $X = \{1, \dots, n\}$ alors G^X est canoniquement isomorphe à $G^n = G \times G \times \dots \times G$.

2 Morphismes

2.1 Définition et exemples

Définition 2.1 Soient G et G' deux groupes. Un *morphisme* de G dans G' est une application $f : G \rightarrow G'$ telle que

$$\forall x, y \in G \quad f(x.y) = f(x).f(y).$$

Lorsque $G = G'$ on parle d'endomorphisme. Lorsque f est inversible (c'est-à-dire qu'il existe un morphisme de groupe $h : G' \rightarrow G$ tel que $f \circ h = \text{Id}_{G'}$ et $h \circ f = \text{Id}_G$), on parle d'*isomorphisme*. Et si de plus $G = G'$ f est appelé *automorphisme*.

Lemme 2.2

Soit f un morphisme de G dans G' . Alors on a les propriétés :

1. $f(1_G) = 1_{G'}$;
2. Pour tout $x \in G$, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.

Démonstration : Exercice. □

Proposition 2.3

Soit $\varphi : G \rightarrow H$ et $\psi : H \rightarrow K$ deux morphismes de groupes, alors $\psi \circ \varphi : G \rightarrow K$ est un morphisme de groupes.

Démonstration : Soit x, y dans G , alors on a

$$\psi \circ \varphi(xy) = \psi(\varphi(x).\varphi(y)) = (\psi \circ \varphi(x)).(\psi \circ \varphi(y)).$$

□

Proposition 2.4

Un morphisme de groupe est un isomorphisme si et seulement si il est bijectif.

Démonstration : Il est clair que si f est inversible, alors elle est bijective. Supposons f bijective et notons h la bijection réciproque. Il faut montrer que h est un morphisme. Soient $x', y' \in G'$, notons $x = h(x')$ et $y = h(y')$, tels que $x' = g(x)$ et $y' = g(y)$. On a donc

$$h(x'y') = h(g(x)g(y)) = h(g(xy)) = xy = h(x')h(y').$$

□

Corollaire 2.5

Soit G un groupe. L'ensemble des automorphismes de G muni de la loi de composition $(\text{Aut}(G), \circ)$ est un groupe.

Démonstration : La composition est une loi de composition interne pour $\text{Aut}G$. En effet, si f et g sont des automorphismes, alors $f \circ g$ est un morphisme par la proposition précédente. C'est une bijection comme composée de bijections, donc c'est un automorphisme par la proposition au dessus. La composition d'application est associative. L'identité est clairement un automorphisme. Et si f est un automorphisme, alors par définition, f^{-1} est aussi un automorphisme. □

La notion d'isomorphisme est primordiale. Lorsqu'on se donne un groupe G , on veut comprendre sa structure "à isomorphisme près", c'est à dire à quel groupe "connu" il est isomorphe.

Notons que deux groupes finis isomorphes ont nécessairement même cardinal. La réciproque n'est pas vraie : par exemple les deux groupes à 4 éléments $\{r_0, r_1, r_2, r_3\}$ et $\{\text{Id}, s_x, s_y, s_0\}$ donnés précédemment ne sont pas isomorphes. (Pourquoi ?)

- Exemple 2.6**
1. Soit $p \in \mathbb{Z}$. La multiplication par p est un morphisme de $\mathbb{Z}$ dans lui même. Ce n'est pas un isomorphisme sauf si $p = \pm 1$.
 2. $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}^*, \cdot)$.
 3. L'application déterminant est un morphisme de $\text{GL}_n(k)$ dans $(k^*, \cdot)$.
 4. La conjugaison ($z \mapsto \bar{z}$) est un automorphisme de $(\mathbb{C}, +)$ dans $(\mathbb{C}, +)$ et de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ dans $(\mathbb{C}^*, \cdot)$.
 5. Soit G le groupe des rotations défini dans le paragraphe 1. L'application $G \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ qui à r_m associe $\bar{m}$ pour $m = 0, \dots, 3$ est un isomorphisme de groupe.
 6. La projection canonique $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ qui à m associe $\bar{m}$ est un morphisme de groupes.
 7. Soit G un groupe, et $x \in G$. L'application $n \mapsto x^n$ est un morphisme de $\mathbb{Z}$ dans G .
 8. Soit E un espace vectoriel de dimension n . Chaque choix de base de E donne un isomorphisme de $\text{GL}(E)$ dans $\text{GL}_n(k)$.
 9. Si G_1 et G_2 sont des groupes, alors la projection $p : G_1 \times G_2 \rightarrow G_1$ définie par $p(x, y) := x$ est un morphisme de groupes. L'injection $i : G_1 \rightarrow G_1 \times G_2$ définie par $i(g) := (g, 1_{G_2})$ est un morphisme de groupes. Le groupe $G_1 \times G_2$ est canoniquement isomorphe au groupe $G_2 \times G_1$.
 10. si X est un ensemble et G un groupe, pour $x \in X$, l'évaluation $\text{ev}_x : G^X \rightarrow G$ définie par $\text{ev}_x(f) := f(x)$ est un morphisme de groupes.

2.2 Noyau et image

Définition 2.7 Soient G et G' deux groupes et soit f un morphisme de G dans G' . Alors on définit

- le **noyau** de f par $\text{Ker } f := \{x \in G \text{ t.q. } f(x) = 1_{G'}\} \subset G$.
- l'**image** de f par $\text{Im } f := \{f(x), x \in G\} \subset G'$.

- Exemple 2.8**
1. Le noyau de la multiplication $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ par p est $\{0\}$. Son image est $p\mathbb{Z}$.
 2. Le noyau de la projection canonique $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est $n\mathbb{Z}$.
 3. $\text{Ker } \exp = \{0\}$, et $\text{Im } \exp =]0, +\infty[$
 4. $\text{Ker } \det = \{M \in \text{GL}_n, \det M = 1\}$, $\text{Im } \det = k^*$.

Lemme 2.9

Un morphisme f entre deux groupes G et G' est injectif si et seulement si $\text{Ker } f = \{1_G\}$.

Démonstration : Supposons f injectif. Soit $x \in \text{Ker} f$, alors $f(x) = 1_{G'} = f(1_G)$. Donc $x = 1_G$.

Supposons maintenant que $\text{Ker} f = \{1_{G'}\}$. Soient x et y dans G tels que $f(x) = f(y)$. Alors on a

$$1_{G'} = f(x)(f(y))^{-1} = f(x)f(y^{-1}) = f(xy^{-1})$$

donc xy^{-1} est dans $\text{Ker} f$. Par hypothèse, on a donc $xy^{-1} = 1_G$, c'est-à-dire $x = y$. $\square$

2.3 Conjugaison et automorphismes intérieurs

Proposition 2.10

Soit G un groupe, et $g \in G$. Alors l'application $\text{Int}_g : G \rightarrow G$ définie par

$$\text{Int}_g(x) := gxg^{-1}$$

est un automorphisme de G .

Par ailleurs, l'application $\text{Int} : G \rightarrow \text{Aut}(G)$ définie par $\text{Int}(g) := \text{Int}_g$ est un morphisme de groupes.

Définition 2.11 Les automorphismes de G de la forme Int_g sont appelés *automorphismes intérieurs*.

Définition 2.12 Soit X une partie d'un groupe G . Pour $g \in G$, on note $gXg^{-1} := \{gxg^{-1}, x \in X\}$. Si X' est une partie de G de la forme gXg^{-1} , on dit que X et X' sont *conjuguées* (par g).

Notons que si X et X' sont conjugués, alors l'élément g les conjugant n'est pas unique.

Proposition 2.13

1. Si X et X' sont conjugués et fini, alors $|X| = |X'|$.
2. Soit n un entier. La conjugaison est une relation d'équivalence sur l'ensemble des parties à n éléments de G .

En considérant le cas $n = 1$, on a que la conjugaison est une relation d'équivalence sur G (on dira que deux éléments x et y sont conjugués dans G si il existe $g \in G$ tel que $y = gxg^{-1}$).

Exemple 2.14 1. Décrire les classes de conjugaison d'un groupe abélien.
 2. Il est difficile de décrire les classes de conjugaisons en général. Par exemple les classes de conjugaison du groupe $GL_n(k)$ où k est un corps, est un problème difficile (cela revient à déterminer quand deux matrices représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes).

3 Sous-groupes

3.1 Définition

Définition 3.1 Soit $(G, .)$ un groupe. Un sous-ensemble $H \subset G$ de G est un *sous-groupe* de G si les trois conditions suivantes sont vérifiées :

- (SG1) $1_G \in H$;
- (SG2) $\forall x, y \in H \quad x.y \in H$ (H est stable par la loi de groupe de G) ;
- (SG3) $\forall x \in H \quad x^{-1} \in H$ (H est stable par passage à l'inverse).

En d'autres termes, $(H, .)$ est un groupe avec la loi induite par celle de G . On notera $H < G$

Il est facile de voir que si G est un groupe, alors G et $\{1_G\}$ sont des sous-groupes de G (appelés sous-groupes triviaux).

Proposition 3.2

Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes.

1. Soit H un sous-groupe de G , alors $f(H) = \{f(h), h \in H\}$ est un sous-groupe de G' . En particulier $\text{Im } f$ est un sous-groupe de G' .
2. Soit H' un sous-groupe de G' Alors $f^{-1}(H') = \{x \in G \mid f(x) \in H'\}$ est un sous-groupe de G . En particulier $\text{Ker } f$ est un sous-groupe de G

Démonstration :

- Tout d'abord on a bien que $1_G \in H$ donc $1_{G'} = f(1_G) \in f(H)$. Soient x' et y' dans $f(H)$, alors on a $x' = f(x)$ et $y' = f(y)$ pour x, y dans H . On a donc $xy \in H$ car H est un sous-groupe. Alors

$$x'.y' = f(x).f(y) = f(x.y) \in f(H).$$

De même si $x' = f(x)$ avec $x \in H$, alors $x^{-1} \in H$ et alors

$$f(x)^{-1} = f(x^{-1}) \in f(H).$$

Donc $f(H)$ est un sous-groupe de G' .

- Comme $f(1_G) = 1_{G'} \in H'$, alors $1_G \in f^{-1}(H')$. Soient x et y dans $f^{-1}(H')$. Alors on a $f(x.y) = f(x).f(y) \in H'$ autrement dit $x.y \in f^{-1}(H')$. Enfin si $x \in f^{-1}(H')$ alors $f(x^{-1}) = f(x)^{-1} \in H'$ car $f(x) \in H'$ et H' sous-groupe. Donc $x^{-1} \in f^{-1}(H')$.

□

3.2 Exemples

1. $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ qui est lui même un sous-groupe de $(\mathbb{C}, +)$.
2. $]0, +\infty[, .)$, ainsi que $(\{1, -1\}, .)$ sont des sous-groupes de $(\mathbb{R}^*, .)$, $]0, +\infty[$ est l'image du morphisme exponentielle.
3. $n\mathbb{Z} := \{nx, x \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$, il est isomorphe à $\mathbb{Z}$. C'est l'image de la multiplication par n qui est un morphisme de groupes.

Attention ici, la notation $n\mathbb{Z} := \{nx, x \in \mathbb{Z}\}$ n'a rien à voir avec la notation gH pour H un sous-groupe de G . En effet, ici la loi de $\mathbb{Z}$ est l'addition. Il est facile de voir (et on reviendra dessus) que gH est un sous-groupe si et seulement si $g \in H$.

4. L'ensemble $\mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C} \text{ tel que } |z| = 1\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, .)$.
5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble $\mathcal{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \text{ tel que } z^n = 1\}$ des racines n èmes de l'unité est un sous-groupe de $\mathcal{U}$ et donc de $(\mathbb{C}^*, .)$.
6. L'ensemble $\text{SL}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } \det M = 1\}$ est un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$, c'est le noyau du déterminant.
7. L'ensemble $\text{O}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } {}^t M.M = I_n\}$ des matrices orthogonales est un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$.
8. Soit G un groupe, alors $Z(G) = \{z \in G, \forall g \in G, gz = zg\}$ est un sous-groupe de G appelé le centre de G . Le groupe G est abélien si et seulement si $Z(G) = G$.

Le centre de $GL_n(k)$ est l'ensemble des matrices de la forme λI_n avec $\lambda \in k^*$ (attention, ce n'est pas si simple à vérifier).

Exercice 3.3 Le noyau de $\text{Int} : G \rightarrow \text{Aut}(G)$ est égal à $Z(G)$.

3.3 Sous-groupes distingués

La conjugaison étant un morphisme de groupes, on en déduit :

Proposition 3.4

Soit H un sous-groupe d'un groupe G . Alors pour tout $x \in G$, $xHx^{-1} = \{xhx^{-1}, h \in H\}$ est un sous-groupe de G .

Ceci amène à la définition suivante.

Définition 3.5 Soit H un sous-groupe de G . On dit que H est *distingué* (ou *normal*) dans G , et on notera $H \triangleleft G$ si pour tout $g \in G$ on a $gHg^{-1} = H$ (autrement dit la classe conjugaison de H est $\{H\}$).

Exemple 3.6

1. $\{1_G\}$ et G sont toujours des sous-groupes distingués.
2. Dans un groupe abélien, tous les sous-groupes sont distingués. (Attention la réciproque n'est pas vraie).
3. Le centre d'un groupe G est distingué dans G .
4. $\text{Int}(G)$ (c'est -à-dire l'image du morphisme $\text{Int} : G \rightarrow \text{Aut}(G)$) est normal dans $\text{Aut}(G)$.

Attention, la notion d'être distingué n'est pas "transitive", c'est-à-dire que si on $K < H < G$, on a bien $K < G$, par contre si on a $K \triangleleft H \triangleleft G$, alors on n'a pas nécessairement $K \triangleleft G$.

Proposition 3.7

Soit $\varphi : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes, et H' un sous-groupe distingué, alors $\varphi^{-1}(H')$ est distingué dans G . En particulier, le noyau d'un morphisme est toujours distingué.

Démonstration : Soit $g \in G$ et $h \in \varphi^{-1}(H')$. Alors on a $\varphi(h) \in H'$ et donc

$$\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)\varphi(g)^{-1}$$

qui est dans H' car H' est distingué. On a donc $ghg^{-1} \in \varphi^{-1}(H')$, ce qui montre que $\varphi^{-1}(H')$ est bien distingué. $\square$

Attention par contre l'image d'un sous-groupe distingué (en particulier l'image d'un morphisme) n'est pas toujours distingué. Par exemple, l'injection d'un sous-groupe H de G dans G est un morphisme dont l'image est H . Donc si H n'est pas distingué, alors son image non plus.

3.4 Sous-groupes de $\mathbb{Z}$

Théorème 3.8

Tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration : Soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$ alors $H = 0\mathbb{Z}$. Supposons $H \neq \{0\}$. Soit $x \neq 0 \in H$. Alors x et $-x$ sont dans H , donc H contient des entiers strictement positifs. Notons n le plus petit entier ≥ 1 contenu dans H . On va montrer que $n\mathbb{Z} = H$.

Tout d'abord, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $pn = n + n + \dots + n \in H$ et $-pn = -(pn) \in H$ donc $n\mathbb{Z} \subset H$.

Soit maintenant $x \in H$. Écrivons la division euclidienne de x par n , $x = nq + r$ avec $0 \leq r < n$. Alors

$$r = \underbrace{x}_{\in H} - \underbrace{nq}_{\in n\mathbb{Z} \subset H} \in H.$$

Par minimalité de n , on a donc $r = 0$, c'est-à-dire $x = nq \in n\mathbb{Z}$. $\square$

3.5 Sous-groupes engendrés

Proposition 3.9

Soit G un groupe et H_1 et H_2 deux sous-groupes de G , alors $H_1 \cap H_2$ est un sous-groupe de G .

Plus généralement, si I est un ensemble, et qu'on a pour tout $i \in I$ un sous-groupe H_i de G , alors $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G .

Démonstration : Exercice. □

Attention, $H_1 \cup H_2$ n'est en général pas un sous-groupe de G .

Proposition 3.10

Soit $p, q \in \mathbb{N}$ alors $p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = \text{ppcm}(p, q)\mathbb{Z}$.

Définition 3.11 Soit X un sous-ensemble d'un groupe G . Alors on appelle *sous-groupe engendré* par X l'intersection de tous les sous-groupes de G contenant X . C'est un sous-groupe par la proposition 3.9. Il est noté $\langle X \rangle$.

Proposition 3.12

- Le sous-groupe $\langle X \rangle$ est le plus petit sous-groupe de G contenant X , c'est-à-dire que si K est un sous-groupe de G qui contient X alors $\langle X \rangle \subset K$.
- $x \in \langle X \rangle$ si et seulement si il existe $x_1, \dots, x_n \in X$ tels que $x = x_1^{\pm 1} \dots x_n^{\pm 1}$.

Proposition 3.13

Soit $p, q \in \mathbb{N}$ alors $\langle p, q \rangle = \text{pgcd}(p, q)\mathbb{Z}$.

- Exemple 3.14**
1. $\langle G \rangle = G$. $\langle e \rangle = \{e\}$
 2. $\mathcal{U}_n = \langle e^{\frac{2i\pi}{n}} \rangle$.
 3. $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$.
 4. $G = \langle r_1 \rangle$ dans l'exemple.
 5. $G = \langle s_x, s_y \rangle$.

3.6 Groupes cycliques, ordre d'un élément

Définition 3.15 Un (sous-)groupe G est dit *monogène* s'il est engendré par un seul élément.

Un (sous-)groupe monogène et fini est dit *cyclique*.

Exemple 3.16 $\mathbb{Z}$ est une groupe monogène infini. $\mathcal{U}_n$ est un groupe cyclique.

Définition 3.17 Soit $a \in G$. Si il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $a^n = e$, alors a est dit *d'ordre fini*. L'*ordre* de a est le plus petit entier strictement positif n tel que $a^n = e$.

Proposition 3.18

Soit G un groupe et $x \in G$. On a les propriétés suivantes

1. $\langle x \rangle = \{x^n, n \in \mathbb{Z}\}$.
2. $\langle x \rangle$ est un sous-groupe abélien.
3. Soit $p \geq 1$ l'ordre de x , et soit $n \in \mathbb{Z}$ tel que $x^n = e$. Alors p divise n .
4. $\langle x \rangle$ est fini, si et seulement si x est d'ordre fini. Dans ce cas $\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \dots, x^{p-1}\}$ où p est l'ordre de x , et l'ordre de $\langle x \rangle$ est p .

Démonstration :

1. $x \in \langle x \rangle$, donc $x^n \in \langle x \rangle$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Donc $\{x^n, n \in \mathbb{Z}\} \subset \langle x \rangle$. De plus il est clair que $\{x^n, n \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de G . Donc on a bien égalité.
2. $x^p x^q = x^{p+q} = x^{q+p} = x^q x^p$.
3. Soit $n = pq + r$ la division euclidienne de n par p . Alors $e = x^n = x^{pq+r} = (x^p)^q \cdot x^r = x^r$. Or $0 \leq r \leq p-1$, comme p est le plus petit entier strictement positif vérifiant $x^p = e$, on a nécessairement $r = 0$. Autrement dit p divise n .

4. Si $\langle x \rangle$ est fini, il existe des entiers $p \neq q$ tels que $x^p = x^q$. Supposons $p > q$. Alors on a $x^{p-q} = x^p x^{-q} = x^q x^{-q} = 1_G$. Donc x est d'ordre fini. Réciproquement, soit x d'ordre fini. Notons p son ordre. On va montrer que $\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \dots, x^{p-1}\}$, ce qui entraînera la finitude de $\langle x \rangle$. Par 1., il suffit de montrer que $x^n \in \{e, x, x^2, \dots, x^{p-1}\}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Soit $n \in \mathbb{Z}$ et notons r le reste de la division euclidienne de n par p . Alors $n = pq + r$ avec $0 \leq r \leq p-1$. On a alors $x^n = x^{pq+r} = (x^p)^q \cdot x^r = e^q \cdot x^r = x^r$. Autrement dit, $x^n \in \{e, x, x^2, \dots, x^{p-1}\}$. Vérifions maintenant que tous ces éléments sont différents. Si $x^i = x^j$, alors $x^{i-j} = e$, donc p divise $i - j$. Si $0 \leq i, j \leq p-1$, cela implique $i - j = 0$.

□

On a le premier théorème de structure pour les groupes monogènes.

Théorème 3.19

Soit $G = \langle x \rangle$ un groupe monogène.

1. Si G est infini, alors G est isomorphe à $\mathbb{Z}$.
2. Si G est fini d'ordre n , alors G est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration : On considère le morphisme $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$ défini par $\varphi(n) := x^n$. C'est bien un morphisme, et il est surjectif. Il est par ailleurs injectif car son noyau est réduit $\{0\}$ puisque x est d'ordre infini. C'est donc un isomorphisme.

Si G est fini d'ordre n , alors le morphisme φ est constant sur les classes d'équivalence en effet si n divise $b-a$, alors on a $b = nq+a$ et donc $x^a = x^b$. On obtient donc une application $\bar{\varphi} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$ qui est bien définie. On vérifie facilement que c'est un morphisme. Il est surjectif par le point 4. ci-dessus. Et il est injectif par le point 3. C'est donc un isomorphisme. □

4 Quotients de groupes

4.1 Classes à gauche (et à droite)

Définition 4.1 Soit G un groupe et H un sous-groupe de G . Alors on définit la relation d'équivalence sur G

$$x \sim_\ell y \Leftrightarrow x^{-1}y \in H.$$

Vérifions d'abord que c'est bien une relation d'équivalence. $x^{-1}x = e \in H$, donc $\sim_\ell$ est réflexive. Ensuite si $x \sim y$ alors $x^{-1}y \in H$. Comme H est un sous-groupe, $(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x \in H$, c'est-à-dire que $y \sim_\ell x$, donc $\sim$ est symétrique. Enfin si $x \sim_\ell y$ et $y \sim_\ell z$, alors $x^{-1}z = (x^{-1}y)(y^{-1}z) \in H$ car H est stable par multiplication, donc $\sim_\ell$ est transitive.

On voit alors facilement que la classe d'un élément x pour cette relation d'équivalence est donnée par $\bar{x} = xH$. En effet,

$$\begin{aligned} y \in \bar{x} &\Leftrightarrow x^{-1}y \in H \\ &\Leftrightarrow \exists h \in H \text{ tel que } x^{-1}y = h \\ &\Leftrightarrow \exists h \in H \text{ tel que } y = xh \\ &\Leftrightarrow y \in xH. \end{aligned}$$

On appelle les classes xH , les *classes à gauche* suivant H . On note G/H l'ensemble quotient $G/\sim_\ell$.

Lemme 4.2

Soient $x, y \in G$. L'application de $G \rightarrow G$ qui à g associe $yx^{-1}g$ se restreint en une bijection de xH dans yH .

Donc si H est fini on a $|xH| = |H|$.

On peut aussi définir les *classes à droite* en prenant la relation d'équivalence $x \sim_r y \Leftrightarrow yx^{-1} \in H$, l'ensemble quotient se note $H \backslash G$. Les classes à droite sont les Hx , pour $x \in G$.

Lemme 4.3

L'application $G \rightarrow G$ qui à g associe g^{-1} se restreint en une bijection $Hx^{-1} \rightarrow xH$.

Corollaire 4.4

L'application $G/H \rightarrow H \backslash G$ qui à xH associe Hx^{-1} est une bijection bien définie.

4.2 Théorème de Lagrange

Définition 4.5 Soit G un groupe et H un sous-groupe, tel que l'ensemble des classes à gauche (ou à droite) est fini. On appelle *indice* de H dans G le cardinal $|G/H| = |H \backslash G|$, et on le note $[G : H]$.

Théorème 4.6 (Lagrange)

Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G . L'ordre de H divise l'ordre de G . Plus précisément on a $|H| \cdot |G/H| = |G|$.

Démonstration : Par la section précédente, G est l'union disjointe des classes à gauches. Toutes les classes à gauche ont le même cardinal $\#H$ par le lemme ci-dessus. De plus le nombre de classe à gauche est exactement $\#(G/H)$. Donc on a bien $\#H \cdot \#(G/H) = \#G$. $\square$

Corollaire 4.7

Soit x un élément d'ordre n dans un groupe fini G . Alors n divise l'ordre de G .

Si en particulier l'ordre de G est fini égal à m alors pour tout x dans G on a $x^m = 1$.

Démonstration : On a vu dans Proposition 3.18 que dans ce cas l'ordre de $\langle x \rangle$ est n . Donc on a le résultat par le théorème précédent. $\square$

Corollaire 4.8

Soit $G \neq \{e\}$ un groupe fini d'ordre p avec p premier. Alors G est cyclique et tout $x \neq e$ engendre G .

En particulier, tout groupe fini d'ordre p avec p premier est abélien.

Démonstration : Soit x un élément de G . Alors comme G est fini, $\langle x \rangle$ est aussi fini, donc x est d'ordre fini q par Proposition 3.18. Cet ordre q divise p qui est premier, donc on a $q = 1$ ou $q = p$. Si $q = 1$ alors $x = x^1 = e$. Sinon, $x \neq e$, et $\langle x \rangle$ est un sous-groupe de G d'ordre p . Donc on a $\langle x \rangle = G$ qui est cyclique. $\square$

On a en fait une version plus générale du théorème de Lagrange (appliquée pour $K = \{1_K\}$).

Théorème 4.9

Soit G un groupe et H et K deux sous-groupes tels que $K \subset H$. Alors $[G : K]$ est fini si et seulement si $[G : H]$ et $[H : K]$ sont finis, et alors on a l'égalité :

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

Démonstration : Notons $g_i H$, $i \in I$ les classes à gauche (deux à deux disjointes) de H et $h_j K$, $j \in J$ les classes à gauche (deux à deux disjointes) de K . On veut montrer que les $g_i h_j K$, $i \in I$, $j \in J$ sont les classes à gauche deux à deux distinctes de K dans G . Soit $g \in G$, alors, il existe $i \in I$ et $h \in H$ tels que $g = g_i h$. Comme $h \in H$, il existe $j \in J$ et $k \in K$ tels que $h = h_j k$, donc on a $g = g_i h = g_i h_j k$. On a donc $G = \bigcup_{i \in I, j \in J} g_i h_j K$. Montrons que cette union est disjointe. Soit $g = g_i h_j k = g_{i'} h_{j'} k'$. Alors comme $g \in g_i H \cap g_{i'} H$, on a forcément $i = i'$. D'où $h_j k = h_{j'} k'$, c'est un élément de $h_j K \cap h_{j'} K$, on a $j = j'$, ce qui implique que $k = k'$ et que

$$g_i h_j K \cap g_{i'} h_{j'} K \neq \emptyset \Rightarrow g_i h_j K = g_{i'} h_{j'} K.$$

L'ensemble quotient G/K est donc en bijection avec l'ensemble $I \times J$. Donc cet ensemble est fini si et seulement si I et J sont finis. LA formule $|I \times J| = |I| \cdot |J|$ nous donne le résultat.

$\square$

4.3 Groupe quotient

Théorème 4.10

Soit H un sous-groupe de G , et notons $p : G \rightarrow G/H$ la projection canonique. Alors on a l'équivalence entre les assertions suivantes :

1. $H \triangleleft G$;
2. il existe une loi de groupe sur l'ensemble G/H telle que la projection p soit un morphisme de groupes.

Dans ce cas on a pour tous x, y dans G l'égalité

$$\bar{x}.\bar{y} = \overline{x.y}.$$

Démonstration : 1. $\Rightarrow$ 2. Supposons $H \triangleleft G$. On doit montrer que la loi définie par $\bar{x}.\bar{y} = \overline{x.y}$ est bien définie. On doit donc montrer que si $\bar{x} = \bar{x}'$ et $\bar{y} = \bar{y}'$ alors $\overline{x.y} = \overline{x'.y'}$. Supposons donc que $x' = xh_1$ avec $h_1 \in H$ et $y' = yh_2$ avec $h_2 \in H$. Alors on a

$$x'y' = xh_1yh_2 = (xy)(y^{-1}h_1y)h_2 \in xyH$$

car $y^{-1}h_1y \in y^{-1}Hy = H$. La loi est donc bien définie. On vérifie aisément qu'elle est associative, qu'elle a un neutre ($1_G = H$), et que l'inverse de $\bar{x}$ est donné par $\bar{x}^{-1}$. Le fait que p est un morphisme est alors immédiat.

2. $\Rightarrow$ 1. Notons $*$ la loi sur G/H . On a alors pour tous x, y dans G

$$\bar{x} * \bar{y} = p(x) * p(y) = p(x.y) = \overline{x.y}.$$

La loi est donc celle donnée. Elle est par ailleurs bien définie. Donc si $x \in G$ et $h \in H$ on aura

$$\overline{hx}^{-1} = \overline{hx}.\overline{x}^{-1} = \bar{x}.\bar{x}^{-1} = 1_{G/H} = p(1_G) = H;$$

donc hxh^{-1} est bien dans H ce qui montre que H est bien normal dans G . $\square$

Définition 4.11 Si $H \triangleleft G$, on appelle donc le *groupe quotient* G/H le groupe $(G/H, .)$ défini dans le théorème précédent.

Notons que si G est abélien, n'importe quel sous-groupe H permet de définir un groupe quotient G/H .

L'exemple le plus important est donné par $n\mathbb{Z}$ sous-groupe de $\mathbb{Z}$, qui donne le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ déjà défini auparavant.

4.4 Théorème de factorisation

On a alors un analogue du Théorème 2.11.

Théorème 4.12

Soit G un groupe et H un sous-groupe distingué, on note $p : G \rightarrow G/H$ la projection canonique. Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupe. Alors on a les équivalences

1. il existe $\bar{f} : G/H \rightarrow G'$ telle que $f = \bar{f} \circ p$;
2. $H \subset \text{Ker } f$.

De plus l'application $\bar{f}$ est un morphisme de groupes qui est injectif si et seulement si $H = \text{Ker } f$.

Démonstration :

Supposons qu'il existe un morphisme $g : G/H \rightarrow G'$ tel que $f = g \circ p$. Soit $x \in H$, alors $\bar{x} = \overline{1_G}$. Donc on a $f(x) = g \circ p(x) = g(\bar{x}) = g(\overline{1_G}) = 1_{G'}$ car g est un morphisme de groupe. D'où $x \in \text{Ker } f$.

Supposons maintenant que $H \subset \text{Ker } f$. Montrons que f est constante sur les classes. Si $xy^{-1} \in H$ alors $xy^{-1} \in \text{Ker } f$, c'est-à-dire $f(xy^{-1}) = 1_{G'}$. Comme f est un morphisme, $f(x).f(y)^{-1} = 1_{G'}$, donc $f(x) = f(y)$. Alors par le lemme de factorisation (Lemme ??), il existe $g : G/H \rightarrow G'$ tel que $p \circ g = f$. Il faut vérifier que g est un morphisme de groupe. Soient $\bar{x}, \bar{y} \in G/H$. Alors

$$\begin{aligned} g(\bar{x}.\bar{y}) &= g(p(x).p(y)) \\ &= g \circ p(x.y) && \text{car } p \text{ est un morphisme} \\ &= f(x.y) \\ &= f(x).f(y) && \text{car } f \text{ est un morphisme} \\ &= g(p(x)).g(p(y)) \\ &= g(\bar{x})g(\bar{y}) \end{aligned}$$

Donc g est un morphisme. □

Corollaire 4.13 (1er théorème d'isomorphisme)

Soit G un groupe et $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes. Alors on a un isomorphisme $G/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f$.

Notons qu'avec ce résultat, le résultat suivant se démontre beaucoup plus rapidement.

Corollaire 4.14

Soit $G = \langle x \rangle$ un groupe cyclique d'ordre n . Alors G est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration : On considère le morphisme $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$ donné par $\varphi(m) = x^m$. Alors on a $m \in \text{Ker } \varphi$ si et seulement si $x^m = 1_G$ c'est-à-dire si et seulement si $m \in n\mathbb{Z}$, donc $\text{Ker } \varphi = n\mathbb{Z}$. Comme on a clairement $\text{Im } \varphi = G$, on a la résultat. $\square$

Exemple 4.15 1. On a $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{R} \simeq \mathbb{U} \simeq \text{SO}_2(\mathbb{R})$

2. On a $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}_+^* \simeq \mathbb{U}$ et $\mathbb{C}^*/\mathbb{U} \simeq \mathbb{R}_+^*$.

3. On a $\text{GL}_n(k)/\text{SL}_n(k) \simeq (k^*, \cdot)$

Le théorème de factorisation nous dit qu'on a une bijection entre $\text{Hom}(G/H, G')$ et les morphismes $f \in \text{Hom}(G, G')$ tels que $\text{Ker } f \subset H$. On a la même chose pour les sous-groupes.

Théorème 4.16

Soit $H \triangleleft G$. Alors la projection $p : G \rightarrow G/H$ induit une bijection entre les sous-groupes de G contenant H et les sous-groupes de G/H . Cette bijection se restreint en une bijection entre sous-groupes normaux de G contenant H et sous-groupes normaux de G/H .

Démonstration : Les applications sont données par $H' \mapsto p(H')$ et $K \mapsto p^{-1}(K)$. On va montrer que ces applications sont bien définies, et qu'elles sont réciproques l'une de l'autre.

Soit H' un sous-groupe de G contenant H . Alors $p(H')$ est un sous-groupe de G/H car p est un morphisme. Si de plus H' est distingué dans G , alors $p(H')$ est distingué dans G/H car p est surjective.

Soit maintenant $K < G/H$. Alors $p^{-1}(K)$ est un sous-groupe de G car p est un morphisme. De plus comme $1_{G/H} \in K$, on aura $p^{-1}(1_{G/H}) \subset p^{-1}(K)$. Or $p^{-1}(1_{G/H}) = H$, donc $p^{-1}(K)$ contient H . Si de plus K est distingué, alors son image réciproque par un morphisme est aussi distingué.

Montrons que ces applications sont inverses l'une de l'autre. Soit K un sous-groupe de G/H . Alors pour $\bar{x} \in G/H$, on a les équivalences

$$\begin{aligned}\bar{x} \in p(p^{-1}(K)) &\Leftrightarrow \bar{x} = p(y) \text{ avec } y \in p^{-1}(K) \\ &\Leftrightarrow \bar{x} = p(x) \in K\end{aligned}$$

Autrement dit, on a $K = p^{-1} \circ p(K)$.

Soit maintenant $H < H' < G$. Alors on a

$$\begin{aligned}x \in p^{-1} \circ p(H') &\Leftrightarrow p(x) \in p(H') \\ &\Leftrightarrow \text{il existe } y \in H' \text{ tel que } p(x) = p(y) \\ &\Leftrightarrow \text{il existe } y \in H' \text{ tel que } x^{-1}y \in H \\ &\Leftrightarrow x \in H' \text{ car } H \subset H'\end{aligned}$$

On a donc bien $p^{-1} \circ p(H') = H'$.

□

4.5 Autres théorèmes d'isomorphismes

Théorème 4.17 (2ème théorème d'isomorphisme)

Soit G un groupe, H et K des sous-groupes tels que $H \triangleleft G$. Alors on a

1. $HK := \{hk, h \in H, k \in K\}$ est un sous-groupe de G et $HK = KH$;
2. $H \cap K$ est distingué dans K ;
3. on a un isomorphisme entre HK/H et $K/H \cap K$

Démonstration : On a bien $1_G \in HK$. Soient h_1k_1 et h_2k_2 des éléments de HK , alors on peut écrire

$$h_1k_1h_2k_2 = h_1(k_1h_2k_1^{-1})k_1k_2 \in HK$$

car $k_1h_2k_1^{-1} \in k_1Hk_1^{-1} = H$. Donc HK est stable par multiplication. Par ailleurs on a

$$(hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} = (k^{-1}hk)k^{-1} \in HK$$

donc HK est stable par inverse. Et on a enfin $kh = (khk^{-1})k \in HK$ donc $KH \subset HK$. De même $HK \subset KH$.

Soit $h \in H \cap K$ et $k \in K$. Alors $khk^{-1} \in H$ puisque $H \triangleleft G$, et $khk^{-1} \in K$ car k, h et h^{-1} sont dans K . Le sous-groupe $H \cap K$ est bien distingué dans K .

Considérons l'application $\phi : HK \rightarrow K/H \cap K$ définie par $\phi(hk) = \bar{k}$. Montrons d'abord qu'elle est bien définie, en effet, tout élément $g \in HK$ s'écrit hk , mais la décomposition n'est pas forcément unique. Si $hk = h'k'$, alors on a $k'k^{-1} = h'^{-1}h$, donc $\bar{k}' = \bar{k}$. L'application est donc bien définie. C'est un morphisme car

$$\phi(gg') = \phi(hkh'h'k') = \phi((hkh'h'k^{-1})kk') = \bar{k}\bar{k}' = \bar{k}\bar{k}' = \phi(g)\phi(g').$$

Enfin, un élément $g = hk$ est dans le noyau de ϕ si et seulement si $k \in H \cap K$, c'est-à-dire si et seulement si $k \in H$, autrement dit si $g \in H$. Par le théorème de factorisation, on a donc un morphisme injectif $\bar{\phi} : HK/H \rightarrow K/H \cap K$. Comme ϕ est clairement surjectif, il en est de même pour $\bar{\phi}$.

□

Théorème 4.18 (Troisième théorème d'isomorphisme)

Soit G un groupe, et H et K deux sous-groupes normaux de G tels que K est inclus dans H . Alors le sous-groupe H/K est normal dans G/K et on a un isomorphisme

$$G/K / H/K \simeq G/H.$$

Démonstration : Notons $p_H : G \rightarrow G/H$ et $p_K : G \rightarrow G/K$ les projections. On a alors $H/K = p_K(H)$ qui est un sous-groupe distingué de G/K car $H \triangleleft G$

(cf proposition sur les sous-groupes). Notons alors $p_{H/K} : G/K \rightarrow G/K/H/K$ la projection. On considère l'application $\varphi := p_{H/K} \circ p_K$. C'est un morphisme de G dans $G/K/H/K$. Il est surjectif comme composée d'applications surjective. Pour $x \in G$, on aura alors

$$\begin{aligned} \varphi(x) = 1_{G/K/H/K} &\Leftrightarrow p_K(x) \in H/K \\ &\Leftrightarrow xK \in H/K \\ &\Leftrightarrow \text{il existe } h \in H \text{ tel que } xK = hK \\ &\Leftrightarrow x \in H. \end{aligned}$$

On a donc $\text{Ker}\varphi = H$, et on conclut par le premier théorème d'isomorphisme. $\square$

Chapitre III

Le groupe symétrique

1 Permutations

1.1 Définition et notations

Définition 1.1 Soit E un ensemble fini. On appelle *permutation* de E , une bijection de E dans E . On note $\mathfrak{S}_E$ ou $\mathcal{S}_E$ l'ensemble des permutations de E .

Si $E = \{1, \dots, n\}$, on note $\mathfrak{S}_n$ son ensemble des permutations.

Théorème 1.2

Soit E un ensemble fini de cardinal $n \geq 1$. L'ensemble $\mathfrak{S}_E$ muni de la loi $\circ$ de composition est un groupe fini de cardinal $n!$.

Si de plus F est un ensemble de cardinal n , alors toute bijection de E dans F induit un isomorphisme de groupes $\mathfrak{S}_E \rightarrow \mathfrak{S}_F$.

Démonstration : On a déjà vu que $\mathfrak{S}_E$ a une structure de groupe. Si $E = \{e_1, \dots, e_n\}$, la donnée de $\sigma \in \mathfrak{S}_E$ équivaut à la donnée de $(\sigma(e_1), \dots, \sigma(e_n))$. On a n possibilités pour $\sigma(e_1)$, mais seulement $n - 1$ pour $\sigma(e_2)$ car σ est une bijection, etc... donc le cardinal est bien $n!$.

Soit $\varphi : E \rightarrow F$ une bijection. Alors on définit $\Phi : \mathfrak{S}_E \rightarrow \mathfrak{S}_F$ par $\Phi(\sigma) = \varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1}$. On vérifie facilement que c'est un isomorphisme de groupes. $\square$

Le but de ce chapitre est de comprendre le groupe $\mathfrak{S}_n$, qu'on appelle aussi le *groupe symétrique*, et on notera $E = \{1, \dots, n\}$.

Notation : Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on notera

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Par exemple $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

et $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

1.2 Support d'une permutation

Définition 1.3 Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. On définit $\text{Supp}(\sigma) := \{a \in E \mid \sigma(a) \neq a\}$. C'est le *support* de σ . Les éléments $a \in E$ tel que $\sigma(a) = a$ sont appelés les *points fixes* de σ .

Proposition 1.4

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors on a les propriétés suivantes :

1. $\text{Supp}(\sigma) = \emptyset \Leftrightarrow \sigma = \text{Id}_E$;
2. $\text{Supp}(\sigma^{-1}) = \text{Supp}(\sigma)$
3. $\sigma(\text{Supp}(\sigma)) = \text{Supp}(\sigma)$
4. $\text{Supp}(\sigma^n) \subset \text{Supp}(\sigma) \forall n \in \mathbb{Z}$
5. $\text{Supp}(\sigma \circ \sigma') \subset \text{Supp}(\sigma) \cup \text{Supp}(\sigma')$ et si $\text{Supp}(\sigma) \cap \text{Supp}(\sigma') = \emptyset$ alors on a égalité. On dit alors que σ et σ' sont *à supports disjoints* .

Démonstration :

1. clair
2. On a

$$\begin{aligned} a \notin \text{Supp}(\sigma) &\Leftrightarrow \sigma(a) = a \\ &\Leftrightarrow a = \sigma^{-1}(a) \\ &\Leftrightarrow a \notin \text{Supp}(\sigma^{-1}) \end{aligned}$$

3. Soit $b \in \sigma(\text{Supp}(\sigma))$, alors $b = \sigma(a)$ avec $\sigma(a) \neq a$. Comme σ est injective, on a donc $\sigma^2(a) \neq \sigma(a)$, c'est à dire $\sigma(b) \neq b$. Et on a $\sigma(\text{Supp}(\sigma)) \subset \text{Supp}(\sigma)$.

De la même façon, on a donc $\sigma^{-1}(\text{Supp}(\sigma^{-1})) \subset \text{Supp}(\sigma^{-1})$. En appliquant σ de chaque côté on obtient $\text{Supp}(\sigma^{-1}) \subset \sigma(\text{Supp}(\sigma^{-1}))$, et en appliquant le point 2., on obtient $\text{Supp}(\sigma) \subset \sigma(\text{Supp}(\sigma))$.

4. Soit $b \notin \text{Supp}(\sigma)$, alors $\sigma(b) = b$, et donc $\sigma^n(b) = b$ autrement dit $b \notin \text{Supp}(\sigma^n)$.
5. Soit $a \notin \text{Supp}(\sigma) \cup \text{Supp}(\sigma')$, cela signifie $a \notin \text{Supp}(\sigma)$ et $a \notin \text{Supp}(\sigma')$, donc $\sigma(a) = a$ et $\sigma'(a) = a$. Donc $\sigma \circ \sigma'(a) = \sigma(a) = a$ et donc $a \notin \text{Supp}(\sigma \circ \sigma')$.

Supposons maintenant que $\text{Supp}(\sigma) \cap \text{Supp}(\sigma') = \emptyset$. Soit $a \notin \text{Supp}(\sigma \circ \sigma')$, alors $\sigma \circ \sigma'(a) = a$. Supposons $a \in \text{Supp}(\sigma')$, alors $\sigma'(a) = b \neq a$, et donc $\sigma(\sigma'(a)) = \sigma(b) = a \neq b$ donc $a \in \text{Supp}(\sigma)$. Ce qui est impossible car $\text{Supp}(\sigma) \cap \text{Supp}(\sigma') = \emptyset$. On a donc $a \notin \text{Supp}(\sigma')$, autrement dit $\sigma'(a) = a$. Et comme $\sigma'(\sigma(a)) = a$, on obtient $\sigma(a) = a$, c'est-à-dire $a \notin \text{Supp}(\sigma)$.

□

Lemme 1.5

Deux permutations à supports disjoints commutent.

Démonstration : Soient σ et σ' deux telles permutations.

Soit $a \in E$. Si a n'est ni dans le support de σ , ni dans celui de σ' , alors on a $\sigma \circ \sigma'(a) = \sigma(a) = a$ et $\sigma' \circ \sigma(a) = \sigma'(a) = a$.

Soit $a \in \text{Supp}(\sigma)$, alors par hypothèse, $a \notin \text{Supp}(\sigma')$. On a donc $\sigma \circ \sigma'(a) = \sigma(a)$. De plus par le point 3. précédent, on a que $\sigma(a) \in \text{Supp}(\sigma)$, et donc $\sigma(a)$ est fixé par σ' . On a donc $\sigma'(\sigma(a)) = \sigma(a)$.

De même si $a \notin \text{Supp}(\sigma')$. Donc on a bien pour tout a dans E , $\sigma' \circ \sigma(a) = \sigma \circ \sigma'(a)$.

□

1.3 Orbites

Définition 1.6 Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $a \in E$. On définit *l'orbite* de a sous l'action de σ comme le sous-ensemble

$$\mathcal{O}_\sigma(a) := \{a, \sigma(a), \sigma^2(a), \dots\} \subset E.$$

Remarquons que a est un point fixe de σ si et seulement si $\mathcal{O}_\sigma(a) = \{a\}$.

Lemme 1.7

On a $\mathcal{O}_\sigma(a) = \{\sigma^m(a), m \in \mathbb{Z}\}$. Et si le cardinal de $\mathcal{O}_\sigma(a)$ est p , alors p est le plus petit entier tel que $\sigma^p(a) = a$ et on a

$$\mathcal{O}_\sigma(a) := \{a, \sigma(a), \sigma^2(a), \dots, \sigma^{p-1}(a)\}.$$

Démonstration : Notons tout d'abord que σ est d'ordre fini puisqu'élément d'un groupe fini. Donc il existe m tel que $\sigma^m(a) = a$. Notons p le plus petit entier > 0 vérifiant $\sigma^p(a) = a$.

On va montrer l'inclusion

$$\{\sigma^m(a), m \in \mathbb{Z}\} \subset \{a, \sigma(a), \sigma^2(a), \dots, \sigma^{p-1}(a)\},$$

et que les éléments de l'ensemble de droite sont tous distincts, ce qui montrera toutes les égalités.

Soit $n \in \mathbb{Z}$, et soit $n = pq + r$ la division euclidienne de n par p . On a alors $\sigma^n(a) = \sigma^r(a)$ donc on a l'inclusion demandée. De plus si $0 \leq j \leq k \leq p-1$ sont tels que $\sigma^j(a) = \sigma^k(a)$, alors $\sigma^{k-j}(a) = a$. Par minimalité de p , on en déduit $j - k = 0$, et donc les p éléments de l'ensemble de droite sont 2 à 2 distincts.

□

Exemple 1.8 Prenons la permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$. Alors on a $\mathcal{O}(1) = \{1, 3, 6, 5\} = \mathcal{O}(3)$ et $\mathcal{O}(2) = \mathcal{O}(4) = \{2, 4\}$.

Proposition 1.9

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. L'ensemble des orbites sous l'action de σ forme une partition de E .

Démonstration : Tout $a \in E$ est dans son orbite $\mathcal{O}_\sigma(a)$, on a donc que l'union des orbites recouvre E . Montrons que cette union est disjointe. Soit $x \in \mathcal{O}_\sigma(a) \cap \mathcal{O}_\sigma(b)$, alors on a $x = \sigma^k(a) = \sigma^\ell(b)$ pour un k et un ℓ dans $\mathbb{Z}$. On aura donc $\sigma^{k-\ell}(a) = b$ et $\sigma^{\ell-k}(b) = a$, et donc $\mathcal{O}_\sigma(a) = \mathcal{O}_\sigma(b)$.

□

2 Cycles et décompositions

2.1 Cycles

Définition 2.1 Un *cycle* est une permutation ayant une unique orbite non triviale. On parle de *m-cycle* lorsque m est le cardinal de cette orbite non triviale. Un 2-cycle est aussi appelé une *transposition*.

Notation : Si σ est un m -cycle, on notera $\sigma = (a, \sigma(a), \dots, \sigma^{m-1}(a))$, où $\mathcal{O}_\sigma(a)$ est l'orbite non triviale.

Exemple 2.2 Par exemple $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 6 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ est un 5-cycle. On le note (13654).

La permutation $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ n'est pas un cycle, car il a deux orbites non triviales $\mathcal{O}(1) = \{1, 3, 6, 5\}$ et $\mathcal{O}(2) = \{2, 4\}$.

Proposition 2.3

Si σ est un m -cycle, alors σ est d'ordre m et $\langle \sigma \rangle \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Démonstration : Soit $\mathcal{O}_\sigma(a)$ l'orbite non triviale. Alors on a vu par le lemme précédent que m est le plus petit entier tel que $\sigma^m(a) = a$. Montrons que $\sigma^m(b) = b$ pour tout $b \in E$. Si $b \in \mathcal{O}_\sigma(a)$, alors $b = \sigma^k(a)$, et donc $\sigma^m(b) = \sigma^{k+m}(a) = \sigma^k(a) = b$. Si $b \notin \mathcal{O}_\sigma(a)$, alors b est un point fixe, c'est-à-dire $\sigma(b) = b$, donc $\sigma^m(b) = b$. On a donc bien $\sigma^m = \text{Id}$. Par minimalité de m , c'est bien l'ordre de σ . $\square$

2.2 Théorème de décomposition

Théorème 2.4

Toute permutation s'écrit de manière unique comme produit de cycles à supports disjoints.

Regardons d'abord sur un exemple comment on décompose une permutation en produit de cycles.

On a $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 6 & 7 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = (1375) \circ (26) = (26) \circ (1375)$. On voit qu'il faut prendre les cycles correspondants aux orbites non triviales de σ .

Démonstration : Soit σ une permutation. On va donc noter $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_p$ les orbites non triviales de σ . Puis on définit pour tout $i = 1, \dots, p$ une permutation c_i par $c_i(x) = x$ si $x \notin \mathcal{O}_i$ et $c_i(x) = \sigma(x)$ si $x \in \mathcal{O}_i$.

Notons tout d'abord que si $x \in \mathcal{O}_i$, si et seulement si $c_i(x) \in \mathcal{O}_i$. Montrons maintenant que c_i est une permutation, il suffit de montrer que c'est injectif. Si $c_i(x) = c_i(y)$, alors si $x \notin \mathcal{O}_i$, on a $c_i(x) = x = c_i(y)$ n'est pas dans $\mathcal{O}_i$, donc y n'est pas dans $\mathcal{O}_i$. Et donc $c_i(y) = y$ et donc $x = y$. Si maintenant $x \in \mathcal{O}_i$, alors $c_i(x) = c_i(y)$ est aussi dans $\mathcal{O}_i$, et donc $y \in \mathcal{O}_i$. On a donc $\sigma(x) = c_i(x) = c_i(y) = \sigma(y)$, donc $x = y$.

On va maintenant montrer que c_i est un cycle dont le support est $\mathcal{O}_i$. Une récurrence immédiate montre que si $x \in \mathcal{O}_i$, alors pour tout $\ell \in \mathbb{N}$, $c_i^\ell(x) = \sigma^\ell(x)$. Pour $x \in \mathcal{O}_i$, on a donc $\mathcal{O}_{c_i}(x) = \{x, \sigma(x), \dots\} = \mathcal{O}_\sigma(x) = \mathcal{O}_i$. Comme c_i fixe tous les éléments en dehors de $\mathcal{O}_i$, c_i n'a donc qu'une seule orbite qui est $\mathcal{O}_i$.

Comme les orbites $\mathcal{O}_i$, les c_i commutent.

Montrons maintenant que $\sigma = c_1 \circ c_2 \cdots c_p$. Soit $x \in E$. Si x n'est dans aucun des $\mathcal{O}_i$, alors x est fixé par tous les c_i , et on a donc $c_1 \cdots c_p(x) = x = \sigma(x)$. Si $x \in \mathcal{O}_i$, alors il n'est pas dans les autres $\mathcal{O}_j$ pour $j \neq i$. On a donc

$$c_1 \cdots c_p(x) = c_i \circ c_1 \cdots c_{i-1} c_{i+1} \cdots c_p(x) = c_i(x) = \sigma(x).$$

Montrons enfin l'unicité. Supposons que $\sigma = c'_1 \cdots c'_q$ à support disjoints, et notons $\mathcal{O}'_i$ l'orbite non triviale de c'_i . Alors par la proposition 1.4 5., on a $\text{Supp}(\sigma) = \mathcal{O}'_1 \cup \dots \cup \mathcal{O}'_q$, et l'union est disjointe. Montrons que chaque $\mathcal{O}'_i$ est une orbite de σ . En effet si $x \in \mathcal{O}'_i$, alors x est un point fixe pour tous les autres c'_j , et donc $\sigma(x) = c'_i(x)$. Par une récurrence immédiate on a alors que $\sigma^\ell(x) = (c'_i)^\ell(x)$, et donc $\mathcal{O}'_i = \mathcal{O}_\sigma(x)$.

□

Exemple 2.5 On a $(1243)(25617)(346) = (174256)$.

Proposition 2.6

Soit $\sigma = c_1 \dots c_p$ la décomposition de σ en produit de cycles à supports disjoints, alors

$$\text{ord}(\sigma) = \text{ppcm}(\text{ord}(c_1), \dots, \text{ord}(c_p)).$$

Démonstration : Soit q le ppcm des ordres des c_i . Alors l'ordre de chaque c_i divise q et donc $c_i^q = \text{Id}_E$. On a donc $\sigma^q = (c_1 \dots c_p)^q = c_1^q \dots c_p^q = \text{Id}_E$.

Supposons maintenant que $\sigma^m = \text{Id}_E$, alors on a $c_1^m \dots c_p^m = \text{Id}_E$. Le support de c_i^m est inclus dans le support de c_i , donc les supports des c_i^m sont disjoints. On a donc nécessairement $c_i^m = \text{Id}_E$ pour tout i , et donc m divise le ppcm de l'ordre des c_i . □

Exemple 2.7 On a $(123)(25164) = (1643)(25)$ est d'ordre 4.

2.3 Classes de conjugaison dans $\mathfrak{S}_n$ **Lemme 2.8**

Soit $c = (i_1, \dots, i_m)$ un m -cycle, et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors $\sigma c \sigma^{-1} = (\sigma(i_1) \dots, \sigma(i_m))$. En particulier le conjugué d'un m -cycle est un m -cycle.

Démonstration : Soit $a \in E$. Si a est de la forme $\sigma(i_j)$, alors on a bien $\sigma \circ c \circ \sigma^{-1}(a) = \sigma(i_{j+1})$. Si a n'est pas de cette forme, alors $\sigma^{-1}(a)$ est fixé par c et donc a est fixé par $\sigma \circ c \circ \sigma^{-1}$. □

Théorème 2.9

Deux permutations σ et σ' sont conjuguées dans $\mathfrak{S}_n$ si et seulement si la liste (avec éventuellement répétition) des longueurs des cycles dans leur décomposition en cycles à supports disjoints coïncident (on dit dans ce cas que σ et σ' ont même type.)

Démonstration : Soit $\sigma = c_1 \dots c_p$ la décomposition en cycles de σ , et soit τ une permutation quelconque. Alors on a

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau c_1 \tau^{-1}) \dots \tau c_p \tau^{-1}.$$

Par le lemme les $\tau c_i \tau^{-1}$ sont des cycles de même longueurs dont le support est $\tau(O_i)$ (où O_i est le support de c_i). Ces supports sont donc disjoints, et

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau c_1 \tau^{-1}) \dots \tau c_p \tau^{-1}$$

est bien la décomposition en cycle à supports disjoints de $\tau\sigma\tau^{-1}$. Elles ont donc même type.

Soient maintenant $\sigma = c_1 \dots c_p$ et $\sigma' = c'_1 \dots c'_p$ deux permutations de même type. Quitte à renuméroter les c_i , on peut supposer que l'ordre de c_i m_i est le même que celui de c'_i . Pour $i = 1, \dots, p$, notons $c_i := (j_1, \dots, j_{m_i})$ et $c'_i := (k_1, \dots, k_{m_i})$. On définit alors une bijection $f : O_i \rightarrow O'_i$ par $f(j_\ell) := k_\ell$. Cela définit une bijection du support de σ dans le support de σ' . On peut la prolonger en une bijection de E dans E (en prenant n'importe quelle bijection entre les points fixes de σ et les points fixes de σ'). On aura alors $f c_i f^{-1} = c'_i$, et par suite $\sigma' = f \sigma f^{-1}$.

□

Exemple 2.10 Les permutations $\sigma = (134)(25)$ et $\sigma' = (346)(17)$ sont conjuguées (dans $\mathfrak{S}_7$, mais aussi dans $\mathfrak{S}_8$) par

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 4 & 6 & 7 & 2 & 5 \end{pmatrix} = (13462)(57)$$

Noter que l'élément conjuguant ces deux permutations n'est pas du tout unique.

Exemple 2.11 Il y a 5 classes de conjugaisons dans $\mathfrak{S}_4$ de cardinal respectifs 1 (identité), 6 (transpositions), 8 (3-cycles), 3 (double transpositions) et 6 (4-cycles).

2.4 Générateurs de $\mathfrak{S}_n$

Théorème 2.12

Le groupe $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions.

Démonstration : Il suffit d'après le théorème précédent de montrer que les cycles sont des produits de transpositions. Or on vérifie facilement que $(a_1 \dots a_\ell) = (a_1 a_2)(a_2 a_3) \dots (a_{\ell-1} a_\ell)$. $\square$

Théorème 2.13

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_n &= \langle (i, i+1), i = 1, \dots, n-1 \rangle \\ &= \langle (1i), i = 2, \dots, n \rangle \\ &= \langle (12), (12 \dots n) \rangle.\end{aligned}$$

Démonstration : On a $(i, j) = (j-1, j) \dots (i+1, i+2)(i, i+1)(i+1, i+2) \dots (j-1, j)$ ce qui suffit à démontrer la première égalité.

On a $(i, j) = (1, i)(1, j)(1, i)$. Ce qui montre la seconde.

Enfin notons $c = (12 \dots n)$, alors on a $(i, i+1) = c^{i-1}(12)c^{i-1}$, ce qui montre la dernière. $\square$

Proposition 2.14

Pour $n \geq 2$, le centre de $\mathfrak{S}_n$ est réduit au neutre.

Démonstration : Soit σ dans le centre de $\mathfrak{S}_n$, alors σ commute avec n'importe quelle transposition. En particulier on doit avoir $\sigma(1i)\sigma^{-1} = (1i)$. Or on a $\sigma(1i)\sigma^{-1} = (\sigma(1)\sigma(i))$. Si $\sigma(1) = 1$, alors on aura pour tout $i \geq 2$, $\sigma(i) = i$, c'est-à-dire $\sigma = \text{Id}$. Si $\sigma(1) \neq 1$, on aura alors $\sigma(i) = 1$ et ceci pour tout $i \neq 1$. Cette égalité n'est possible que si $n \leq 2$. $\square$

3 Signature et groupe alterné

3.1 Signature

Définition 3.1 Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. La *signature* de σ est $\epsilon(\sigma) = (-1)^{n-m}$ où m est le nombre d'orbites de σ . On dit que σ est *paire* si $\epsilon(\sigma) = 1$ et *impaire* si $\epsilon(\sigma) = -1$.

Exemple 3.2 — $\epsilon(\text{Id}_E) = (-1)^{n-n} = 1$.

— Si σ est un ℓ -cycle, il a alors $1+n-\ell$ orbites. On a donc $\epsilon(\sigma) = (-1)^{\ell-1}$.

En particulier la signature d'une transposition est -1 .

— $\epsilon((18)(27463)) = (-1)^{9-4} = -1$

Lemme 3.3

Si $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et τ est une permutation, alors on a $\epsilon(\sigma \circ \tau) = -\epsilon(\sigma)$.

Démonstration : Notons $\sigma = c_1 \dots c_p$ la décomposition de σ en cycles à supports disjoints. On va montrer que le nombre d'orbites de $\sigma \circ \tau$ est un de plus ou un de moins que le nombre d'orbites de σ .

Notons $\tau = (ab)$. On va distinguer quatre cas selon que a, b appartiennent aux orbites des c_i .

Cas 1 : a et b n'appartiennent pas au support de σ .

Dans ce cas, $c_1 \dots c_p \tau$ est la décomposition en produit de cycles à supports disjoints. Donc son nombre d'orbites est 1 de moins que celles de σ .

Cas 2 : $a \in \text{Supp}(c_i)$ et b n'appartient pas au support de σ .

Notons $c_i = (a, a_2, \dots, a_s)$. La permutation τ commute avec tous les autres c_j et on a $c_i \circ (ab) = (a, b, a_2, \dots, a_s)$. Le nombre d'orbites a donc diminué de 1.

Cas 3 : $a, b \in \text{Supp}(c_i)$.

Dans ce cas τ commute avec tous les c_j sauf c_i . Notons $c_i = (a_1, \dots, a_s)$ avec $a_1 = a$ et $a_t = b$. On a alors $c_i \circ \tau = (a_1, a_{t+1}, a_{t+2}, \dots, a_s)(a_2, a_3, \dots, a_t)$. Le nombre d'orbites a donc augmenté de 1.

Cas 4 : $a \in \text{Supp}(c_i)$ et $b \in \text{Supp}(c_j)$ pour $i \neq j$.

Notons $c_i = (a, a_2, \dots, a_s)$ et $c_j = (b, b_2, \dots, b_q)$. On a $c_i c_j \tau = (a, b_2, \dots, b_q, b, a_2, \dots, a_s)$. Le nombre d'orbites a donc diminué de 1.

□

Corollaire 3.4

L'application $\epsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{+1, -1\}$ est un morphisme de groupes.

Démonstration : En effet le lemme précédent permet de montrer par un récurrence immédiate que si $\tau_1, \dots, \tau_m$ sont des permutations, alors $\epsilon(\tau_1 \dots \tau_m) = (-1)^m$. On voit alors immédiatement que c'est un morphisme de groupes. $\square$

Théorème 3.5

La signature est l'unique morphisme de groupes $\mathfrak{S}_n \rightarrow \mathbb{C}^*$ non trivial.

Démonstration : Soit $\phi : \mathfrak{S}_n \rightarrow \mathbb{C}^*$ un morphisme de groupes. Soit τ une transposition. Comme $\tau^2 = \text{Id}_E$, on doit avoir $\phi(\tau)^2 = 1$, autrement dit $\phi(\tau) = \pm 1$.

Supposons qu'il existe une transposition τ telle que $\phi(\tau) = 1$. Alors comme les transpositions sont toutes conjuguées, toute autre transposition τ' est de la forme $\sigma\tau\sigma^{-1}$ et donc

$$\phi(\tau') = \phi(\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1}) = \phi(\sigma)\phi(\tau)\phi(\sigma)^{-1} = \phi(\tau) = 1.$$

Comme toute permutation est produit de transpositions, on aura donc $\phi(\sigma) = 1$ pour tout σ .

Si maintenant $\phi(\tau) = -1$ pour toute transposition, alors, ϕ est bien la signature.

$\square$

Théorème 3.6

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors on a la formule

$$\epsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}.$$

Démonstration : Notons $f : \mathfrak{S}_n \rightarrow \mathbb{C}^*$ la fonction donnée par cette formule. On va montrer que f est un morphisme de groupes non trivial.

Notons tout d'abord que f est à valeurs $+1$ ou -1 . En effet comme σ est une bijection, on a $\prod_{i < j} |\sigma(j) - \sigma(i)| = \prod_{i < j} (j - i)$.

Soit $\tau = (k, k+1)$. Pour montrer que $f(\tau) = -1$, il suffit donc de montrer que $\prod_{i < j} \tau(j) - \tau(i)$ est négatif.

Si $i < k$ alors $\tau(j) - \tau(i) = \tau(j) - i$ est positif. Si $j > k+1$, alors $\tau(j) - \tau(i) = j - \tau(i)$ est aussi toujours positif. Il reste donc le cas où $i = k$ et $j = k+1$, dans ce cas $\tau(j) - \tau(i) = k - (k+1) = -1$. Donc finalement, le produit est négatif, et $f(\tau) = -1$.

On va maintenant montrer que f est un morphisme de groupes. On a

$$\begin{aligned} f(\sigma_1 \circ \sigma_2) &= \prod_{i < j} \frac{\sigma_1 \sigma_2(j) - \sigma_1 \sigma_2(i)}{j - i} \\ &= \prod_{i < j} \frac{\sigma_1 \sigma_2(j) - \sigma_1 \sigma_2(i)}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} \cdot \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i} \\ &= \prod_{i < j} \frac{\sigma_1 \sigma_2(j) - \sigma_1 \sigma_2(i)}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} \prod_{i < j} \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i} \\ &= \prod_{i < j} \frac{\sigma_1 \sigma_2(j) - \sigma_1 \sigma_2(i)}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} f(\sigma_2) \end{aligned}$$

Par ailleurs on a

$$A = \prod_{i < j} \frac{\sigma_1 \sigma_2(j) - \sigma_1 \sigma_2(i)}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} = \prod_{i < j, \sigma_2(i) < \sigma_2(j)} \frac{\sigma_1 \sigma_2(j) - \sigma_1 \sigma_2(i)}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} \prod_{i < j, \sigma_2(i) > \sigma_2(j)} \frac{\sigma_1 \sigma_2(j) - \sigma_1 \sigma_2(i)}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}$$

En effectuant le changement de variables $k = \sigma_2(i)$ et $\ell = \sigma_2(j)$ dans le premier terme et $k = \sigma_2(j)$, $\ell = \sigma_2(i)$ dans le deuxième, on obtient

$$\begin{aligned} A &= \prod_{\sigma_2^{-1}(k) < \sigma_2^{-1}(\ell), k < \ell} \frac{\sigma_1(\ell) - \sigma_1(k)}{\ell - k} \prod_{\sigma_1^{-1}(\ell) < \sigma_1^{-1}(k), k < \ell} \frac{\sigma_1(k) - \sigma_1(\ell)}{\ell - k} \\ &= \prod_{k < \ell} \frac{\sigma_1(\ell) - \sigma_1(k)}{\ell - k} \\ &= f(\sigma_1). \end{aligned}$$

On obtient donc bien $f(\sigma_1 \circ \sigma_2) = f(\sigma_1)f(\sigma_2)$.

□

3.2 Le groupe alterné

Le noyau d'un morphisme de groupes étant un sous-groupe, il est donc naturel d'introduire la définition suivante :

Définition 3.7 Le *groupe alterné* $\mathfrak{A}_n$ est le noyau de la signature, c'est donc un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$. Il contient toutes les permutations de signature 1.

Exemple 3.8 On a $\mathfrak{A}_2 = \{\text{Id}_E\}$.

On a $\mathfrak{A}_3 = \{\text{Id}_E, (123), (132)\}$. Il est abélien isomorphe à $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

Le groupe $\mathfrak{A}_4$ contient 12 éléments : l'identité, 3 doubles transpositions, et 8 3-cycles. Il n'est pas abélien.

Proposition 3.9

Le cardinal du groupe $\mathfrak{A}_n$ est $\frac{n!}{2}$.

Démonstration : Par le théorème de factorisation, la signature $\epsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{+1, -1\}$ se factorise en une application $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n \rightarrow \{+1, -1\}$. Cette application est clairement surjective, et elle est injective. On a donc $\sharp(\mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n) = 2$. On conclut par le théorème de Lagrange.

□

Théorème 3.10

Le groupe alterné est engendré par les 3-cycles.

Démonstration : Les éléments du groupe alterné sont des produits d'un nombre paire de transpositions. Il suffit de démontrer que le produit de deux transpositions est toujours un produit de 3-cycles. Or on a $(ij)(jk) = (ijk)$ et $(ij)(k\ell) = (ijk)(jkl)$.

□

3.3 Simplicité du groupe alterné

Définition 3.11 Un groupe G est dit *simple* si il n'a aucun sous-groupe distingué non trivial (i.e. non égal à $\{1_G\}$ et à G).

Exemple 3.12 On a que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est simple si et seulement si n est premier.

Lemme 3.13

Pour $n \geq 5$, l'ensemble des 3-cycles forment une classe de conjugaison de $\mathfrak{A}_n$.

Notons tout de suite que l'hypothèse $n \geq 5$ est importante. Le groupe $\mathfrak{A}_3$ est abélien (car de cardinal 3), donc ses classes de conjugaisons sont toutes des singletons, et (123) n'est pas conjugué à (132) . Que se passe-t-il dans $\mathfrak{A}_4$?

Démonstration : On sait déjà que le conjugué dans $\mathfrak{A}_n$ d'un 3-cycle est un 3-cycle puisqu'il l'est dans $\mathfrak{S}_n$. Montrons que (abc) est conjugué à (123) . On sait déjà qu'il existe $\tau \in \mathfrak{S}_n$ tel que $\tau(123)\tau^{-1} = (abc)$. Si τ est paire on n'a rien à faire. Si τ est impaire on remarque que

$$\tau(45)(123)(45)\tau^{-1} = \tau(123)\tau^{-1} = (abc)$$

et $\tau(45)$ est bien paire. □

Théorème 3.14

Pour $n \neq 4$, le groupe $\mathfrak{A}_n$ est simple.

Démonstration : Le cas $n = 3$ est facile à traiter car alors $\mathfrak{A}_3$ est d'ordre 3, donc n'a aucun sous-groupe propre puisque 3 est premier.

Supposons $n \geq 5$. Soit H un sous-groupe normal non réduit au neutre de $\mathfrak{A}_n$. On va montrer que $H = \mathfrak{A}_n$. Comme les 3-cycles engendrent $\mathfrak{A}_n$, il suffit de montrer que H contient tous les 3-cycles. De plus comme H est normal, et que tous les 3-cycles sont conjugués, il suffit de montrer que H contient un 3-cycle.

On va d'abord montrer que H contient une permutation σ_0 différente de Id dont le cardinal du support est inférieur ou égal à 5.

Soit $\sigma \in H$ avec $\sigma \neq \text{Id}$. Soit b dans son support. Notons $a := \sigma(b)$, prenons c tel que $c \neq a, b\sigma^{-1}(b)$, et notons $\tau := (abc)$. On va montrer que $\sigma_0 := \tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$ vérifie la propriété demandée. Tout d'abord, on a $\sigma_0 \in H$. En effet, $\sigma \in H$ et $\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}$ est aussi dans H car H est distingué. Ensuite on a $\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(a)\sigma(b)\sigma(c)) = (\sigma(a)a\sigma(c))$ donc

$$\sigma_0 = (\sigma(a)a\sigma(b))(acb)$$

dont le support a au plus 5 éléments. Enfin on a $\sigma_0(b) = \sigma(c) \neq b$ donc σ_0 n'est pas l'identité.

Supposons que le support de σ_0 a exactement 4 éléments. C'est alors nécessairement une double transposition car un 4-cycle est impaire. Notons le $\sigma_0 = (ab)(cd)$. Alors en prenant $\tau = (abe)$ avec $e \neq a, b, c, d$ (un tel e existe car $n \geq 5$, et e), on obtient

$$\sigma_0\tau\sigma_0^{-1}\tau^{-1} = (bae)(bae) = (abe)$$

qui est un 3-cycle. Ce 3-cycle est dans H par le même argument que précédemment.

Supposons que le support de σ_0 a 5 éléments. C'est donc un 5-cycle, car c'est une permutation paire. Notons donc $\sigma_0 = (abcde)$ et prenons $\tau = (abc)$. On aura alors

$$\sigma_0\tau\sigma_0^{-1}\tau^{-1} = (bcd)(bac) = (adb),$$

qui est un 3-cycle et dans H par le même argument.

□

Théorème 3.15

Le groupe $\mathfrak{A}_4$ n'est pas simple.

Démonstration : La preuve sera faite en TD.

□