

## №7. Сравнение бесконечно малых функций

[<Все конспекты>](#)

:LiStepBack: Прошлая: [№6. Предел функции](#)

:LiStepForward: Следующая:

### Оглавление



1. [Сравнение бесконечно малых функций](#)
2. [Сравнение бесконечно больших функций](#)
  1. [Примеры](#)
3. [Правило эквивалентности](#)
4. [Пункт IV. Замечательные пределы](#)
  1. [I замечательный предел](#)
    1. [#Доказательство](#)
  5. [II замечательный предел](#)
    1. [#Доказательство](#)
6. [Таблица эквивалентности Б.М. функций при  \$f\(x\) \rightarrow 0\$](#)
7. [Сводка из таблиц эквивалентности](#)

## Сравнение бесконечно малых функций

Прошлая лекция:

### Сравнение бесконечно малых функций

1. Если  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ , то  $f(x)$  — бесконечно малая высшего порядка, чем  $g(x)$   
 #Обозначение  $f(x) = o(g(x))$
2. Если  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ , то  $f(x)$  — бесконечно малая низшего порядка, чем  $g(x)$   
 #Обозначение  $g(x) = o(f(x))$
3. Если  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = C \neq 0$ , то  $f(x)$  и  $g(x)$  — бесконечно малые равного порядка



## #Определение

Если для бесконечно малых функций  $f(x)$  и  $g(x)$   $x \rightarrow x_0$  одного порядка получим, что  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \left\{ \frac{0}{0} \right\} = 1$ , то бесконечно малые называются эквивалентными

$$f(x) \sim g(x), x \rightarrow x_0$$

Таким образом две функции называются эквивалентными, если предел их отношения равен единице



## #Утверждение

При вычитании эквивалентных бесконечно малых функций получим бесконечно малую функцию высшего порядка.

$$f(x) \sim g(x), x \rightarrow x_0 \implies f(x) - g(x) = o(f(x))$$

## Сравнение бесконечно больших функций

$f(x)$  и  $g(x)$  бесконечно большие при  $x \rightarrow x_0$

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\} = 0 \implies f(x) \text{ Б. Б. низшего порядка, чем } g(x)$
2.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\} = \infty \implies f(x) \text{ Б.Б. высшего порядка, чем } g(x)$
3.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\} = \underset{\neq \infty}{\neq 0} \implies f(x) \text{ и } g(x) \text{ Б.Б. одного порядка}$
4.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\} = 1 \implies f(x) \sim g(x)$



## #Утверждение

При вычитании двух эквивалентных Б.Б. функций получим Б.Б. низшего порядка или конечную функцию.

Таким образом неопределённость  $\{\infty - \infty\}$  означает вычитание эквивалентных Б.Б. функций.

## Примеры

#Пример

$$\frac{\sqrt{2n^2+1}}{\sqrt{2}n} - \frac{\sqrt{n^2+2}}{n} \xrightarrow{\text{экв}} \infty$$

$$\frac{\sqrt{n^2+1}}{n} - \frac{\sqrt{n^2+2}}{n} = \{\infty - \infty\} = \frac{n^2+1-n^2+2}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2+2}} = -\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2+2}} = -\frac{1}{\infty} = 0$$

## Правило эквивалентности

Любой множитель в пределе можно заменить на эквивалентный

$$f(x) \sim g(x), x \rightarrow x_0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^2$$

Слагаемые нельзя поменять на эквивалентные только в двух случаях:


- При вычитании эквивалентных Б.М., т.к. получим Б.М. высшего порядка
- При вычитании эквивалентных Б.Б., т.к. получим Б.Б. низшего порядка

## Пункт IV. Замечательные пределы

### I замечательный предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \left\{ \frac{0}{0} \right\} = 1 \implies \boxed{\sin x = x, x \rightarrow 0}$$

#Доказательство



Выведем табличные значения для тригонометрических и обратных тригонометрических функций

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\operatorname{tg} x \sim x, x \rightarrow 0}$$

$$\boxed{\operatorname{ctg} x = \frac{1}{\operatorname{tg} x} \sim \frac{1}{x}, x \rightarrow 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, x \rightarrow 0}$$

$$\sin x \sim x, x \rightarrow 0 \Rightarrow x \sim \arcsin x, x \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\arcsin x \sim x, x \rightarrow 0}$$

$$\boxed{\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x \sim \frac{\pi}{2} - x, x \rightarrow 0}$$

$$\operatorname{tg} x \sim x, x \rightarrow 0, x \sim \operatorname{arctg} x, x \rightarrow 0 \Rightarrow \boxed{\operatorname{arctg} x \sim x, x \rightarrow 0}$$

$$\operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x \sim \frac{\pi}{2} - x$$

## II замечательный предел

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \{1^\infty\} = e$$

## #Доказательство

Из определения числа  $e$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \{1^\infty\} = e$$

Делаем в В.З.П  $\frac{1}{n}$  на  $x \Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \{1^\infty\} = e$$

Выведем табличные значения для остальных функций

$$e^x - 1 \sim ((1+x)^{\frac{1}{x}})^x = 1+x-1 = \sim x, x \rightarrow 0$$

$$a^x - 1 \stackrel{\text{потенциров.}}{\sim} e^{\ln a^x} - 1 = e^{x \ln a} - 1 = \sim x \ln a, x \rightarrow 0$$

$$\ln(1+x) \sim x \cdot \frac{1}{x} \cdot \ln(1+x) = x \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} \sim x \ln e = \sim x, x \rightarrow 0$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{\ln(1+x)}{\ln a} = \sim \frac{x}{\ln a}, x \rightarrow 0$$

$$(1+x)^a - 1 \sim e^{\ln(1+x)^a} - 1 = e^{a \ln(1+x)} - 1 \sim e^{ax} - 1 \sim ax, x \rightarrow 0$$

Таблица эквивалентности Б.М. функций при  $f(x) \rightarrow 0$ 

☐ Доказать!!!!

- $\sin f(x) \sim f(x), f(x) \rightarrow 0$

Заменим  $f(x)$  на  $t$

$$\cos t \leq \frac{\sin t}{t} \leq 1$$

При  $t \rightarrow 0$  правая и левая границы сходятся к 1

$\Downarrow$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

$\Downarrow$

$$\sin t \sim t, t \rightarrow 0$$

Заменяя  $t$  обратно на  $f(x)$  мы получаем искомую эквивалентность

- $\boxed{\operatorname{tg} f(x) \sim f(x), f(x) \rightarrow 0}$

$$\operatorname{tg} f(x) = \frac{\sin f(x)}{\cos f(x)}$$

При  $f(x) \rightarrow 0, \cos x \rightarrow 1$

$\Downarrow$

$$\operatorname{tg} f(x) = \frac{\sin f(x)}{1}, f(x) \rightarrow 0$$

$\Downarrow$

$$\operatorname{tg} f(x) \sim \sin f(x) \sim f(x), f(x) \rightarrow 0$$

- $\boxed{1 - \cos f(x) \sim \frac{f^2(x)}{2}, f(x) \rightarrow 0}$

Докажем, что  $\frac{1 - \cos f(x)}{\frac{f^2(x)}{2}} \rightarrow 1$  при  $f(x) \rightarrow 0$

Важно, что  $1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2}$

$$t = f(x)$$

$$\frac{1 - \cos f(x)}{\frac{f^2(x)}{2}} = \frac{2 \sin^2 \frac{f(x)}{2}}{\frac{f^2(x)}{2}} = \left( \frac{\sin \frac{f(x)}{2}}{\frac{f(x)}{2}} \right)^2$$

При  $f(x) \rightarrow 0$  известный предел  $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$

$\Downarrow$

$$\left( \frac{\sin \frac{f(x)}{2}}{\frac{f(x)}{2}} \right)^2 \rightarrow 1$$

Отсюда  $\frac{1 - \cos(f(x))}{\frac{f^2(x)}{2}} \rightarrow 1$

$\Downarrow$

$$1 - \cos f(x) \sim \frac{f^2(x)}{2}, f(x) \rightarrow 0$$

3.  $\arcsin f(x) \sim f(x), f(x) \rightarrow 0$
4.  $\operatorname{arctg} f(x) \sim f(x), f(x) \rightarrow 0$
5.  $e^{f(x)} - 1 \sim f(x), f(x) \rightarrow 0$
6.  $a^{f(x)} - 1 \sim f(x) \cdot \ln a, f(x) \rightarrow 0$
7.  $\ln(1 + f(x)) \sim f(x), f(x) \rightarrow 0$
8.  $\log_a(1 + f(x)) \sim \frac{f(x)}{\ln a}, f(x) \rightarrow 0$
9.  $(1 + f(x))^a - 1 \sim a \cdot f(x), f(x) \rightarrow 0$

## Сводка из таблиц эквивалентности

- $\sin x \sim x, x \rightarrow 0$
- $\operatorname{tg} x \sim x, x \rightarrow 0$
- $\operatorname{ctg} x \sim \frac{1}{x}, x \rightarrow 0$
- $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, x \rightarrow 0$
- $\arcsin x \sim x, x \rightarrow 0$
- $\arccos x \sim \frac{\pi}{2} - x, x \rightarrow 0$

- $\operatorname{arctg} x \sim x, x \rightarrow 0$
  - $\operatorname{arcctg} x \sim \frac{\pi}{2} - x, x \rightarrow 0$
- 

- $a^x - 1 \sim x \ln a, x \rightarrow 0$
- $\log_a (1 + x) \sim \frac{x}{\ln a}, x \rightarrow 0$
- $(1 + x)^a - 1 \sim ax, x \rightarrow 0$