

Atual crise de Ebola no Congo é mais transmissível que a epidemia de 2014

Autor: Gustavo Radaelli

Data: 2026-06-01T12:00:31+00:00

Categoria: Jornal da USP no Ar

URL original: <https://jornal.usp.br/radio-usp/atual-crise-de-ebola-no-congo-e-mais-transmissivel-que-a-epidemia-de-2014/>

Por [Gustavo Radaelli\*](<https://jornal.usp.br/author/gustavo/> "Posts de Gustavo Radaelli\*\*")

Transmissão ocorre após contato com secreções de pessoa infectada, principalmente o sangue-

Foto: [CDC Global/Wikimédia]([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CDC\\_Director\\_exits\\_Ebola\\_treatment\\_unit.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CDC_Director_exits_Ebola_treatment_unit.jpg))

<[https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/EBOLA\\_GUSTAVO-RADAELLI.mp3](https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/EBOLA_GUSTAVO-RADAELLI.mp3)>

A República Democrática do Congo enfrenta uma nova crise sanitária provocada pelo vírus Ebola, considerada mais preocupante do que a registrada entre 2014 e 2016. A variante atualmente em circulação apresenta maior capacidade de transmissão em comparação com as anteriores. Até o fim de maio, foram registrados mais de 900 casos suspeitos da doença, dos quais 120 foram confirmados, além de sete mortes.

Febre alta, dores musculares, fraqueza e sangramentos estão entre os principais sintomas do Ebola, que podem surgir entre dois e 21 dias após a infecção. A transmissão entre seres humanos ocorre por meio do contato com secreções corporais de pessoas infectadas, especialmente o sangue.

O vírus ainda desperta dúvidas entre os especialistas. As razões para a elevada transmissibilidade da nova variante e para a recorrência dos surtos no país ainda não são totalmente conhecidas. É o que explica Celso Granato, médico infectologista e professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Celso Francisco Hernandez Granato – Foto: Arquivo pessoal

## ## Origens da transmissão do Ebola

Na natureza, o vírus Ebola é encontrado principalmente em algumas espécies de morcegos, que atuam como hospedeiros naturais sem desenvolver a doença. A transmissão para outros animais e para seres humanos pode ocorrer por meio do contato com sangue, secreções ou tecidos contaminados. Na República Democrática do Congo, espécies de grande porte, como o morcego-cabeça-de-martelo, que pode atingir quase um metro de envergadura, são comuns e, em algumas regiões, fazem parte da alimentação da população.

\*O Ebola pertence à família dos filovírus, um grupo de vírus altamente letais para os seres humanos, do qual também faz parte o vírus de Marburg\* (MARV). Os surtos registrados no Congo são causados por diferentes cepas do Ebola, ou seja, variantes que surgem a partir de alterações genéticas acumuladas ao longo do tempo e que podem apresentar mudanças em suas características biológicas e na forma de transmissão.

Entre os seres humanos, a infecção geralmente ocorre por meio do contato direto com fluidos corporais, sangue ou tecidos de pessoas contaminadas. No Congo, parte dos casos está associada a rituais funerários tradicionais, nos quais familiares e membros da comunidade

mantêm contato próximo com os corpos de pessoas que faleceram sem diagnóstico prévio da doença.

### ## Riscos de propagação

Para Granato, as chances de o surto se espalhar para outros continentes ou para países mais distantes dos focos de contaminação são baixas. Isso ocorre porque a principal forma de transmissão da doença envolve o contato direto com sangue e outras secreções corporais de pessoas infectadas, o que dificulta a disseminação em grandes distâncias. A maior preocupação está na propagação regional, especialmente para territórios vizinhos às áreas mais afetadas.

Embora a República Democrática do Congo registre surtos recorrentes de Ebola, ainda não há estudos capazes de explicar com precisão por que o país concentra tantos episódios da doença. Uma das principais hipóteses é a circulação contínua do vírus entre populações de morcegos da região. No entanto, essa explicação, por si só, não é suficiente para esclarecer os intervalos entre as sucessivas crises sanitárias.

\\*Sob orientação de Marcia Avanza