

A nutrição clínica e sua importância na manutenção dos cuidados do paciente oncológico

Autor: Não informado

Data: 2026-05-28T14:17:45+00:00

Categoria: Atualidades

URL original: <https://jornal.usp.br/atualidades/a-nutricao-clinica-e-sua-importancia-na-manutencao-dos-cuidados-do-paciente-oncologico/>

A pesquisa conduzida no Icesp evidencia como a identificação precoce da desnutrição pode transformar o cuidado ao paciente oncológico – Foto: [Diogo Moreira/ICESP](<https://www.facebook.com/photo/?fbid=574183171405706&set=a.574183131405710>)

<https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/05/NUTRICA0-CLINICA_ATENCAO-ONCOLOGICA-NO-ADULTO_GISLENE-OZORIO.mp3>

Um artigo desenvolvido no Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Oncológica no Adulto do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), sediado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), validou a precisão dos critérios da Global Leadership Initiative on Malnutrition (Glim), um consenso internacional de sociedades de Nutrição Clínica para padronizar o diagnóstico de desnutrição mundialmente.

A nutricionista Gislaíne Aparecida Ozório, coordenadora do serviço de nutrição e tutora do programa, detalha como funciona essa validação. Ela explica que o Glim é dividido em duas partes. Os critérios fenótipos são a perda de peso não intencional e redução da massa muscular, já os critérios etiológicos envolvem redução da ingestão alimentar. “Na segunda parte você vai classificar, porque indo para a segunda parte, ele (paciente) já está desnutrido. E aí você vai classificar se ele está desnutrido moderado ou grave. E aí, para fazer essa classificação, você vai usar o percentual de perda de peso (IMC) e a redução também da massa muscular. E aí você tem o diagnóstico, se ele está desnutrido moderado ou grave. Para você fazer a validação normalmente, a gente usa um critério que chama de ouro.”

Método eficaz

O método se mostrou bastante eficaz. A nutricionista comenta que é muito importante saber quando o paciente tem sinais de desnutrição, justamente para melhorar esses sintomas através da alimentação com hipercalóricos e hiperproteicos e atividade física, para posteriormente aumentar a massa muscular. Os pacientes que sofrem com desnutrição interrompem mais o tratamento e possuem mais riscos de complicações cirúrgicas, além de uma maior taxa de óbito.

Antes dos critérios Glim, a avaliação feita era a subjetiva global. Nem todas as instituições de saúde possuem o acompanhamento nutricional especializado. Com essa forma de análise, qualquer profissional da saúde consegue aferir como está determinado paciente. Com reconhecimento internacional, a pesquisa conduzida no Icesp evidencia como a identificação precoce da desnutrição pode transformar o cuidado ao paciente oncológico. O estudo amplia o acesso a ferramentas mais objetivas de avaliação nutricional, contribuindo para reduzir complicações, interrupções no tratamento e índices de mortalidade.