

Queda da fertilidade masculina acende alerta sobre hábitos modernos e poluição

Autor: Simone Lemos

Data: 2026-05-27T16:44:21+00:00

Categoria: Rádio USP

URL original: <https://jornal.usp.br/radio-usp/queda-da-fertilidade-masculina-acende-alerta-sobre-habitos-modernos-e-poluicao/>

Por [Simone Lemos](<https://jornal.usp.br/author/silemusp-br/> "Posts de Simone Lemos")

Foto: [Andrew

Neel/Pexels](<https://www.pexels.com/photo/photo-of-man-leaning-on-wooden-table-3132388/>)

<https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/05/INFERTILIDADE-MASCULINA_SIMONE-LEMOS.mp3>

A queda da fertilidade masculina já é tratada por especialistas como um dos principais desafios de saúde reprodutiva deste século. Dados do Ministério da Saúde mostram aumento da procura por atendimento relacionado à infertilidade no Sistema Único de Saúde, enquanto pesquisas internacionais indicam redução progressiva da qualidade seminal em diferentes países nas últimas décadas.

O médico e pesquisador Jorge Hallak, professor ligado à Universidade de São Paulo e coordenador de estudos em fertilidade masculina, afirma que o fenômeno já é percebido também em pesquisas realizadas no Brasil. “Mesmo aqui no Brasil, nós percebemos que há, sim, uma diferença de qualidade até em indivíduos férteis. Está havendo uma queda tanto da concentração quanto da motilidade espermática”, afirma.

Segundo Hallak, os resultados observados atualmente confirmam uma tendência apontada pela literatura científica internacional há mais de 50 anos. Ele cita duas grandes metanálises publicadas recentemente, incluindo uma revisão de 2022 que reforçou dados apresentados anteriormente em 2017. “Os estudos demonstram que houve, nos últimos 50 anos, uma queda da concentração de espermatozoides ao redor de 62%. E houve também uma queda da motilidade espermática próxima de 59%”, diz o pesquisador.

Para ele, os números são suficientemente preocupantes para justificar o alerta feito pela Organização Mundial da Saúde sobre a necessidade de ampliar pesquisas e políticas públicas voltadas à saúde reprodutiva.

Jorge Hallak – Foto: IEA

Principais fatores

Hallak afirma que não existe uma causa única para a redução da fertilidade masculina. Segundo ele, trata-se de um fenômeno multifatorial ligado principalmente ao estilo de vida moderno e à exposição ambiental típica do mundo industrializado.

Entre os principais fatores apontados pelo especialista estão a poluição atmosférica, o contato com pesticidas e produtos químicos, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, a obesidade, o sedentarismo, o uso abusivo de testosterona, drogas recreativas e medicamentos psiquiátricos. “A poluição ambiental varia de país para país, mas o resultado final no organismo é semelhante. Muitos desses compostos acabam se transformando em substâncias com ação estrogênica no corpo masculino”, explica.

Segundo o pesquisador, além das alterações hormonais, esses fatores provocam aumento do chamado estresse oxidativo, mecanismo associado ao excesso de radicais livres e ao dano celular. “O estresse oxidativo é uma linha central das pesquisas em infertilidade masculina. Nós observamos esse mecanismo em praticamente todas as doenças ligadas à infertilidade”, afirma.

O especialista também relaciona a piora da qualidade seminal ao aumento da obesidade e à alimentação inadequada. Para ele, não é apenas o excesso de peso que importa, mas o ambiente metabólico criado por hábitos modernos. “Não é só a obesidade. É o que está por trás dela: ultraprocessados, sedentarismo, poluição e má nutrição”, diz.

Outro ponto destacado pelo pesquisador é o crescimento do uso de medicamentos psiquiátricos e ansiolíticos. Segundo Hallak, o Brasil está entre os países com maior consumo dessas substâncias, o que, segundo ele, pode impactar a produção hormonal masculina.

Uso de testosterona e drogas

Além disso, o especialista alerta para o uso crescente de testosterona e anabolizantes entre homens jovens e adolescentes. “Hoje existe uma epidemia de prescrição abusiva de testosterona. O organismo entende que já existe hormônio suficiente e reduz a produção natural. Isso pode provocar atrofia testicular e queda da fertilidade”, afirma.

Hallak também demonstra preocupação com a influência de padrões estéticos e culturais sobre os adolescentes. “O jovem vê modelos musculosos nas redes sociais, quer resultados rápidos e acaba recorrendo aos anabolizantes cada vez mais cedo”, afirma.

Entre as drogas recreativas, ele destaca especialmente a maconha e a cocaína. Segundo o pesquisador, estudos desenvolvidos por seu grupo indicam que a maconha pode provocar lesões importantes nas membranas celulares relacionadas à fertilidade. Já a cocaína, segundo Hallak, teria efeito ainda mais agressivo sobre o tecido testicular. “A cocaína destrói a arquitetura do testículo de maneira muito intensa”, afirma.

O especialista também cita o tabagismo como fator de risco importante, principalmente pelos impactos cardiovasculares, hormonais e pelo aumento do risco de câncer.

Infecções silenciosas e Covid-19

Além dos fatores ambientais e comportamentais, Hallak destaca causas clínicas mais tradicionais da infertilidade masculina. A principal delas é a varicocele, dilatação das veias do testículo que provoca aumento da temperatura escrotal e prejuízo à produção dos espermatozoides. Ele também chama atenção para infecções do trato reprodutivo masculino, muitas vezes silenciosas. “Muitas dessas infecções são assintomáticas. O homem só vai descobrir anos depois, quando já existe comprometimento da fertilidade”, explica.

Segundo o pesquisador, alterações genéticas também têm participação importante em casos graves de infertilidade, especialmente em homens com contagens muito baixas de espermatozoides. A pandemia de COVID-19 também passou a integrar as linhas de pesquisa sobre fertilidade masculina. Hallak afirma que estudos ainda acompanham os possíveis efeitos prolongados da infecção sobre os testículos e a qualidade seminal.

“Nós observamos melhora da concentração e da motilidade após a Covid, mas algumas alterações

relacionadas ao DNA espermático ainda não normalizaram completamente”, diz. O pesquisador afirma ainda que estudos recentes investigam mecanismos pelos quais o espermatozoide poderia atuar em processos imunológicos relacionados ao vírus.

Diagnóstico precoce pode melhorar

Apesar do cenário considerado preocupante, Hallak reforça que muitos casos têm tratamento e podem apresentar melhora significativa com diagnóstico precoce e mudança de hábitos. Segundo ele, o tratamento geralmente envolve correção do estilo de vida, melhora alimentar, prática regular de exercícios físicos e terapias voltadas ao controle do estresse oxidativo. “O tratamento existe. Mas o paciente precisa procurar um especialista em fertilidade masculina. Não é simplesmente usar testosterona ou tomar fórmulas prontas”, afirma.

O especialista destaca ainda a importância da prevenção e do acompanhamento precoce, principalmente entre adolescentes e adultos jovens. “A minha maior preocupação hoje é com os adolescentes. Estamos observando cada vez mais jovens com qualidade espermática muito baixa”, alerta.

Para os especialistas, a discussão sobre fertilidade masculina deve ganhar cada vez mais espaço nos próximos anos, tanto na área médica quanto nas políticas públicas de saúde reprodutiva.