

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO Y CALIDAD DEL AIRE



12 de enero 2024

PRONÓSTICO DIARIO PARA 12 AL 15 DE ENERO DEL 2024

1. ELEMENTOS DEL ANÁLISIS METEOROLÓGICO






Imagen satelital Masas de Aire 12/01/2024. Dorsal en altura, chorro rama ascendente y vaguada costera sector norte sobre Chagres. Viento en 500 hPa con circulación anticiclónica.



Dirección trayectorias: Ventilación Favorable (verde), probable Regular (amarillo) cotas bajas y Adversa (rojo) en COM. Esto, mañana en la madrugada



Meteograma 5 días sector Mina-MLP.



Fotos zona Aeródromo MLP (Mañana: Nublado a parcial; Tarde: Mayormente despejado). Dorsal en altura y vaguada costera norte sobre MLP.

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO Y CALIDAD DEL AIRE



2. PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

FECHA:	12 DE ENERO DE 2024
HORA:	17:00 HRS
Elaborado por:	Meteorología-PARTICULAS

3. CONDICIÓN SINÓPTICA

Condición observada a las 12:00 Hora Local

Dorsal moderada (DA), paso de nueva corriente en chorro moderada (JS), paso de alta fría migratoria (AFm) hacia centro Argentino, vaguada costera norte moderada (VCn).

Condición Pronosticada para el 13 de enero

Se mantiene dorsal moderada (DA), ingreso de nueva corriente en chorro moderada/intensa (JS), vaguada costera norte moderada a sur leve (VCn / VCs).

4. OBSERVACIONES

Estabilidad por dorsal en altura con vaguada costera norte moderada, con cielo nublado a mayormente despejado. MLP-MINA: La temperatura está oscilando entre 0 y +13 °C, con velocidades de viento entre 13 a 28 km/h (rachas 35 a 45 km/h) del Norte-noreste a Oeste-noroeste. Isotherma 0°C promedio = 4,300 m.

Fuente: Elaboración propia

5. CONDICIÓN DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

Día	Viernes 12 de enero												Sábado 13 de enero												Total horas restricción		
Hora	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	F	R	A
Condición	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	A	A	A	A	A	R	R	F	F	F	15	4	5

Día	Sábado 13 de enero												Domingo 14 de enero												Total horas restricción		
Hora	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	F	R	A
Condición	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	F	12	4	8

Día	Domingo 14 de enero												Lunes 15 de enero												Total horas restricción		
Hora	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	F	R	A
Condición	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	F	F	11	4	9

F	Condiciones Favorables				R	Condiciones Regulares				A	Condiciones Adversas			
---	------------------------	--	--	--	---	-----------------------	--	--	--	---	----------------------	--	--	--

VIERNES: Dorsal moderada (DA), paso de nueva corriente en chorro moderada (JS), paso y alejamiento de alta fría migratoria (AFm) hacia centro Argentino, vaguada costera norte moderada (VCn). **Regular en cotas bajas y Adversa en COM en la madrugada.**

SÁBADO: Se mantiene dorsal moderada (DA), ingreso de nueva corriente en chorro moderada/intensa (JS), vaguada costera norte moderada a sur leve (VCn / VCs) en la tarde. **Regular en cotas bajas y Adversa en COM en la madrugada.**

DOMINGO: Intensificación y posicionamiento de eje de dorsal (DA), intensificación de corriente en chorro (JS) **rama descendente**, vaguada costera **sector sur moderada a intensa** (VCs). **Probable Regular en cotas medias y Adversa extensa en COM en la madrugada.**

LUNES: Dorsal intensa/moderada variando a **prevaguada** (DA / PFF), corriente en chorro intensa (JS) parte trasera rama ascendente, **vaguada costera sur a norte** (VCs / VCn) débil. **Regular en cotas medias y Adversa extensa en COM en la madrugada.**

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO Y CALIDAD DEL AIRE



Día	6. Patrón Sinóptico															
	AS	AFm	AB	PFF	FF	FC	IP	VA	DA	BS	BSd	JS	RA	RAn	VCs	VCn
12/1/2024	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
13/1/2024	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
14/1/2024	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
15/1/2024	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
Condición de patrones sinópticos Favorable (1), Regular (1) y Adversa (1) para la calidad del aire.																

GLOSARIO

Favorable:

Condiciones atmosféricas de estabilidad térmica y mecánica por viento, asociadas a cierta combinación de patrones sinópticos, “eficientes” para la dispersión de gases y aerosoles.

Regular:

Condiciones atmosféricas de estabilidad térmica y mecánica por viento, asociadas a cierta combinación de patrones sinópticos, “moderadas” para la dispersión de gases y aerosoles.

Adversas:

Condiciones atmosféricas de estabilidad térmica y mecánica por viento, asociadas a cierta combinación de patrones sinópticos, “deficientes” para la dispersión de gases y aerosoles.

Anticiclón Subtropical del Pacífico Sur (AS):

El Anticiclón Subtropical Semipermanente del Pacífico Sur (ASPS) es un sistema de alta presión atmosférica que se encuentra en la región del Pacífico Sur, específicamente en el océano Pacífico suroriental, frente a las costas de Chile en Sudamérica. Este sistema juega un papel fundamental en la configuración del clima y los patrones meteorológicos de la región. El ASPS se localiza en la zona subtropical del Pacífico suroriental, alrededor de los 30 grados de latitud sur. Su nombre "semipermanente" se refiere a su relativa persistencia durante largos periodos de tiempo en esta región.

Alta Fría Migratoria (AFm):

Un "Anticiclón Frío migratorio" es un tipo de sistema de alta presión atmosférica que está asociado con temperaturas más frías de lo normal en su área circundante. A diferencia de los anticiclones típicos, que suelen generar condiciones cálidas y estables, un anticiclón frío provoca temperaturas más bajas debido a su influencia en la circulación del aire y en los patrones climáticos locales. Al igual que con otros anticiclones, un anticiclón frío se caracteriza por una alta presión atmosférica en su núcleo. Esto significa que el aire en la superficie está más denso y ejerce una presión mayor que en las áreas circundantes. En un anticiclón frío, el aire tiende a descender desde las capas superiores de la atmósfera hacia la superficie terrestre. Al descender, el aire se comprime y calienta, lo que puede generar condiciones secas y estables. Sin embargo, en este caso, el aire que desciende tiende a ser más frío que el aire circundante.

Alta de Bloqueo (AB):

Una "Alta de Bloqueo" (AB), también conocida como "Bloqueo de Alta Presión" o "Bloqueo Atmosférico", es un patrón meteorológico en el que una región de alta presión atmosférica se estanca o bloquea en una ubicación específica durante un período prolongado de tiempo. Esta configuración bloquea o interrumpe el flujo normal de sistemas meteorológicos y puede tener un impacto significativo en el clima y el tiempo en áreas afectadas. Una de las características clave del Alta de Bloqueo es su duración prolongada. En lugar de los sistemas meteorológicos que se mueven rápidamente, una AB puede mantenerse en una posición fija durante días o incluso semanas. Una AB tiende a desviar el flujo normal de sistemas atmosféricos, como frentes, sistemas de baja presión y vientos. Esto puede resultar en patrones climáticos inusuales o extremos, como condiciones de clima soleado y cálido o, en casos opuestos, períodos prolongados de lluvia o nieve.

Frente Frío (FF):

Un sistema frontal frío es una zona de transición en la atmósfera donde una masa de aire frío reemplaza a una masa de aire cálido. Los sistemas frontales son límites entre dos masas de aire con características diferentes, como temperatura, humedad y densidad. El sistema frontal frío es uno de los dos tipos principales de sistemas frontales, el otro es el sistema frontal cálido. En un sistema frontal frío, la masa de aire frío se desplaza y avanza hacia una masa de aire cálido. Debido a que el aire frío es más denso, tiende a empujar y desplazar al aire cálido hacia arriba. Cuando el aire frío encuentra al aire cálido, el aire cálido más liviano es forzado a elevarse sobre el aire frío más denso. Esto puede llevar a la formación de nubes, precipitación y condiciones climáticas inestables en la región del frente.

Frente Cálido (FC):

Un sistema frontal cálido es un tipo de sistema frontal en meteorología que involucra el desplazamiento de una masa de aire cálido sobre una masa de aire frío. Los sistemas frontales cálidos son una de las dos variedades principales de sistemas frontales, junto con los sistemas frontales fríos. Estos sistemas frontales son zonas de transición donde dos masas de aire con diferentes propiedades se encuentran y generan cambios en el tiempo y las condiciones climáticas. En un sistema frontal cálido, una masa de aire cálido avanza y desplaza a una masa

de aire frío. La masa de aire cálido tiende a elevarse suavemente sobre la masa de aire frío más denso y se desliza sobre ella. La masa de aire cálido que se desplaza sobre la masa de aire frío suele ser más ligera y menos densa. Esto puede resultar en una disminución de la presión atmosférica en la región frontal. Como el aire cálido es menos denso que el aire frío, el ascenso vertical suele ser más gradual y menos abrupto que en un sistema frontal frío. Esto puede resultar en una mayor extensión de nubosidad y precipitación.

Prefrontal Frío (PFF):

La "advección cálida en la zona prefrontal fría" se refiere a un proceso meteorológico en el contexto de un sistema frontal, específicamente en relación con la aproximación de un frente frío. La advección es el término utilizado en meteorología para describir el transporte horizontal de propiedades atmosféricas, como temperatura o humedad, por el movimiento del aire. La advección cálida se produce cuando una masa de aire más cálido se mueve hacia una región determinada, elevando así las temperaturas en esa área. Esto puede resultar en un aumento de las temperaturas y la humedad en la zona prefrontal antes de que llegue el aire más frío asociado con el frente frío en sí.

Inestabilidad Postfrontal (IP):

La "inestabilidad postfrontal" se refiere a un tipo de inestabilidad atmosférica que ocurre en la región que sigue a un frente frío después de su paso. Este fenómeno es común después de que un frente frío haya cruzado una región y el aire frío esté reemplazando al aire más cálido. La inestabilidad postfrontal se produce debido a la diferencia en la densidad entre el aire frío y el aire cálido. El aire frío, al ser más denso, tiende a empujar al aire cálido hacia arriba en un proceso conocido como levantamiento forzado. Es importante señalar que no todos los frentes fríos resultan en inestabilidad postfrontal. La presencia y la intensidad de esta inestabilidad pueden depender de varios factores, como la temperatura y humedad iniciales de las masas de aire, la velocidad de avance del frente y la interacción con otros sistemas atmosféricos.

Vaguada en Altura (VA):

Una "vaguada en altura" es un patrón de circulación atmosférica que involucra una depresión o una curvatura en las líneas isotérmicas (líneas de igual temperatura) en las altitudes superiores de la atmósfera. Este término se utiliza comúnmente en meteorología para describir una región de aire más fresco y ascendente en comparación con las áreas circundantes.

Dorsal en Altura (DA):

La "dorsal en altura" es un término utilizado en meteorología para describir una característica de la presión atmosférica en la atmósfera superior. Se refiere a una área o región donde la presión atmosférica es más alta de lo normal en altitudes elevadas en la troposfera, que es la capa de la atmósfera en la que ocurre la mayor parte del tiempo meteorológico. Se relaciona de forma opuesta a la Vaguada en Altura.

Baja Segregada (BS, BSd):

Una "baja segregada" es un término meteorológico que se refiere a un sistema de baja presión atmosférica que se encuentra aislado o separado del flujo atmosférico principal. Este tipo de sistema es interesante porque no está directamente conectado con las características normales de la circulación atmosférica y puede tener un comportamiento y evolución particulares. Una baja segregada es un sistema de baja presión que está "aislado" de la corriente de aire más general. Esto significa que se encuentra en una región donde las características de flujo de la atmósfera circundante no influyen directamente en su evolución. Debido a su comportamiento único y aislado, las bajas segregadas pueden ser un desafío para los pronosticadores meteorológicos. Predecir su evolución y el impacto que tendrán en el clima y el tiempo local puede ser más complejo que para sistemas más típicos. La baja segregada parte delantera (BSd) generalmente es estable.

Jet Stream (JS):

El "jet stream", conocido también como "corriente en chorro", es un fuerte flujo de viento continuo y rápido en la atmósfera superior de la Tierra. Está ubicado en la troposfera, la capa más baja de la atmósfera, y suele encontrarse a altitudes entre 9 y 16 kilómetros. El jet stream es una característica importante de la circulación atmosférica y juega un papel fundamental en el clima y los patrones meteorológicos. El jet stream se caracteriza por sus vientos extremadamente rápidos y constantes, que pueden alcanzar velocidades de hasta 400 kilómetros por hora en algunas ocasiones. Estas velocidades excepcionales lo convierten en uno de los sistemas de viento más fuertes en la atmósfera terrestre. El jet stream influye en la formación y el movimiento de sistemas climáticos y meteorológicos, como frentes, tormentas y anticiclones. Sirve como una especie de "autopista" para las masas de aire, guiándolas y acelerando su desplazamiento. También puede influir en la dirección y la intensidad de las tormentas y en la distribución de la precipitación.

Río Atmosférico (RA, RAn):

Un río atmosférico, también conocido como corriente de humedad atmosférica, es un fenómeno meteorológico en el que una banda estrecha y alargada de aire húmedo y cargado de vapor de agua se desplaza a través de la atmósfera, transportando una cantidad significativa de humedad a largas distancias. Estos ríos de humedad pueden abarcar cientos o incluso miles de kilómetros de longitud y pueden influir en el tiempo y el clima de las regiones que atraviesan. Los ríos atmosféricos son particularmente notables por su capacidad para llevar consigo grandes cantidades de vapor de agua, lo que puede tener un impacto significativo en las condiciones climáticas locales. Cuando un río atmosférico encuentra una masa de aire frío, puede provocar precipitaciones intensas en forma de lluvia o nieve, lo que a veces resulta en eventos meteorológicos extremos como inundaciones o tormentas de invierno. La observación y el estudio de los ríos atmosféricos son importantes para prever el tiempo y comprender mejor los patrones climáticos a largo plazo, ya que estos ríos pueden influir en la distribución de las precipitaciones y en los fenómenos meteorológicos extremos en diferentes regiones del mundo. El río atmosférico en su borde norte (RAn) es altamente estable.

Vaguada Costera (VC)

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO Y CALIDAD DEL AIRE



Una "vaguada costera" se refiere a un patrón meteorológico en el que una depresión o curvatura en las líneas de presión atmosférica se desarrolla cerca de la costa o en las proximidades del mar. Esta configuración puede tener un impacto en las condiciones climáticas y meteorológicas en áreas costeras y marítimas. Las vaguadas costeras pueden formarse por una variedad de factores, como interacciones entre masas de aire frío y cálido, o, como en el caso de Chile, como resultado de la topografía costera y la influencia del mar. Estas condiciones pueden generar una depresión o curvatura en las líneas de presión atmosférica en la región cercana a la costa. La vaguada costera puede influir en la dirección y velocidad de los vientos en la región cercana a la costa. Dependiendo de la configuración específica, puede generar vientos ascendentes y descendentes que afectan el patrón de flujo atmosférico.