

血液小测（一）

填空题：

1. 正常成人的全部血量约占体重的_____。
2. 血浆蛋白中构成血浆胶体渗透压的主要成分是_____，具有免疫功能的是_____。
3. 血浆胶体渗透压的生理意义是维持_____与_____之间的水平衡。
4. 维持细胞内与细胞外之间水平衡的渗透压是_____，主要是由_____所形成。
5. 正常人的血浆渗透压约为 313 mOsm/L。静脉输入 0.9% NaCl 溶液，血浆渗透压_____，血细胞形态_____。

判断题：

1. 血液的比重主要取决于红细胞数量，数量越多，则比重越大。（ ）
2. 红细胞只运输 O_2 ，不运输 CO_2 。（ ）
3. 内环境稳态是指细胞外液的理化因素一成不变。（ ）
4. 血浆蛋白总浓度不变，白蛋白与球蛋白比值越大，血浆胶体渗透压越低。（ ）
5. 贫血时血细胞比容升高。（ ）
6. 脱水时血细胞比容升高。（ ）

单项选择：

1. 蛋白质的浓度在体液中的分布是（ ）
A. 细胞内液 > 血浆 > 组织液 B. 细胞内液 > 组织液 > 血浆
C. 血浆 > 组织液 > 细胞内液 D. 细胞内液 = 组织液 > 血浆
2. 与血液凝固密切相关的成分是（ ）
A. 白蛋白 B. 球蛋白 C. 纤维蛋白原 D. 肾素
3. 使血浆胶体渗透压降低的主要因素是（ ）
A. 血浆白蛋白减少 B. 血浆血蛋白增多
C. 血浆球蛋白增多 D. 血浆球蛋白减少
4. 血细胞比容是指血细胞（ ）
A. 在血液中所占的重量百分比 B. 在血液中所占的容积百分比
C. 与血浆容积的百分比 D. 与白细胞容积的百分比
5. 0.9%NaCl 溶液与血浆相同的是（ ）
A. 胶体渗透压 B. K^+ 浓度 C. Na^+ 浓度 D. 总渗透压

多项选择:

1. 下列叙述哪些与“血液”的概念相符 ()

- A. 血液是一种流体组织
- B. 血液是由血细胞和血浆组成
- C. 血液的颜色是由红细胞中血红蛋白所决定的
- D. 红细胞中的血红蛋白与 O_2 结合时, 血液是紫色; 血红蛋白与 CO_2 结合时, 血液呈鲜红色
- E. 血液的比重在 1.050~1.060 之间, 红细胞数越多, 血液比重越大

2. 血液的基本功能有 ()

- A. 分泌 B. 运输 C. 调节 D. 防御 E. 排泄

3. 血浆胶体渗透压降低可引起变化有 ()

- A. 血容量增多 B. 细胞内液减少
- C. 组织液容量增多 D. 进入毛细血管的水分减少

4. 血浆蛋白的主要功能有 ()

- A. 运输作用 B. 供能 C. 缓冲作用
- D. 参与机体的免疫功能 E. 参与凝血

血液小测（二）

填空题：

1. 正常人血液 pH 值为_____。血液 pH 值的相对恒定取决于所含的各种缓冲物质，在血浆中最主要的缓冲对是_____。
2. 成年男子红细胞水平比女子_____，这种差异主要与_____水平有关。
3. 红细胞的脆性越小，说明红细胞对低渗盐溶液的抵抗力越_____，越_____。
4. 红细胞生成的主要原料是_____和_____。
5. 红细胞生成的主要调节因素是_____和_____。
6. 离心沉淀后的抗凝血液，离心管上段是_____，下段是_____。
7. 胃腺壁细胞功能异常可使内因子缺乏，导致_____吸收障碍，可引起_____。
8. 高原居民红细胞数较多，是由于缺氧而导致肾脏产生_____增多所致。
9. 急性细菌性炎症的病人血中_____增多。
10. 血小板减少时，毛细血管的脆性_____。
11. 血小板聚集形成的血小板_____，可以堵塞小血管伤口，利于_____。

判断题：

1. 血小板释放的 5-羟色胺及儿茶酚胺等生物活性物质，有利于止血。（ ）
2. 血小板数量减少，则毛细血管脆性增加。（ ）
3. 血小板第一时相的聚集为不可逆性，第二时相的聚集为可逆性。（ ）

多项选择题：

1. 红细胞生成的原料有（ ）
A. 维生素 B₁₂ B. 维生素 K
C. 铁质 D. 蛋白质
E. 维生素 C
2. 促进红细胞成熟的因素有（ ）
A. 肝素 B. 叶酸
C. 维生素 B₁₂ D. 雄激素
E. 内因子和维生素 B₁₂

3. 红细胞生成过程中起调节作用的因素是 ()

- A. 雄激素 B. 铁质
- C. 肾素 D. 促红细胞生成素
- E. 血管紧张素

4. 缺铁性贫血 ()

- A. 红细胞数明显减少 B. 血红蛋白含量明显下降
- C. 红细胞体积代偿性增大 D. 叶酸缺乏可引起此病
- E. 红细胞数明显增多

5. 下列情况中哪种因素可使血沉加快 ()

- A. 血沉加快的红细胞置入正常血浆
- B. 正常红细胞置入血沉加快的血浆
- C. 血液中的白蛋白增加
- D. 血液中的球蛋白增加
- E. 血液中的球蛋白减少

6. 成人红细胞在发育过程中的主要变化是 ()

- A. 红细胞体积逐渐变小 B. 红细胞体积逐渐变大
- C. 红细胞核逐渐消失 D. 红细胞核变大
- E. 血红蛋白量逐渐减少

7. 红细胞的特点 ()

- A. 正常呈双凹圆盘形，具有可塑变形性
- B. 平均寿命 120 天
- C. 红细胞膜对各种物质具有选择通透性，高分子物质一般不能透过，某些低分子物质能透过
- D. 对低渗盐溶液具有一定的抵抗力
- E. 红细胞比重比血浆大，但红细胞的沉降却很慢

8. 红细胞成熟过程中起促进作用的因素有 ()

- A. 维生素 B₁₂ B. 雄激素
- C. 内因子 D. 叶酸
- E. 铁质

9. 白细胞的功能 ()

- A. 吞噬外来的微生物
- B. 吞噬机体本身的坏死细胞
- C. 吞噬抗原-抗体复合物
- D. 其嗜碱性粒细胞还能产生和贮存组胺和肝素
- E. 可形成抗体

10. 单核-巨噬细胞的功能 ()

- A. 吞噬和消灭致病微生物
- B. 识别和杀伤肿瘤细胞
- C. 吞噬衰老的红细胞和血小板
- D. 激活淋巴细胞的特异性免疫功能
- E. 释放嗜酸性粒细胞趋化因子 A

11. 白细胞包括 ()

- A. 嗜中性粒细胞 B. 嗜酸性粒细胞
- C. 嗜碱性粒细胞 D. 淋巴细胞
- E. 单核细胞

12. T 淋巴细胞的功能 ()

- A. 直接接触杀死靶细胞
- B. 产生淋巴因子 C. 参与体液免疫
- D. 调节红细胞的活性
- E. 产生多种有生物活性的物质

13. 能诱导血小板聚集的物质是 ()

- A. Ca²⁺ B. 5-HT
- C. ADP D. ATP
- E. 肾素

14. 血小板的生理功能有 ()
- A. 损伤刺激血小板释放使局部血管收缩的物质
 - B. 在损伤处血小板粘聚
 - C. 形成止血栓
 - D. 促进血液凝血
 - E. 对血管壁的营养支持功能

一、填空题

1. 外源性凝血过程是由_____所启动，这种因子存在于_____。
2. 血液凝固的基本过程分为_____, _____, _____三步。
3. 血液凝固是一种_____反应，加温可使凝固过程_____。

二、判断题

1. 外源性凝血是由因子III启动的，这种因子存在于组织中。（ ）
2. 血液凝固三个阶段都需要 Ca^{2+} 的参与。（ ）
3. 红细胞凝集后，经振荡不能使细胞彼此分开。（ ）
4. 因子 X 的激活是内源性凝血的开始。（ ）
5. 血液凝固的实质为血细胞凝聚成团。（ ）

三、单项选择题

1. 内源性凝血的始动因素是（ ）
A. 凝血因子IV被激活 B. 因子XII被激活
C. 血小板破裂 D. 凝血酶的形成
2. 可使血液凝固加快的主要因素是（ ）
A. 血小板破裂 B. 血管紧张素增加
C. 肾素分泌增加 D. 嗜酸性粒细胞增多
3. 引起血块回缩的因素是（ ）
A. 纤维蛋白 B. 血小板收缩蛋白
C. 凝血酶 D. 肝素
4. 血液凝固后析出的液体（ ）
A. 血清 B. 体液 C. 细胞外液 D. 血浆
5. 凝血过程中，内源性凝血与外源性凝血的区别在于（ ）
A. 凝血酶原激活物形成的始动因子不同
B. 凝血酶形成过程不同
C. 纤维蛋白形成过程不同
D. 因 Ca^{2+} 是否起作用而不同
6. 以下哪种凝血因子不属于蛋白质（ ）
A. 因子 I B. 因子 II C. 因子 IV D. 因子 X

7. 血液凝固的本质变化是：（ ）

- A 血小板聚集
- B 红细胞叠连
- C 血细胞凝聚
- D 纤维蛋白形成
- E 红细胞凝集

8. 血清成分的特点是：（ ）

- A 血液去掉纤维蛋白原
- B 抗凝血液经离心沉淀的上清液
- C 血浆除去血浆蛋白的液体
- D 全血除去血细胞后的液
- E 血浆去掉纤维蛋白原及某些凝血因子

9. 维生素 K 参与部分凝血因子的合成，当维生素 K 缺乏时，可能引起：（ ）

- A 因子 II、XI、X、V 缺乏
- B 因子 II、VII、IX、X 缺乏
- C 因子 III、VII、X、XI 缺乏
- D 因子 I、VIII、XI、XII 缺乏
- E 因子 II、V、VII、X 缺乏

10. 抗血友病因子是：（ ）

- A 因子 VII
- B 因子 IX
- C 因子 XI
- D 因子 X
- E 因子 VIII

11. 血液凝固的最后阶段是：（ ）

- A 因子 X 被激活
- B 纤维蛋白原变成纤维蛋白
- C 凝血酶原激活物的形成
- D 外源性凝血途径启动
- E 凝血酶原变成凝血酶

12. 与血液凝固无关的因素是：（ ）

- A 血小板数量
- B 肝脏功能
- C 血浆 NaCl 浓度
- D 红细胞凝集原
- E 凝血因子多少

13. 内源性凝血和外源性凝血的根本区别是：（ ）

- A 前者发生在体内，后者发生在体外
- B 前者发生在血管内，后者发生在血管外
- C 前者只需体内因子，后者只需体外因子
- D 前者由因子XII启动，后者由III因子启动
- E 前者速度慢，后者速度快

14. 柠檬酸钠抗凝血的机理是：（ ）

- A 去掉血浆中纤维蛋白原
- B 与血浆中的钙结合而沉淀
- C 加强抗凝血酶III作用
- D 抑制凝血酶原激活
- E 与血浆中 Ca^{2+} 形成可溶性络合物

15. 血管损伤后，首先与其接触活化的因子是（ ）

- A. V
- B. IX
- C. X
- D. XI
- E. XII

四. 多项选择题

1. 内源性凝血和外源性凝血的始动因子是（ ）

- A. 因子III B. 因子X
- C. 因子IX D. 因子II
- E. 因子XII

2. 血清与血浆的区别在于前者（ ）

- A. 缺乏纤维蛋白原
- B. 缺乏一些参与凝血的物质
- C. 增加了一些凝血过程产生的活动物质
- D. 含有大量白蛋白
- E. 含有红细胞

3. 关于内源性凝血的途径，叙述正确的是（ ）

- A. 胶原组织损伤首先激活因子XII
- B. 参与凝血步骤比较多
- C. 所需时间较外源性凝血长
- D. 许多环节有 Ca^{2+} 参与
- E. 不需因子II参加

第七次课堂小测

单选题:

1. 下面关于心室肌细胞 Na^+ 通道的描述,哪一项是错误的: ()
 - A.是电压依从性的
 - B.激活和失活的速度都很快
 - C.可被河豚毒所阻断
 - D.选择性较强,只有 Na^+ 可以通过
 - E.在去极化到 40mV 时被激活
2. 慢内向电流是指()
 - A. I_{Na}
 - B. I_{Ca}
 - C. I_{K1}
 - D. I_{f}
 - E. I_{to}
3. 快反应细胞复极化 1 期的离子流是()
 - A. I_{Na}
 - B. I_{Ca}
 - C. I_{K1}
 - D. I_{f}
 - E. I_{to}
4. 心室肌细胞动作电位的特点之一是()
 - A.持续时间短,小于 2 毫秒
 - B.去极化幅度小
 - C.0 期去极化主要与钙内流有关
 - D.升支与降支对称
 - E.复极有平台期
5. 内向整流是指()
 - A.过性钠离子的内向电流
 - B.钾离子的通透性因膜的去极化而降低
 - C.0 期去极化激活的 I_{K} 电流
 - D.通过 L 型钙离子通道的内向钠离子电流
 - E.通过 L 型钙离子通道的内向钙离子和钠离子电流
6. 下列关于心室肌细胞动作电位的描述,错误的是()
 - A.0 期主要由钠离子内流引起
 - B.1 期主要由钾离子外流引起
 - C.3 期主要由钾离子外流引起
 - D.2 期主要由钙离子内流引起
 - E.0 期去极化可被河豚毒阻断
7. 具有收缩功能的心肌细胞是()
 - A.窦房结 P 细胞
 - B.房室交界细胞
 - C.房室束细胞
 - D.心室肌细胞
 - E.浦肯野细胞

8. 心室肌细胞动作电位的主要特征是()
- A.去极化速度快
 - B.复极化快
 - C.复极化 2 期缓慢
 - D.有锋电位
 - E.有不应期
9. 心室肌细胞动作电位与骨骼肌细胞动作电位的主要区别是()
- A.形成去极相的离子流不同
 - B.静息电位水平不同
 - C.形成复极相离子流不同
 - D.超射值不同
 - E.阈电位不同
10. 健康成年男性静息状态下每搏量约为: ()
- A、30ml B、50ml C、70ml D、90ml E、110ml
11. 每搏输出量占下列哪个容积的百分数称为射血分数? ()
- A、回心血量 B、心输出量 C、等容舒张期容积
D、心室收缩末期容积 E、心室舒张末期容积
12. 异长自身调节通过改变下列哪个因素调节心脏泵血功能 ()
- A、平均动脉压
 - B、心率贮备
 - C、心力贮备
 - D、心室收缩末期容积
 - E、心室舒张末期容积
13. 心肌的等长自身调节, 通过改变下列哪个因素来调节心脏的泵血功能 ()。
- A.心室舒张末期容积 B.肌小节的初长度 C.心脏收缩能力 D.心肌初长度
14. 心室功能曲线主要反映了()。
- A.搏出量和心输出量两者的关系
 - B.每搏功和心室舒张末期压力两者的关系
 - C.搏出量和心率两者的关系
 - D.每搏功和心率两者的关系
 - E.心输出量和每搏功两者的关系
15. 下列关于正常人左心功能曲线的描述,哪一项是错误的?()
- A.一般情况下充盈压为 5~6mmHg
 - B.充盈压 12~15mmHg 为最适前负荷
 - C.充盈压 15~20mmHg 时曲线渐趋平坦
 - D.充盈压高于 20mmHg 时曲线平坦或轻度下倾
 - E.充盈压 50mmHg 时曲线明显下降

第九次课测验

- 1、当血流通过下列哪一部位时，血压的降落最大？（ ）
A、主动脉和大动脉 B、小动脉和微动脉 C、毛细血管
D、微静脉和小静脉 E、大静脉和腔静脉
- 2、收缩压相当于下列心动周期中哪期时的动脉内压力？（ ）
A、等容收缩期 B、快速射血期 C、减慢射血期
D、快速充盈期 E、减慢充盈期
- 3、收缩压为 100mmHg，舒张压为 70mmHg，其平均动脉压均为（ ）
A、70mmHg B、75mmHg C、80mmHg D、85mmHg E、90mmHg
- 4、高血压的诊断标准是什么？
A.收缩压 ≥ 140 mmHg，舒张压 ≥ 90 mmHg
B.收缩压 ≥ 130 mmHg，舒张压 ≥ 80 mmHg
C.收缩压 ≥ 90 mmHg，舒张压 ≥ 140 mmHg
- 5、是不是只有年纪大的才会得高血压？
A.是 B.不是
- 6、高血压会伤害身体的哪些部位？
A.心脏 B.大脑 C.肾脏 D. 以上都会
- 7、血压水平是呈现波动状态，是否正常？
A.正常 B.不正常
- 8、下面哪一个不是高血压患者应该做的事？
A.摆正心态 B.适当活动 C.实时监测 D. 随意吃喝
- 9、迷走神经对心脏的作用是：（ ）
A、心率减慢传导加快，而不应期缩短 B、心率减慢传导慢，而不应期延长
C、心率减慢传导慢，而不应期缩短 D、心率快传导慢，而不应期缩短
E、心率快，传导加快，而不应期缩短
- 10、当心迷走神经兴奋时（ ）
A、可使心率加快 B、心房肌收缩力加强 C、心房肌不应期缩短
D、房室传导速度加快 E、左心室收缩压升高
- 11、迷走神经末梢释放的乙酰胆碱可引起心率减慢是由于：（ ）

- A、窦房结细胞对 K^+ 通透性降低 B、窦房结细胞对 K^+ 通透性增加
C、窦房结细胞对 Ca^{2+} 通透性增加 D、窦房结细胞对 Na^+ 通透性增加
E、窦房结细胞对 Cl^- 通透性增加
- 12、刺激心迷走神经时，心肌的作用可被下列哪一种受体的拮抗剂所阻（ ）
A、 α -肾上腺素能受体 B、 β -肾上腺素能受体 C、组织胺能受体
D、胆碱能 M 受体 E、胆碱能 N 受体
- 13、心迷走神经对心脏的作用可被下列哪一种受体的拮抗剂所阻断？（ ）
A、M 胆碱能受体 B、N1 胆碱能受体 C、N2 胆碱能受体
D、 β 肾上腺素受体 E、 α 肾上腺素受体
- 14、关于心交感神经对心脏的作用，下列叙述哪一项是错误的？（ ）
A、末梢释放的递质是去甲肾上腺素 B、心肌细胞膜上的受体是 β 受体
C、可导致正性变时、变传导、变力作用 D、使心室舒张末期容积增大
E、使心室搏出的血量增多
- 15、心交感神经心肌效应的主要机制是：（ ）
A、明显增加 Ca^{2+} 通透性 B、减弱自律细胞 4 期的内向电流 I_f
C、使复极相 K^+ 外流减慢 D、增加肌钙蛋白的 Ca^{2+} 亲和力 E、不应期延长
- 16、下述儿茶酚胺对心肌的作用，哪一项是错误的？（ ）
A、减少自律细胞 4 期的 I_f 内向离子流 B、增加慢反应细胞 0 期 Ca^{2+} 内流
C、增加复极相 K^+ 外流 D、缩短心肌不应期 E、增加心肌收缩能力
- 17、心交感神经对心脏的兴奋作用，可被下列哪一种受体的拮抗剂所阻断？（ ）
A、M 胆碱能受体 B、N1 胆碱能受体 C、N2 胆碱能受体
D、 β 肾上腺素受体 E、 α 肾上腺素受体
- 18、在下述哪一种情况下，心交感神经的活动会减弱？（ ）
A、动脉血压降低时 B、肌肉运动时 C、血容量减少时
D、情绪兴奋时 E、由直立变为平卧时

19、关于人体内的多数血管的神经支配，下列哪一项是正确的？（ ）

- A、只接受交感舒血管神经纤维的单一支配
- B、只接受交感缩血管神经纤维的单一支配
- C、既有缩血管纤维也有舒血管纤维支配
- D、接受副交感舒血管神经支配
- E、接受血管活性肠肽神经元的支配

第十次课小测

一、单选题

- 1、调节心血管活动的基本中枢位于（ ）
A、大脑皮层 B、脊髓 C、下丘脑 D、脑干 E、延髓腹外侧部
- 2、平时维持交感缩血管纤维紧张性活动的基本中枢位于：（ ）
A、大脑 B、下丘脑 C、中脑和脑桥 D、延髓 E、脊髓中间外侧柱
- 3、急性失血时，最先出现的代偿反应是：（ ）
A、血管的自身调节 B、交感神经系统兴奋 C、组织液回收增加
D、血管紧张素II增多 E、心率明显加快
- 4、正常人血压升高时，身体通过一系列调节过程使血压下降至正常水平，该调节机制属于（ ）
A、神经调节 B、体液调节
C、正反馈调节 D、神经体液调节
- 5、减压反射的生理意义（ ）
A、降低动脉血压 B、升高动脉血压 C、维持动脉血压相对恒定
D、抑制心脏 E、扩增血管
- 6、下列哪种情况窦神经的传入冲动会增加（ ）
A、平均动脉压升高 B、平均动脉压降低
C、动脉血氧分压升高 D、动脉血氢离子浓度升高
- 7、关于肺的解剖说法错误的是（ ）
A、左肺由斜裂分为上叶、下叶
B、左肺由水平裂分为上叶、下叶
C、右肺由水平裂、斜裂分为上叶、中叶、下叶
D、右肺通常有10个肺段
- 8、属于下呼吸道的是（ ）
A、鼻 B、口咽 C、喉 D、气管 E、喉咽

二、机体调节血压的三种方式是什么？每一种方式调节血压的工作范围是什么？以及调节特点？

第十一次课测验

- 1.肺的弹性阻力来自_____和_____,其中以_____为主。肺的非弹性阻力主要来自_____,它受_____,_____和_____的影响。
- 2.弹性阻力大,不易扩张,顺应性_____;弹性阻力小,易扩张,顺应性_____
- 3.肺表面活性物质是由_____细胞分泌的脂蛋白混合物,主要成分是_____,分布于肺泡液体分子层的表面,即在液-气界面之间,肺泡表面活性物质的作用是_____。
- 4.呼吸的全过程包括(A)、(B)和(C)三个基本环节。
- 5.外呼吸包括(A)和(B)。
- 6.从以下名词中选择填空:

①↑, ②↓, ③乙酰胆碱, ④舒张, ⑤去甲肾上腺素, ⑥收缩

调节气道阻力:

交感神经分泌____→气管平滑肌____→气道口径____→气道阻力____→通气____

迷走神经分泌____→气管平滑肌____→气道口径____→气道阻力____→通气____

[单选]

7.下列关于肺泡表面活性物质的叙述,哪项是错误的?

[A]主要成分是二棕榈酰卵磷脂

[B]由肺泡 II 型细胞合成

[C]有降低表面张力的作用

[D]具有维持肺泡适当扩张状态的作用

[E]降低肺的顺应性

[单选]

8.肺泡表面活性物质减少将导致

[A]肺难于扩张

[B]肺弹性阻力减小

[C]肺顺应性增大

[D]肺泡内液体表面张力降低

[E]小肺泡内压小于大肺泡内压

[单选]

9.肺泡表面活性物质:

- [A]位于肺泡上皮与液体分子层之间
- [B]由肺泡I型细胞所分泌
- [C]主要成分是二硬脂酰卵磷脂
- [D]可使肺顺应性变大
- [E]增加泡表面张力

[单选]

10.与肺通气弹性阻力有关的是

- [A]肺泡表面张力
- [B]肺组织本身的弹性回缩力
- [C]两者均有
- [D]两者均无

[单选]

11.与肺通气非弹性阻力有关的是

- [A]肺泡表面张力
- [B]肺组织本身的弹性回缩力
- [C]两者均有
- [D]两者均无

12.肺的顺应性与肺的弹性回缩力呈正变关系。

- [A]是
- [B]非

[单选]

13.PCO₂从低到高的顺序一般为:

- [A].呼出气<组织细胞<静脉血<肺泡气
- [B].呼出气<肺泡气<静脉血<组织细胞
- [C].呼出气<肺泡气<组织细胞<静脉血
- [D].静脉血<呼出气<肺泡气<组织细胞
- [E].肺泡气<呼出气<组织细胞<静脉血

第十三次课测验

1. 血氧饱和度是指(A)占(B)的百分比。
2. 氧离曲线是表示(A)与(B)关系的曲线。
3. 影响氧离曲线的因素主要有(A)、(B)、(C)和(D), 氧离曲线右移, 说明血红蛋白与O₂亲和力(E)。
4. 目前公认的呼吸节律形成的假说为(A)假说, 它认为(B)的兴奋引发吸气动作, 再通过(C)机制发生呼气。
5. 肺牵张反射包括(A)和(B)两种成分。
6. 肺扩张反射的感受器分布在(A)与(B)平滑肌中, 该反射的传入神经是(C)。
7. 引起呼吸兴奋的化学感受器有(A)和(B)。
8. 外周化学感受器指(A)和(B), 中枢化学感受器位于(C)。
9. 外周化学感受器感受血液中(A)、(B)和(C)的改变而影响呼吸; 中枢化学感受器对脑脊或局部细胞外液中的(D)敏感。
10. 血液PCO₂升高主要通过(A), 其次通过(B)反射地引起呼吸增强。
11. 血液PO₂降低主要是通过(A)反射地引起呼吸增强, 缺氧对呼吸的直接作用是(B)。
12. 血液H⁺浓度升高可反射性使呼吸运动(A), 其作用途径主要是通过(B)。

第十四次课小测

- 1、食管上端约在第__颈椎体下缘平面与__相续，下端连接胃的__门。食管依其行程分为__、__和__三部。
- 2、胃的入口称__，与__相接；出口为__与__相延续。
- 3、胃的幽门部，可分为左侧的__和右侧的__两部分。
- 4、小肠上接胃的__，下接__，分__、__和__三部。
- 5、十二指肠呈“C”形包绕__，可分为__、__、__和__四部分。
- 6、十二指肠大乳头位于十二指肠的__部，它是__和__的共同开口。
- 7、十二指肠悬肌的作用是将__固定于腹后壁，也是临床手术中确定__起端的标志。
- 8、结肠和盲肠在形态上有__、__和__三大特征，借此与小肠区别。
- 9、没有结肠带的肠管是
 - A、横结肠
 - B、直肠
 - C、盲肠
 - D、乙状结肠

第十四次课小测

填空题

- 1、胆总管由___和___合成的，最后与___汇合共同开口于___。
- 2、平时状态下，肝分泌的胆汁经左右___、___和___ 贮存于___内。当进食时，胆汁经___和___排入十二指肠腔。
- 3、进出肝门的结构有___、___、___、___、___及___
- 4、胆囊位于肝下面的___内，分为___、___、___、___四部
- 5、消化有两种主要方式：_____和_____。
- 6、消化道平滑肌的电活动有_____、_____和_____三种形式。其中慢波的起步点是_____。

单项选择题

- 1、对消化道平滑肌生理特性的叙述，下列哪项错误（ ）
A、富有伸展性 B、具有像心脏一样规则的自律性 C、具有紧张性收缩
D、兴奋性低 E、对机械牵张刺激敏感
- 2、关于消化道平滑肌生理特性的叙述，正确的是：（ ）
A、兴奋性比骨骼肌高 B、收缩速度较慢 C、伸张性小
D、对化学刺激不敏感 E、有稳定的自发节律性
- 3、消化道平滑肌对下列哪种刺激反应不敏感（ ）
A、机械牵张 B、电和切割 C、温度变化 D、酸碱等化学物质 E、缺血和平滑肌痉挛
- 4、消化器官不具备下列哪种功能（ ）
A、消化食物 B、内分泌 C、免疫 D、吸收营养 E、维持酸碱平衡
- 5、关于消化道平滑肌基本电节律的叙述，正确的是：（ ）
A、胃肠各段的频率相同 B、起步点是纵肌与环肌之间的 Cajal 细胞
C、依赖于支配神经的存在 D、不受体液因素的影响 E、可促发肌肉收缩
- 6、胃肠平滑肌动作电位产生的主要离子基础是：（ ）
A、K⁺内流 B、Na⁺内流 C、Ca²⁺内流 D、Cl⁻外流 E、K⁺外流