

-
- *Tillåtna medel: sedvanliga skrivdon.*
 - *Varje uppgift är värd 5 p. För betyget 3, 4, 5 krävs 18, 25 respektive 32 p. Eventuella bonuspoäng räknas vid resultatet 16 p eller mer.*
 - **Varje svar ska motiveras noga! Enbart svar utan motivering ger 0p. Skriv tydligt och hoppa inte över nödvändiga steg.**
-

- (1) Vilka av nedanstående delmängder är delrum i respektive vektorrum? För varje delrum, ange dess dimension.
- (a) Delmängden av alla symmetriska matriser i vektorrummet av alla 3×3 -matriser med vanlig matrisaddition och multiplikation med skalär;
 - (b) $\{(x, y, z)^T \mid y \geq 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$;
 - (c) $\{p(x) \mid p(0) = 1\} \subseteq P_n(\mathbb{R})$;
 - (d)

$$\{\mathbf{x} \mid \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = 3\mathbf{x}\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

- (2) Låt $\mathcal{M}_{2 \times 2}$ vara vektorrummet av alla matriser av storlek 2×2 och betrakta delmängden S som består av följande matriser:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Ange en bas för det linjära höljet av S , $\text{Span}(S)$.
- (b) Avgör om matriserna

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \text{ och } B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

tillhör $\text{Span}(S)$. Uttryck en av dem som $\sum_{i=1}^4 a_i M_i$ på minst två olika sätt.

- (3) Låt $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ vara rotation $\pi/2$ radianer moturs kring z -axeln och $P : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ortogonal projektion på planet $x + z = 0$.
- (a) Ange standardmatriserna $[R]$ och $[P]$ för respektive linjär avbildning. Vad blir $P((\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{2})^T)$ och $P((\sqrt{2}, \sqrt{3}, -\sqrt{2})^T)$?
 - (b) Ange standardmatrisen för den sammansatta avbildningen av att först projicera en vektor på $x + z = 0$ och sedan rotera $\pi/2$ radianer moturs kring z -axeln. Ange kärnan (kernel) för denna sammansatta avbildning.
- (4) (a) Definiera begreppet *diagonaliserbar* matris.
- (b) Visa att om en matris A är diagonaliserbar (över ett reellt vektorrum), så är även A^{-1} diagonaliserbar.
 - (c) Avgör vilken av matriserna

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ och } C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

som är diagonaliserbar och förklara varför de två andra inte är det.

(5) Lös följande system av differentialekvationer:

$$\begin{cases} y_1' &= 4y_1 + y_2 - y_3 \\ y_2' &= y_1 + 4y_2 - y_3 \\ y_3' &= 3y_1 + 3y_2 \end{cases}.$$

(6) Definiera en inre produkt på $P_2(\mathbb{R})$ genom $\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx$.

(a) Räkna ut normen av standardpolynomen $1, x$ och x^2 samt vinkeln mellan 1 och x .

(b) Ange en ON-bas för $\text{Span}(\{1, x\})$.

(7) Låt $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 8x_1x_2$ och $g(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 3x_2^2$.

(a) Gör ett ON-basbyte så att den blandade termen i $f(x_1, x_2)$ försvinner. Vilken geometrisk figur beskriver $f(x_1, x_2) = 1$?

(b) Vilken geometrisk figur beskriver $g(x_1, x_2) = 1$ efter samma variabelbyte som är gjord i (a)?

(8) (a) Definiera begreppet *linjär avbildning*.

(b) Visa att om T är en linjär avbildning, är $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

(c) Låt $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ vara en bas för ett vektorrum V och låt en linjär operator $T : V \rightarrow V$ vara definierad via $T(\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_1, T(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3, T(\mathbf{v}_3) = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3$.
Ange en bas för operatorns kärna $\text{Ker}(T)$ respektive bildrum/värderum $R(T)$.

LÖCKA TILL!