

微分方程数值解第四周第二次作业

作业:

$$\begin{cases} -(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}) = (\pi^2 - 1)e^x \sin(\pi y) & , \quad 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1 \\ u(0, y) = \sin(\pi y), u(2, y) = e^2 \sin(\pi y) & , \quad 0 \leq y \leq 1 \\ u(x, 0) = 0, u(x, 1) = 0, & , \quad 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

该问题的精确解为 $u(x, y) = e^x \sin(\pi y)$.

定义误差为

$$E(h_1, h_2) = \max_{\substack{1 \leq i \leq M-1 \\ 1 \leq j \leq N-1}} |u(x_i, y_j) - u_{ij}|$$

请分析误差在不同步长下的变化情况，验证误差阶，并画出误差图。

解：将 x 等分为 M 份，将 y 等分为 N 份。

差分格式为

$$-\frac{1}{h_2^2}u_{i,j-1} - \frac{1}{h_1^2}u_{i-1,j} + 2(\frac{1}{h_1^2} + \frac{1}{h_2^2})u_{i,j} - \frac{1}{h_1^2}u_{i+1,j} - \frac{1}{h_2^2}u_{i,j+1} = f_{i,j}$$

其中， $1 \leq i \leq M-1, 1 \leq j \leq N-1$. $f_{i,j} = (\pi^2 - 1)e^{x_i} \sin(\pi y_j)$.

可用高斯-塞德尔迭代解方程组，迭代式写为

$$u_{i,j}^{k+1} = [f(x_i, y_j) + \frac{1}{h_2^2}u_{i,j-1}^{k+1} + \frac{1}{h_1^2}u_{i-1,j}^{k+1} + \frac{1}{h_1^2}u_{i+1,j}^k + \frac{1}{h_2^2}u_{i,j+1}^k] / [2(\frac{1}{h_1^2} + \frac{1}{h_2^2})]$$

k 表示第 k 次迭代

解题程序运行于 **Matlab 2018a**.

当 $M=40, N=10$ 时的数值解和精确解对比见图1, 从图像上看很接近。

当取不同的 M 和 N 时，数值解在一些点上的取值和精确解见表1, 可知，当区间数越大，即步长越小，数值解越接近与精确解。

取不同 M 和 N 时，误差见图2, M 和 N 越大，误差越小。

定义误差阶为

$$rate = \log_2(E(2h_1, 2h_2)/E(h_1, h_2))$$

求出上述不同 M, N 对应的步长误差阶，见表2, 误差达到了 2 阶，为五点差分格式截断误差的阶数。






图 1

表 1 不同 M, N 下一些点的数值解和精确解


M, N	$x(y=0.5)$			
	0.4	0.8	1.2	1.6
20,10	1.502594	2.243849	3.345099	4.979283
40,20	1.494511	2.230105	3.326353	4.959601
80,40	1.492491	2.226674	3.321668	4.954671
160,80	1.491982	2.225809	3.320490	4.953433
精确解	1.491825	2.225541	3.320117	4.953032




(a) $M=20, N=10$ 时的误差



(b) $M=40, N=20$ 时的误差



(c) $M=80, N=40$ 时的误差



(d) $M=160, N=80$ 时的误差

图 2 取不同 M, N 的误差

表 2 不同步长的误差和误差阶

h_1, h_2	$E(h_1, h_2)$	rate
1/10, 1/10	2.7133E-02	*
1/20, 1/20	6.7925E-03	1.998021
1/40, 1/40	1.6934E-03	2.003985
1/80, 1/80	4.1181E-04	2.039917