DeepL
订阅DeepL Pro以翻译大型文件。
欲了解更多信息，请访问www.DeepL.com/pro。

恢复统计

输入文件： 标准输入
输出文件： 标准输出
时间限制 1 秒 内存限制
1024 兆字节

你们最近对大学生从宿舍到教学楼的通勤时间进行了调查。您认为这项调查可以极大地改善校园规划，使师生的通勤更加方便。作为分析的一部分，您计算了 P50、P95 和 P99 通勤时间，以支持您的结论。例如，集合 {1, 1, 4, 5, 1, 4} 的 P50 可以是 1、2 或 3，因为**正好**有 6 × 50% = 3 个值小于或等于 1、2 或 3。但是，这些值没有有效的 P95 或 P99，因为 6 × 95% 和 6 × 99% 不是整数。

不幸的是，出错了--您不小心删除了整个数据集。您只剩下通勤时间的 P50、P95 和 P99 值。由于没有时间重做调查，您需要重建一组与所有 P50、P95 和 P99 值相匹配的数据。

输入

输入由三行组成。第一行包含一个整数 a，代表 P50 值。第二行包含一个整数 b，代表 P95 值。第三行包含一个整数 c，代表 P99 值。$(1 \le a < b < c < 10)^9$

输出

输出两行。第一行应包含一个整数 n（$100 \le n \le 10^5$），表示数据集的长度。

第二行应包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$（$1 \le a_i \le 10^9$），表示重建的数据集。整数的顺序可以任意。任何符合要求的输出都将被认为是正确的。

示例

标准输入	标准输出
50 95 99	100 1 2 ...100

备注

为便于显示，示例输出省略了 3 到 99 之间的值。在您的输出中，必须包含所有这些值。

请注意，本问题中 Px 值的定义不同于 x 百分位数。