

Лекция 7

Определение и свойства математического ожидания случайных величин

Пусть X - дискретная случайная величина:

X	x_1	x_2	\dots	x_k
P	p_1	p_2	\dots	p_k

Пусть проведено n экспериментов, в результате которых значение x_1 «выпало» n_1 раз,
значение x_2 «выпало» n_2 раз,
... ..
значение x_k «выпало» n_k раз,
так что $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. Тогда среднее арифметическое случайной величины X в данной серии экспериментов есть

$$\bar{x}_n = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k}{n}$$

Найдём предел при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = x_1 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n_1}{n} \right) + x_2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n_2}{n} \right) + \dots + x_k \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n_k}{n} \right)$$

Но, в соответствии со статистическим восприятием вероятности,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n_1}{n} \right) = p_1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n_2}{n} \right) = p_2, \quad \dots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n_k}{n} \right) = p_k.$$

Поэтому,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_k p_k$$

- среднее арифметическое случайной величины X в «длинных» ($n \rightarrow \infty$) сериях экспериментов

Определение Математическим ожиданием дискретной случайной величины X

X	x_1	x_2	\dots	x_k
P	p_1	p_2	\dots	p_k

называется число

$$M\{X\} = \sum_i x_i p_i,$$

если ряд справа сходится абсолютно. (Если X - дискретная случайная величина с конечным спектром, то ряд превращается в конечную сумму.) В противном случае говорят, что X не имеет математического ожидания.

Пример 1. Пусть случайная величина X распределена по биномиальному закону:

X	0	1	\dots	k	\dots	n
P	q^n	npq^{n-1}	\dots	$C_n^k p^k q^{n-k}$	\dots	p^n

Тогда

$$\begin{aligned}
 M\{X\} &= \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=1}^n k C_n^k p^k q^{n-k} \\
 &= \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k} = \sum_{k=1}^n \frac{n \cdot (n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} p p^{k-1} q^{n-1-(k-1)} \\
 &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} p^{k-1} q^{n-1-(k-1)}
 \end{aligned}$$

Проведем замену индекса суммирования $m = k - 1$

$$M\{X\} = np \sum_{m=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{m!(n-1-m)!} p^m q^{n-1-m} = np \cdot (p+q)^{n-1} = np,$$

поскольку $p+q=1$.

Пример 2. Пусть случайная величина X распределена по геометрическому закону:

X	1	2	\dots	k	$0 < p < 1, q = 1 - p$
P	p	qp	\dots	$q^{k-1}p$	

Тогда

$$\begin{aligned}
 M\{X\} &= \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} p = p \sum_{k=1}^{\infty} (q^k)' = p \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)' \\
 &= p(q + q^2 + \dots)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)' = p \left(\frac{1 \cdot (1-q) - q \cdot (-1)}{(1-q)^2} \right) = \frac{1}{p}.
 \end{aligned}$$

Здесь $(\dots)'$ - производная по q .

Пример 3. Пусть случайная величина X распределена по закону Пуассона:

X	0	1	2	...	k
P	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$...	$\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

Тогда

$$\begin{aligned} M\{X\} &= \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \left(1 + \frac{\lambda}{1!} + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \dots \right) = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$

Пусть теперь X - непрерывная случайная величина с плотностью распределения $f(x)$. Будем сначала считать, что X может принимать значение только из промежутка от a до b . Введём разбиение

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

Обозначим

$$p_k = P\{x_{k-1} < X < x_k\} = \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

По теореме о среднем $\exists \tilde{x}_k \in (x_{k-1}, x_k)$ такая, что $p_k = f(\tilde{x}_k) \Delta x_k$, где $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$. Рассмотрим дискретную случайную величину \tilde{X} , вводимую таблицей

\tilde{X}	\tilde{x}_1	\tilde{x}_2	...	\tilde{x}_n
P	p_1	p_2	...	p_n

Случайную величину \tilde{X} можно рассматривать как некоторую дискретную аппроксимацию непрерывной случайной величиной X , причём эта аппроксимация тем точнее и полнее, чем больше n и меньше Δx_k . Имеем

$$M\{\tilde{X}\} = \sum_{k=1}^n \tilde{x}_k p_k = \sum_{k=1}^n \tilde{x}_k f(\tilde{x}_k) \Delta x_k$$

При $n \rightarrow \infty$, $\max_k \Delta x_k \rightarrow 0$ сумма справа стремится к интегралу

$$\int_a^b x f(x) dx$$

Определение Математическое ожидание непрерывной случайной величиной X с плотностью распределения $f(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, есть число

$$M\{X\} = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx,$$

если интеграл сходится абсолютно. В противном случае говорим, что случайная величина X не имеет математического ожидания.

Пример 4. Пусть случайная величина X равномерно распределена на отрезке $[a, b]$, т.е.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin [a, b] \\ \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \end{cases}$$

Тогда

$$M\{X\} = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a}dx = \frac{a+b}{2}$$

Пример 5. Пусть случайная величина X имеет показательное распределение с параметром λ :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \Rightarrow M\{X\} = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$

Пример 6. Пусть случайная величина X имеет нормальное распределение:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in (-\infty; +\infty)$$

Тогда

$$M\{X\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = a$$

Пример 7. Пусть случайная величина X задаётся плотностью распределения

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2\lambda}{\pi} \cdot \frac{1}{\lambda^2 + x^2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

где $\lambda > 0$ - параметр (распределение Коши).

Тогда

$$M\{X\} = \int_0^{\infty} \frac{2\lambda x}{\pi(\lambda^2 + x^2)} dx$$

Но последний интеграл расходится, следовательно случайная величина, распределённая по Коши, не имеет математического ожидания.

Свойства математического ожидания

1. Постоянный множитель можно выносить за знак математического ожидания:

$$M\{c \cdot X\} = c \cdot M\{X\}$$

2. Математическое ожидание суммы равно сумме математических ожиданий:

$$M\{X_1 + X_2 + \dots + X_n\} = M\{X_1\} + M\{X_2\} + \dots + M\{X_n\}$$

3. Математическое ожидание произведения независимых случайных величин равно произведению математических ожиданий сомножителей:

$$M\{X_1 X_2 \dots X_n\} = M\{X_1\} \cdot M\{X_2\} \cdot \dots \cdot M\{X_n\}$$

4. Пусть X - дискретная случайная величина

$$\begin{array}{c|ccc} X & x_1 & x_2 & \dots \\ \hline P & p_1 & p_2 & \dots \end{array}$$

Пусть $\varphi(x)$ - заданная функция, причём x_1, x_2, \dots входят в область определения $\varphi(x)$.

Тогда определим случайную величину Y : $Y = \varphi(X)$.

$$M\{Y\} = \sum_i p_i \cdot \varphi(x_i).$$

5. Если в предыдущем пункте X - непрерывная случайная величина с плотностью $f(x)$, то

$$M\{Y\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x) dx.$$

Докажем свойство 3.

Пусть X и Y - дискретные случайные величины

$$\begin{array}{c|ccc} X & x_1 & x_2 & \dots \\ \hline P & p_1 & p_2 & \dots \end{array} \quad \begin{array}{c|ccc} Y & y_1 & y_2 & \dots \\ \hline P & q_1 & q_2 & \dots \end{array}$$

Пусть $Z = XY$. Тогда Z принимает значение $x_i y_j$ с вероятностями $P\{X = x_i, Y = y_j\}$ и

$$\begin{aligned} M\{Z\} &= \sum_{i,j} x_i y_j P\{X = x_i, Y = y_j\} = \\ &\{ \text{Независимость случайных величин } X \text{ и } Y \text{ означает} \\ &\text{независимость событий } X = x_i \text{ и } Y = y_j \} \\ &= \sum_{i,j} x_i y_j P\{X = x_i\} P\{Y = y_j\} = \\ &= \sum_i x_i P\{X = x_i\} \cdot \sum_j y_j P\{Y = y_j\} = M\{X\} \cdot M\{Y\} \end{aligned}$$

Пусть теперь X и Y - непрерывные случайные величины с плотностью совместного распределения $f(x, y)$. Пусть $Z = XY$. Тогда

$$\begin{aligned} M\{Z\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_1(x) f_2(y) dx dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_1(x) dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} y f_2(y) dy = M\{X\} \cdot M\{Y\}, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать

(если X и Y независимы, то $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$, где $f_1(x)$ и $f_2(y)$ - одномерные плотности случайных величин X и Y).