

# 1. Базовая комбинаторика, биномиальная теорема

## Основные правила

**Правило суммы** гласит, что если  $A$  и  $B$  – несвязанные события, причем существует  $n_1$  возможных исходов события  $A$  и  $n_2$  возможных исхода события  $B$ , то возможное число исходов события « $A$  или  $B$ » равно сумме  $n_1 + n_2$ .

**Правило произведения** утверждает, что если дана последовательность  $k$  событий с  $n_1$  возможными исходами первого,  $n_2$  – второго, и т.д., вплоть до  $n_k$  возможных исходов последнего, то общее число исходов последовательности  $k$  событий равно произведению  $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$ .

Мы выбираем  $k$  элементов из множества  $S$  мощности  $n$ . Если при этом порядок последовательности имеет значение, то мы получаем  $(n, k)$ -**размещение**, а в противном случае –  $(n, k)$ -**сочетание**. **Размещение с повторениями** получается в том случае, если в последовательности выбираемых элементов мы разрешаем появляться одинаковым, иначе мы имеем дело с размещением без повторений. Аналогично определяются сочетания с повторениями и без повторений.

## Биномиальная теорема

**Бином Ньютона** – это формула:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) a^{n-k} b^k \quad , \text{ где } C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

$$C(n, k) = C(n, n - k).$$

Формула Паскаля:

$$C(n - 1, k - 1) + C(n - 1, k) = C(n, k), \quad 0 < k < n.$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} C(n - 1, k - 1) + C(n - 1, k) &= \frac{(n - 1)!}{(n - k)!(k - 1)!} + \frac{(n - 1)!}{(n - k - 1)!k!} = \\ &= \frac{(n - 1)!}{(n - k - 1)!(k - 1)!} \left( \frac{1}{n - k} + \frac{1}{k} \right) \\ &= \frac{(n - 1)!}{(n - k - 1)!(k - 1)!} \left( \frac{n}{(n - k)k} \right) = \\ &= \frac{n!}{(n - k)!k!} = C(n, k) \end{aligned}$$

Общие количества всех  $(n, k)$ -размещений и  $(n, k)$ -сочетаний, как с повторениями, так и без оных даны в таблице:

	Порядок существенен	Порядок не существен
Элементы повторяются	размещения с повторениями $n^k$	сочетания с повторениями $\frac{(n + k - 1)!}{k!(n - 1)!}$
Элементы не повторяются	размещения без повторений $\frac{n!}{(n - k)!}$	сочетания без повторений $\frac{n!}{(n - k)!k!}$

**Теорема о перестановках** утверждает, что существует

$$\frac{n!}{n_1!n_2! \cdot \dots \cdot n_r!}$$

различных перестановок  $n$  объектов,  $n_1$  из которых относятся к типу 1,  $n_2$  – к типу 2, и т.д. вплоть до  $n_r$  объектов типа  $r$ .

**Пример.** Сколькими способами можно распределить 15 студентов по трем учебным группам по пять студентов в каждой?

**Решение.** У нас есть 15 объектов, которые нужно организовать в три группы по пять. Это можно сделать

$$\frac{15!}{5!5!5!} = 68795$$

различными способами.

# Домашнее задание

## Часть I

1. У женщины в шкафу висит шесть платьев, пять юбок и три блузки. Сколько разных нарядов она может составить из своей одежды?
2. Сколько четырехзначных чисел, не превосходящих 6000, можно составить, используя только нечетные цифры?
3. Пусть  $S$  – множество четырехзначных чисел, в чьей десятичной записи участвуют цифры: , 1, 2, 3, и 6, причем на первом месте, естественно, стоять не может.
  - а) Какова мощность множества  $S$ ?
  - б) Сколько чисел из  $S$  в своей десятичной записи не имеют повторяющихся цифр?
  - в) Как много четных среди чисел пункта (б)?
  - г) Сколько чисел из пункта (б) окажутся больше, чем 4000?
4. Комитет из 20 членов избирает председателя и секретаря. Сколькими способами это можно сделать?
5.
  - а) Ресторан в своем меню предлагает пять различных главных блюд. Каждый из компании в шесть человек заказывает свое главное блюдо. Сколько разных заказов может получить официант?
  - б) Цветочница продает розы четырех разных сортов. Сколько разных букетов можно составить из дюжины роз?
6. Вы покупаете пять рождественских открыток в магазине, который может предложить четыре разных типа приглянувшихся Вам открыток.
  - а) Как много наборов из пяти открыток вы можете купить?
  - б) Сколько наборов можно составить, если ограничиться только двумя типами открыток из четырех, но купить все равно пять открыток?
7. Воспользуйтесь формулой Паскаля для доказательства равенства:

$$C(n, k) + 2C(n, k + 1) + C(n, k + 2) = C(n + 2, k + 2), \text{ при } 0 \leq k \leq n - 2$$

8. Положив в бинOME Ньютона  $a = b = 1$ , покажите, что для любого  $n = 0, 1, 2, \dots$  справедлива формула:

$$\sum_{k=0}^n C(n, k) = 2^n$$

Выведите отсюда, что в множестве  $S$  из  $n$  элементов содержится ровно  $2^n$  различных подмножеств. (Указание: определите сначала, сколько подмножеств мощности  $k$  содержится в  $S$ .)

**9.**

**а)** Сколько разных «слов» можно получить из слова

«АБРАКАДАБРА»?

**б)** Сколько из них начинаются с буквы «К»?

**в)** В скольких из них обе буквы «Б» стоят рядом?