

Examples

Prove that

$$\boxed{1} \quad \sum_{r=1}^{\infty} \frac{r}{(r+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$$

Solution

~~① at  $n=1$~~ 

# العلاقة لجواب انبار هي :

$$\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$$

But  $\boxed{n=1}$ 

$$\text{L.H.S.} = \frac{1}{2!} = \frac{1}{2}$$

$$\text{R.H.S.} = 1 - \frac{1}{2!} = \frac{1}{2}$$

العلاقة صحيحة  
عند  $n=1$ ② at  $\boxed{n=k}$ 

Let

$$\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{k}{(k+1)!} = 1 - \frac{1}{(k+1)!}$$

③ at  $\boxed{n=k+1}$ 

R.T.P

$$\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{k+1}{(k+2)!} = 1 - \frac{1}{(k+2)!}$$

$$\text{L.H.S.} = \underbrace{\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{k}{(k+1)!}}_{\downarrow \text{From } \textcircled{2}} + \frac{k+1}{(k+2)!}$$

$$= 1 - \frac{1}{(k+1)!} + \frac{k+1}{(k+2)!}$$

نلاحظ ان

مجموعة المنتشر شير  
للخدمات الطلابية  
سنة الخامسة

Center share

$$\begin{aligned}
 &= 1 - \left[ \frac{1}{(k+1)!} - \frac{k+1}{(k+2)(k+1)!} \right] \\
 &= \frac{1}{(k+1)!} \left[ 1 - \frac{k+1}{k+2} \right] \\
 &= 1 - \frac{1}{(k+1)!} \left[ \frac{k+2-k-1}{(k+2)} \right] \\
 &= 1 - \frac{1}{(k+1)!} \left[ \frac{1}{k+2} \right] = 1 - \frac{1}{(k+2)} = R.H.S.
 \end{aligned}$$

(n+1)! = (n+1) n!

Ex 2  $\frac{8}{3 \times 5} - \frac{12}{5 \times 7} + \frac{16}{7 \times 9} + \dots$  to n terms

$$= \frac{1}{3} + \frac{(-1)^{n-1}}{2n+3}$$

Solution

الحل

L.H.S.

$$\begin{aligned}
 &\frac{8}{3 \times 5} - \frac{12}{5 \times 7} + \frac{16}{7 \times 9} + \dots + \frac{(-1)^{n+1} \cdot 4 \cdot (n+1)}{(2n+1)(2n+3)} \\
 &= \frac{1}{3} + \frac{(-1)^{n+1}}{2n+3}
 \end{aligned}$$

① at n=1

$$\begin{aligned}
 L.H.S. &= \frac{8}{3 \times 5} = \frac{8}{15} \\
 R.H.S. &= \frac{1}{3} + \frac{(-1)^1}{2+3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{5+3}{15} = \frac{8}{15}
 \end{aligned}$$

Center Share

$$n=1$$

is now good!

②  $n=k$

Let

$$\frac{8}{3 \times 5} - \frac{12}{5 \times 7} + \frac{16}{7 \times 9} + \dots + \frac{(-1)^{k+1} \cdot 4 \cdot (k+1)}{(2k+1)(2k+3)}$$

Center Share

$$= \frac{1}{3} + \frac{(-1)^{k-1}}{2k+3}$$

Center Share

③ at  $n=k+1$

R.T.P.

$$\frac{8}{3 \times 5} - \frac{12}{5 \times 7} + \frac{16}{7 \times 9} + \dots + \frac{(-1)^{k+2} \cdot 4 \cdot (k+2)}{(2k+3)(2k+5)}$$

Center Share

$$= \frac{1}{3} + \frac{(-1)^k}{2k+5}$$

$$L.H.S = \frac{8}{3 \times 5} - \frac{12}{5 \times 7} + \dots + \frac{(-1)^{k+1} \cdot 4 \cdot (k+1)}{(2k+1)(2k+3)}$$

from (2) ↓

السابقة هو

$$+ \frac{(-1)^{k+2} \cdot 4 \cdot (k+2)}{(2k+3)(2k+5)}$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{(-1)^{k-1}}{(2k+3)} + \frac{(-1)^{k+2} \cdot 4 \cdot (k+2)}{(2k+3)(2k+5)}$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{(-1)^{k-1}}{2k+3} + \frac{(-1)^{k-1} \cdot (-1)^3 \cdot 4 \cdot (k+2)}{(2k+3)(2k+5)}$$

Center Share

لذلك  $(-1)^{k+2} = (-1)^{k-1} \cdot (-1)^3$   
 لأن  $(-1)^3 = -1$   
 من أوله من جهة هناك  
 نوزع على

$$\begin{aligned}
 \therefore L.H.S. &= \frac{1}{3} + \frac{(-1)^{k-1}}{2k+3} \left[ 1 - \frac{4(k+2)}{2k+5} \right] \\
 &= \frac{1}{3} + \frac{(-1)^{k-1}}{2k+3} \left[ \frac{2k+5-4k-8}{(2k+5)} \right] \\
 &= \frac{1}{3} + \frac{(-1)^{k-1}}{2k+3} \left[ \frac{-2k-3}{2k+5} \right] \\
 &= \frac{1}{3} + \frac{(-1)^k}{2k+3} \cdot \frac{2k+3}{2k+5} = \frac{1}{3} + \frac{(-1)^k}{2k+5} \\
 &= R.H.S. \quad \#
 \end{aligned}$$

Ex 3 Prove that  $7 + 3^{2n}$  is divisible by 8  $\forall n \geq 1$

(البيان أن  $7 + 3^{2n}$  يقبل القسمة على 8 لكل قيم  $n < \infty$ )

الحل  
نرى يقبل القسمة على 8  
بإدخال قيم  $n$  في  $7 + 3^{2n}$  نرى أنها تقبل القسمة على 8



\* at  $n = 1$

$$(0 \text{ باقى}) + \text{ناتج عدد صحيح} = \frac{7+3}{8} \quad 2(1)$$

حاصلون راتبات أن

$$\therefore \frac{7+3^2}{8} = \frac{7+9}{8} = \frac{16}{8} = 2 \rightarrow \text{عدد صحيح}$$

$n=1$  العلاقة صحيحة عند

8 ملاحظة:  
لا تقبل البسطة على 2 لأن  
 $\frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2}$   
الباقي  $\neq 0$

Center Share

\* at  $n = k$  let  $\frac{7+3^{2k}}{8} = r$  Integer number عدد صحيح

$$7 + 3^{2k} = 8r$$

Center Share

\* at  $n = k+1$  R.T.P

$$\frac{7+3^{2(k+1)}}{8} = M$$

$$7 + 3^{2k+2} = 8M$$

Center Share

يعني مطلوب راتبات

$$L.H.S. = 7 + 3^{2k+2} = 7 + 3^{2k} \cdot 3^2 = 7 + 9 \cdot 3^{2k}$$

مع رقم 2 نوجد فقط حيث أن المقادير السابقة هي موجودة في 2  
منها في الـ 9 موجودة وفلاصة

$$\therefore 3^{2k} = 8r - 7$$

$$\begin{aligned} \therefore L.H.S. &= 7 + (8r - 7) \cdot 9 \\ &= 7 + 72r - 63 \\ &= 72r - 56 = 8[9r - 7] \end{aligned}$$

مجموعه اساتذ  
للخدمات الطلابية  
كلية الهندسة

$$= 8[\text{عدد صحيح}] = 8 \cdot M = R.H.S$$

العلاقة صحيحة لجميع قيم  $n$  تتلخص

Center Share

Ex: Prove that:

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n} \quad n > 1$$

Solution

①  $n=2$

$$L.H.S = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = 1.707$$

$$R.H.S = \sqrt{2} = 1.4$$

$$\therefore L.H.S > R.H.S \quad \checkmark \checkmark$$

مكتبة جامعة طنطا  
مكتبات الطلابية  
طبعة ٢٠٠٨

②  $n=k$  let

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} > \sqrt{k}$$

Center Share

③  $n=k+1$  R.T.P

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k+1}} > \sqrt{k+1}$$

or

Center Share

$$\left[ \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \right] + \frac{1}{\sqrt{k+1}} - \sqrt{k+1} > 0$$

$$L.H.S = \left[ \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \right] + \frac{1}{\sqrt{k+1}} - \sqrt{k+1}$$

الطاقة رقم ② يقولون ان  
دقة كبير عن  $\sqrt{k}$

لو كانت دقة  $\sqrt{k}$  مكانة فإن ال L.H.S. يتغير عن

$$\therefore L.H.S > \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} - \sqrt{k+1}$$

Center Share

$$L.H.S > \frac{\sqrt{k^2+k} + 1 - k - 1}{\sqrt{k+1}}$$

Center share

$$L.H.S > \frac{\sqrt{k^2+k} - \cancel{k} \rightarrow \sqrt{k^2}}{\sqrt{k+1}}$$

Center share

$$L.H.S > \frac{\sqrt{k^2+k} - \sqrt{k^2}}{\sqrt{k+1}}$$

Center share

$$\therefore \sqrt{k^2+k} > \sqrt{k^2}$$

$$\sqrt{k+1} > 0$$

$$\therefore R.H.S > 0$$

مجموعه منتدو شير  
لخدمات الطلابية  
كلية الهندسة

موقع

$$\therefore L.H.S > 0$$

Center share

Center share

\* Report:- Prove that ..

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (\text{نظرية})$$

⊗ Prove that:

to n terms

$$\frac{1^2}{1 \cdot 3} + \frac{2^2}{3 \cdot 5} + \frac{3^2}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{n^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n(n+1)}{2(2n+1)}$$

Proof:- ① let  $n=1$

$$\text{L.H.S.} = \frac{1}{1 \cdot 3} = \frac{1}{3}$$

$$\text{R.H.S.} = \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 3} = \frac{1}{3}$$

L.H.S = R.H.S

② at  $n=k$  let

$$\frac{1^2}{1 \cdot 3} + \frac{2^2}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{k^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{k(k+1)}{2(2k+1)}$$

③ ما نثبت

③ at  $n=k+1$

$$\begin{aligned} & \frac{1^2}{1 \cdot 3} + \frac{2^2}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{k^2}{(2k-1)(2k+1)} + \frac{(k+1)^2}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2(2k+3)} \end{aligned}$$

From ②

$$\text{L.H.S.} = \frac{k(k+1)}{2(2k+1)} + \frac{(k+1)^2}{(2k+1)(2k+3)}$$



$$\rightarrow L.H.S = (k+1) \left[ \frac{k(2k+3) + 2k+2}{2(2k+1)(2k+3)} \right]$$

$$= (k+1) \left[ \frac{2k^2 + 3k + 2k + 2}{2(2k+1)(2k+3)} \right] = (k+1) \left[ \frac{2k^2 + 5k + 2}{2(2k+1)(2k+3)} \right]$$

$$= (k+1) \left[ \frac{(2k+1)(k+2)}{2(2k+1)(2k+3)} \right] = \frac{(k+1)(k+2)}{2(2k+3)} = R.H.S$$

∴ بالبرهان فيكون صحيحاً لكل  $n$  طبيعي

Report (2): Prove that:

$$S_n = \frac{1^2}{1 \times 3} + \frac{2^2}{3 \times 5} + \dots + \frac{n^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n(n+1)}{2(2n+1)}$$

مجموعة المنتظر شير  
لخدمات الطلاب  
كلية الهندسة

Center share

Center share

\* Prove that Using Mathematical Induction  
 ثابت باستخدام الاستقراء الرياضي أن

$$\begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos nx & -\sin nx \\ \sin nx & \cos nx \end{pmatrix}$$

Proof:- ① at  $n=1$  L.H.S. =  $\begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}^1$

R.H.S. =  $\begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}$

L.H.S. = R.H.S.

② at  $n=k$

نفترض أن العلاقة صحيحة

$$\begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \cos kx & -\sin kx \\ \sin kx & \cos kx \end{pmatrix}$$

③ at  $n=k+1$  نريد أن نثبت أن العلاقة صحيحة

$$\begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}^{k+1} = \begin{pmatrix} \cos (k+1)x & -\sin (k+1)x \\ \sin (k+1)x & \cos (k+1)x \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{L.H.S.} &= \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}^k \cdot \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos kx & -\sin kx \\ \sin kx & \cos kx \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\downarrow$  From ②       $\downarrow$

11

$$\therefore L.H.S. = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

where :

$$A = \cos kx \cdot \cos x - \sin kx \cdot \sin x = \cos(k+1)x$$

$$B = -\cos kx \cdot \sin x - \sin kx \cdot \cos x = -\sin(k+1)x$$

$$C = \sin kx \cdot \cos x + \sin x \cdot \cos kx = \sin(k+1)x$$

$$D = -\sin kx \cdot \sin x + \cos kx \cdot \cos x = \cos(k+1)x$$

$$\therefore L.H.S. = \begin{pmatrix} \cos(k+1)x & -\sin(k+1)x \\ \sin(k+1)x & \cos(k+1)x \end{pmatrix} = R.H.S.$$

البرهان على صيغة الجمع في  $n$

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cdot \cos B \pm \sin B \cdot \cos A$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cdot \cos B \mp \sin A \cdot \sin B$$


مجموعة التمرين  
بخدمات الحاسب  
كلية الهندسة

# \* Strong Math. Induction "S.M.I.P."

ذكرنا من قبل صيغة  $P(n)$  التي نثبتها بالبرهان على  $n$  عدد طبيعي

مثال: اكتب صيغة  $C(n)$  حيث  $n$  عدد طبيعي  $n \in \mathbb{N}$   
 $N = \{1, 2, 3, \dots\}$

لإثبات صحة هذا الصيغة نقوم بنفس الخطوات السابقة



$$n=1$$

① ثبت صحة العلاقة عند

$$n=k$$

② نفرض صحة العلاقة عند

$$n=k+1$$

③ ثبت صحة العلاقة عند

أي تمام ②.

Examples For the forbinus Method, has the recurrence relation  $f_0 = f_1 = 1$  و  $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$

Use "S.M.I.P." To Prove that:

$$f_n \leq \left(\frac{7}{4}\right)^n, n \in \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

"Solution"

نطلب إثبات أن  $f_n \leq \left(\frac{7}{4}\right)^n$  حيث  $n$  عدد طبيعي

$$C_n = f_n$$

وهي تسمى "recurrence relation" لطريقة حل معادلات تفاضلية "فيما بعد"

طريقة الحل:

① at  $n=0$

$$C_0 = f_0 = 1 = \text{L.H.S}$$

$$\text{R.H.S.} = \left(\frac{7}{4}\right)^0 = 1$$

لأن العلاقة صحيحة عند  $n=0$

at  $n=1$

$$\text{L.H.S.} = f_1 = 1$$

$$\text{R.H.S.} = \left(\frac{7}{4}\right)^1$$

$$1 < \frac{7}{4}$$

عند  $n=1$



let أفرض

$$P_k \leq \left(\frac{7}{4}\right)^k$$

③ at  $n = k+1$

R.T.P.

$$P_{k+1} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^{k+1}$$

Center Share

$$P_n = P_{n-1} + P_{n-2}$$

$$n = k+1$$

$$\therefore P_{k+1} = P_k + P_{k-1}$$

ننزل الأصغر ونضع به الأكبر

$$\therefore P_{k+1} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^k + \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1}$$

$$\therefore P_{k+1} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} \cdot \left(\frac{7}{4}\right)^1 + \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1}$$

$$\therefore P_{k+1} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} \left[ \frac{7}{4} + 1 \right]$$

$$\therefore P_{k+1} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} \left( \frac{11}{4} = \frac{44}{16} \right) \rightarrow$$

عند إضافة 1 في R.H.S  
نحصل على أكبر

$$\therefore P_{k+1} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} \left( \frac{44+5}{16} \right)$$

Center Share

$$P_{k+1} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} \left( \frac{49}{16} \right) \therefore P_{k+1} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} \left(\frac{7}{4}\right)^2$$

$$\therefore P_{k+1} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^{k+1}$$

وهو المطلوب

#

مجموعة منتقى شير  
للخدمات الطلابية  
كلية الهندسة

Center Share

2. Prove that

$$n! \geq n^2 \quad \forall n \geq 4$$

لثبوت

Center Share

① at  $n=4$

$$\text{L.H.S.} = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

$$\text{R.H.S.} = (4)^2 = 16$$

$$\therefore \text{L.H.S.} > \text{R.H.S.} \quad \text{at } n=4$$

②  $n=k$

let

$$k! \geq k^2$$

$$, k \geq 4$$

③ at  $n=k+1$  R.T.P.  $(k+1)! \geq (k+1)^2$

$$\text{L.H.S.} = (k+1)! = (k+1) (k)! \quad \text{Center Share}$$

$$\text{L.H.S.} \geq (k+1) k^2$$

From ②

$$\downarrow \quad \downarrow \text{نفعنا من ②}$$

$$\therefore k^2 > (k+1) \quad \forall k \geq 4$$

$$\therefore \text{L.H.S.} \geq (k+1) (k+1)$$

$$\text{L.H.S.} \geq (k+1)^2$$

Center Share

مجموعة منتسب شمس  
مجموعات الطلاب  
تليمة منتسب

3.  $(1+x)^n \geq 1+nx$  ,  $x \geq -1$  ,  $\forall n \in \mathbb{N}$

الحل

①

at

$n=1$

L.H.S =  $1+x$

R.H.S =  $1+x$

$\therefore$  L.H.S = R.H.S

لوجوه على  $x$  في المتباينة

②

$n=k$

let

$(1+x)^k \geq 1+kx$

③ at  $n=k+1$  R.T.P.  $(1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x$

L.H.S =  $(1+x)^{k+1} = (1+x)^k (1+x)$

نضرب  $(1+x)^k$  في  $(1+x)$

$\therefore$  L.H.S  $\geq (1+kx) \cdot (1+x)$

L.H.S  $\geq 1+x+kx+kx^2$

L.H.S  $\geq 1+(k+1)x + kx^2$

Center Share

مجموعة منتشر شير  
لخدمات الطلابية  
كلية الهندسة

L.H.S  $>$  اليمين

$\therefore$  L.H.S  $\geq 1+(k+1)x$

Center Share

report. Prove that:  $3n^5 + 5n^3 + 7n$  is divisible by 15  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

\* if  $S_0 = 0, S_1 = 4, S_n = 6S_{n-1} - 5S_{n-2}$  (\*)

Using (S.M.I.P.) to Prove that:  $S_n = 5^n - 1, \forall n \geq 2$

Proof: at  $n=2$  L.H.S =  $S_2 = 6S_1 - 5S_0 = 24$  (\*)

H.S =  $5^2 - 1 = 25 - 1 = 24$

L.H.S = R.H.S  
at  $n=2$

at  $n=k$  let:  $S_k = 5^k - 1$

(S.M.I.P)  $S_k = 5^{k-1} - 1$

at  $n=k+1$  R.T.P.  $S_{k+1} = 5^{k+1} - 1$

L.H.S =  $S_{k+1} = 6S_k - 5S_{k-1}$

$= 6[5^k - 1] - 5[5^{k-1} - 1]$

$= 6 \cdot 5^k - 6 - 5^k + 5$

$= 5 \cdot 5^k - 1 = 5^{k+1} - 1$

report: Prove that using (M.I.),  $\cos(n\theta)$  is a Polynomial of degree (n) in  $X$  where  $X = \cos \theta$ . Proof

$P_n(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + a_{n-2} X^{n-2} + \dots + a_0 = 0$

لاظن ان كثير الحدود من الدرجة n في  $X$  هو  $\cos(n\theta)$



Prove that using (M.I.):

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Proof

\* at  $n=1$  L.H.S =  $1^2 = 1$

عوض الحد الأول وحده

L.H.S =  $1^2 \therefore 1^2 = 1$  في هذا المثال وقضاه الحد الأول

R.H.S =  $\frac{1(1+1)(2+1)}{6} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$

$\therefore$  L.H.S = R.H.S  $n=1$  العلاقة صحيحة عند

\* at  $n=k$ : let  $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$

نضع  $n=k$  في العلاقة  
بعضها

فرضنا ان العلاقة صحيحة في الخطوة السابقة

3\* at  $n=k+1$ : Require To Prove (R.T.P.) مطلوب، اثبات

$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$

نضع  $n=k+1$  في العلاقة  
بعضها

في الخطوة السابقة نأخذ L.H.S واحدة ونضرب على

وذلك لفصله لـ R.H.S.

$$\begin{aligned} 2(k+1)+1 &= 2k+2+1 \\ &= 2k+3 \end{aligned}$$

$\therefore$  L.H.S =  $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (k+1)^2$

تقارنا مع ما في الخطوة السابقة

$$= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (k)^2 + (k+1)^2$$

نضع قيمته في الخطوة (2)  $\therefore$  نضع قيمته

زيادة  
شئ في ما هو

$$= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = (k+1) \left[ \frac{k(2k+1)}{6} + (k+1) \right]$$

$$= (k+1) \left[ \frac{k(2k+1) + 6(k+1)}{6} \right] = (k+1) \left[ \frac{2k^2 + k + 6k + 6}{6} \right]$$

$$= (k+1) \left[ \frac{2k^2 + 7k + 6}{6} \right] = \frac{(k+1)(2k+3)(k+2)}{6} = \text{R.H.S}$$

العلاقة صحيحة لجميع قيم  $n$

مجموعة منتير شير  
لخدمات الطلابية  
كلية الهندسة

Prove that:  $\sum_{r=1}^n r \cdot (r!) = (n+1)! - 1$

الحل : خذ الأول

مع  $r=1$  ومع  $r=2$  + ... + مع  $r=n$

$$1 + 2 \cdot (2!) + 3 \cdot (3!) + \dots + (n) \cdot (n!) = (n+1)! - 1$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{L.H.S.} = 1 \cdot 1! = 1 \\ \text{R.H.S.} = (2)! - 1 = 1 \end{array} \right\} \text{العلاقة صحيحة عند } n=1$$

Center Share

let

$$1! + 2 \cdot (2!) + 3 \cdot (3!) + \dots + k \cdot (k!) = (k+1)! - 1$$

$= k+1$  R.T.P.

$$2 \cdot (2!) + 3 \cdot (3!) + \dots + (k+1) \cdot (k+1)! = (k+2)! - 1$$

$$1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + k \cdot (k!) + (k+1) \cdot (k+1)!$$

from (2)

مجموعة منتير شير  
لخدمات الطلابية  
كلية الهندسة