

*Skrivtid: 8-13. Inga hjälpmedel. Lösningarna skall åtföljas av förklarande text/figurer. Tentand som är godkänd på duggan under kursen ska ej räkna problem 1. Varje problem ger högst 5 poäng. För betyget 3 krävs minst 18p, för 4 eller 5 minst 25, resp 32p.*

1. Visa att ytorna  $z = 16 - x^2 - y^2$  och  $63z = x^2 + y^2$  skär varandra under rät vinkel.
2. Undersök om funktionen  $f(x, y) = e^{xy} + \cos(x + y)$  har ett lokalt extremvärde i origo och ange i så fall dess karaktär.
3. Låt  $f$  vara en två gånger kontinuerligt deriverbar funktion på  $\mathbb{R}$ . Antag att funktionen  $z = f(x^2 + y)$  uppfyller

$$z_{xx} - 2xz_{xy} + (x^2 + y)z = 0.$$

Bestäm funktionen  $f$ .

4. Beräkna dubbelintegralerna

a)  $\iint_D \frac{|x|}{1 + x^2 + y^2} dx dy$  där  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, y \leq x\}$ .

b)  $\iint_D (x + 2y) dx dy$  där  $D$  är kvadraten med hörn i  $(3,0)$ ,  $(6,3)$ ,  $(3,6)$  och  $(0,3)$ .

5. En rymdkurva ges av parameterekvationerna

$$x = t, \quad y = t, \quad z = \frac{2}{3}t^{3/2}.$$

Bestäm ekvationen för det plan som går genom punkten  $(1, 1, \frac{2}{3})$  på kurvan och som spänns upp av tangenten och huvudnormalen till kurvan i denna punkt (det s.k. *oskulerande planet*).

6. Beräkna volymen av det område i  $z \geq 0$  som begränsas av de båda ytorna  $z^2 = x^2 + y^2$  och  $z = 2 - x^2 - y^2$ . Ange även "tyngdpunktens" koordinater för detta område.
7. Bestäm det största resp. minsta värdet som funktionen  $f(x, y, z) = xz + 2yz$  kan anta om  $x^2 + y^2 + z^2 = 70$  och  $x + 2y + 3z = 0$ .
8. Låt  $f(x, y, z) = xy + yz + 2x^2z^2$  och  $g(x, y, z) = x^3 + yz^2$ .
  - a) Bestäm tangentplanet i  $(1, -1, 1)$  till ytan  $f(x, y, z) = 0$ .
  - b) Visa att i en omgivning till  $(1, -1, 1)$  definieras, genom ekvationerna  $f(x, y, z) = 0$  och  $g(x, y, z) = 0$ ,  $y$  och  $z$  som entydiga, kontinuerligt deriverbara funktioner av  $x$ . Bestäm även tangenten till skärningen mellan ytorna  $f = 0$  och  $g = 0$  i  $(1, -1, 1)$ .

## Lösningar till tentamen i Flervariabelanalys 2008-03-10

**Lösning till problem 1.** Skärningskurvan mellan ytorna bestäms

$$\begin{cases} z = 16 - (x^2 + y^2) \\ 63z = x^2 + y^2 \end{cases} \Rightarrow 63z = 16 - z \Rightarrow z = \frac{1}{4}, x^2 + y^2 = \frac{63}{4}.$$

Vinkeln mellan ytorna bestäms genom vinkeln mellan ytornas normaler (fås med hjälp av gradientvektorn)

$$\mathbf{N}_1 = \nabla(x^2 + y^2 + z) = (2x, 2y, 1)$$

$$\mathbf{N}_2 = \nabla(x^2 + y^2 - 63z) = (2x, 2y, -63)$$

vilket ger  $\mathbf{N}_1 \cdot \mathbf{N}_2 = 4x^2 + 4y^2 - 63 = 0$  på hela skärningskurvan. Ytorna skär således varandra under rät vinkel.

**Lösning till problem 2.** Derivering av funktionen ger

$$f_x(x, y) = ye^{xy} - \sin(x + y) \Rightarrow f_x(0, 0) = 0 \quad \text{och}$$

$$f_y(x, y) = xe^{xy} - \sin(x + y) \Rightarrow f_y(0, 0) = 0.$$

Punkten  $(0, 0)$  är således en kritisk punkt. Vi får andra derivatorna

$$f_{xx}(x, y) = y^2 e^{xy} - \cos(x + y) \Rightarrow f_{xx}(0, 0) = -1,$$

$$f_{xy}(x, y) = e^{xy} + xy e^{xy} - \cos(x + y) \Rightarrow f_{xy}(0, 0) = 0 \quad \text{och}$$

$$f_{yy}(x, y) = x^2 e^{xy} - \cos(x + y) \Rightarrow f_{yy}(0, 0) = -1.$$

Den kvadratiske formen i  $(0, 0)$  blir nu

$$Q(h, k) = f_{xx}(0, 0)h^2 + 2f_{xy}(0, 0)hk + f_{yy}(0, 0)k^2 = -h^2 - k^2$$

vilken är negativt definit, dvs  $(0, 0)$  är ett lokalt maximum.

En alternativ lösning fås genom att använda MacLaurinutvecklingar av  $e^t$  och  $\cos t$  på följande sätt:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= e^{xy} + \cos(x + y) = 1 + xy + \frac{x^2 y^2}{2!} + \dots + 1 - \frac{(x + y)^2}{2!} + \dots \\ &= 2 + xy - \frac{(x + y)^2}{2} + \dots = 2 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \dots \end{aligned}$$

där ... innehåller termer av grad högre än 2. Vi ser att derivatorna i origo är 0 (inga  $x$ - eller  $y$ -termer) och den kvadratiske formen i  $(0, 0)$  är  $-(x^2 + y^2)/2$  vilket är negativt definit.

**Lösning till problem 3.** Kedjeregeln på funktionen  $z = f(x^2 + y)$  ger

$$z_x = f'(x^2 + y) \cdot 2x, \quad z_{xx} = f''(x^2 + y) \cdot 4x^2 + f'(x^2 + y) \cdot 2, \quad z_{xy} = f''(x^2 + y) \cdot 1 \cdot 2x.$$

Detta ger insatt i den givna differentialekvationen

$$\begin{aligned} 4x^2 f''(x^2 + y) + 2f'(x^2 + y) - 2x \cdot 2x f''(x^2 + y) + (x^2 + y)f'(x^2 + y) &= 0 \Rightarrow \\ 2f'(x^2 + y) + (x^2 + y)f'(x^2 + y) &= 0 \end{aligned}$$

Om vi sätter  $t = x^2 + y$  så får vi differentialekvationen  $2f'(t) + tf(t) = 0$ . Detta är en linjär differentialekvation och lösningen fås (t.ex. med integrerande faktor) som


$$\frac{d}{dt}(e^{t^2/4} f(t)) = e^{t^2/4} (tf(t)/2 + f'(t)) = 0$$

vilket ger  $e^{t^2/4} f(t) = C$  eller  $f(t) = Ce^{-t^2/4}$  där  $C$  är en reell konstant.

**Lösning till problem 4.** Vi byter till polära koordinater

a) Integrationsområdet ses i vidstående figur. Vi får integralen

$$I = \iint_{D^*} \frac{r|\cos\theta|}{1+r^2} r dr d\theta$$




där  $D^* = \{(r, \theta) : 0 \leq r \leq 1, -3\pi/4 \leq \theta \leq \pi/4\}$ . Itererad integration ger nu

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{r^2}{1+r^2} dr \int_{-3\pi/4}^{\pi/4} |\cos\theta| d\theta \\ &= \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+r^2}\right) dr \left( \int_{-3\pi/4}^{-\pi/2} (-\cos\theta) d\theta + \int_{-\pi/2}^{\pi/4} \cos\theta d\theta \right) \\ &= \left[ r - \arctan r \right]_0^1 \left( \left[ -\sin\theta \right]_{-3\pi/4}^{-\pi/2} + \left[ \sin\theta \right]_{-\pi/2}^{\pi/4} \right) = \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + 1\right) = 2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

b) Integrationsområdet ses i figuren. Sidolinjernas ekvationer bestäms med hjälp av hörnpunkterna och syns också i figuren. Vi gör variabelbytet

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases} \quad \text{vilket ger} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{2}(u + v) \\ y = \frac{1}{2}(u - v). \end{cases}$$



Detta ger ett område  $D^* = \{(u, v) : 3 \leq u \leq 9, -3 \leq v \leq 3\}$ . Vidare blir

$$x + 2y = \frac{1}{2}(u + v) + (u - v) = \frac{3u - v}{2} \quad \text{och} \quad dx dy = \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{vmatrix} du dv = \frac{1}{2} du dv$$

Detta ger integralen

$$\begin{aligned} \iint_{D^*} \frac{3u - v}{2} \cdot \frac{1}{2} du dv &= \frac{1}{4} \iint_{D^*} 3u du dv \quad (v \text{ udda, } D^* \text{ symmetriskt i } v\text{-led}) \\ &= \frac{1}{4} \left[ \frac{3u^2}{2} \right]_3^9 \cdot \left[ v \right]_{-3}^3 = \frac{3}{8} (81 - 9)(3 + 3) = 162. \end{aligned}$$

**Lösning till problem 5.** Vi har  $\mathbf{r}(t) = (t, t, 2t^{3/2}/3)$ . Vi ser att  $\mathbf{r}(1) = (1, 1, 2/3)$ . En tangentvektor i denna punkt kan fås med  $\mathbf{r}'(1) = (1, 1, t^{1/2})|_{t=1} = (1, 1, 1)$ . Vidare ligger  $\mathbf{r}''(1) = (0, 0, t^{-1/2}/2)|_{t=1} =$

$(0, 0, 1/2)$  i det plan som genereras av tangent och huvudnormal i punkten  $\mathbf{r}(1) = (1, 1, 2/3)$ . Det sökta planets normal är således parallell med binormalen i punkten dvs, med

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}(1, -1, 0)$$

Det sökta planets ekvation fås nu som

$$(1, -1, 0) \cdot (x - 1, y - 1, z - 2/3) = (x - 1) - (y - 1) = 0 \Rightarrow x - y = 0.$$

**Lösning till problem 6.** Skärningskurvan mellan paraboloiden  $z = 2 - x^2 - y^2$  och konen  $z^2 = x^2 + y^2$  uppfyller  $z = 2 - z^2$  vilket ger  $z = 1$  (roten  $z = -2$  ligger inte i  $z \geq 0$ ). Detta ger att  $x^2 + y^2 = 1$  på skärningen. Vi kan nu skriva den sökta volymen som

$$\begin{aligned} V &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (2 - x^2 - y^2 - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \quad (\text{polära koord.}) \\ &= \iint_D (2 - r^2 - r) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (2r - r^3 - r^2) dr = 2\pi \left[ r^2 - \frac{r^4}{4} - \frac{r^3}{3} \right]_0^1 \\ &= 2\pi \left( 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) = \frac{2\pi}{12} (12 - 3 - 4) = \frac{5\pi}{6}. \end{aligned}$$

Av symmetriskäl ligger tyngdpunkten i  $(0, 0, z_T)$  där ( $K$  är det givna området)

$$z_T = \frac{1}{V} \int_K z dV$$

Om vi sätter  $z_1 = \sqrt{x^2 + y^2}$  och  $z_2 = 2 - x^2 - y^2$  (för  $x^2 + y^2 \leq 1$ ) så blir

$$\begin{aligned} \int_K z dV &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \int_{z_1}^{z_2} z dz = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left[ \frac{z^2}{2} \right]_{z_1}^{z_2} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} ((2 - x^2 - y^2)^2 - (x^2 + y^2)) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^1 r dr \int_0^{2\pi} ((2 - r^2)^2 - r^2) d\theta \\ &= \frac{2\pi}{2} \int_0^1 ((2 - r^2)^2 - r^2) r dr \left[ \begin{matrix} t = r^2 \\ dt = 2r dr \end{matrix} \right] = \frac{\pi}{2} \int_0^1 ((2 - t)^2 - t) dt = \frac{\pi}{2} \left[ -\frac{(2 - t)^3}{3} - \frac{t^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{2} \left( -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{8}{3} \right) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{-2 - 3 + 16}{6} = \frac{11\pi}{12} \end{aligned}$$

Således blir  $z_T = \frac{6}{5\pi} \cdot \frac{11\pi}{12} = \frac{11}{10}$ .

**Lösning till problem 7.** Sätt  $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  och  $h(x, y, z) = x + 2y + 3z$ . Villkoren  $g = 70$  och  $h = 0$  betyder geometriskt en sfär och en cirkel. Skärningen mellan sfären och planet är en cirkel, dvs en sluten begränsad mängd. Funktionen  $f$  är kontinuerlig och således antar  $f$  både ett största och ett minsta värde på cirkeln. För att bestämma de punkter där detta inträffar har vi villkoret  $\nabla f, \nabla g, \nabla h$  är linjärt beroende, dvs

$$\begin{vmatrix} z & 2z & x+2y \\ 2x & 2y & 2z \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z & 0 & x+2y \\ 2x & 2y-4x & 2z \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 2(y-2x)(3z-x-2y) = 0$$

Tillsammans med bivillkoren har vi ekvationssystemet

$$\begin{cases} (y-2x)(3z-x-2y) = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 70 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

Fall 1:  $y = 2x$  ger

$$\begin{cases} 5x^2 + z^2 = 70 \\ 5x + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow 5x^2 + \frac{25x^2}{9} = 70 \Rightarrow \frac{70x^2}{9} = 70 \Rightarrow x = \pm 3$$

Detta ger punkterna  $(3, 6, -5)$  och  $(-3, -6, 5)$  och  $f = -75$ .

Fall 2:  $x + 2y = 3z$  ger i den tredje ekvationen  $6z = 0$  dvs  $z = 0$ . Nu ger  $x = -2y$  i den andra ekvationen  $5y^2 = 70 \Rightarrow y = \pm\sqrt{14}$  och  $x = \mp 2\sqrt{14}$ . Här blir  $f = 0$  (eftersom  $z = 0$ ). Vi ser att största värdet är 0 och minsta värdet är  $-75$ .

**Lösning till problem 8.** a) Först konstaterar vi att  $f(1, -1, 1) = 0$ . Vi finner nu att  $\nabla f(1, -1, 1) = (y + 4xz^2, x + z, y + 4x^2z)_{(1, -1, 1)} = (3, 2, 3)$  vilket ger tangentplanets ekvation

$$(3, 2, 3) \cdot (x - 1, y + 1, z - 1) = 0 \Rightarrow 3x + 2y + 3z = 4.$$

b) Det gäller att  $f(1, -1, 1) = 0$  och  $g(1, -1, 1) = 0$ . Både  $f$  och  $g$  är också kontinuerligt deriverbara. För att samtidigt kunna lösa ut  $y = y(x)$  och  $z = z(x)$  som funktioner av  $x$  i omgivning av  $x = 1$  så att  $y(1) = -1$  och  $z(1) = 1$  räcker det enligt implicita funktionssatsen att funktionaldeterminanten  $\frac{d(f, g)}{d(y, z)} \neq 0$  i punkten  $(1, -1, 1)$ .

$$\frac{d(f, g)}{d(y, z)}(1, -1, 1) = \begin{vmatrix} f_y & f_z \\ g_y & g_z \end{vmatrix}_{(1, -1, 1)} = \begin{vmatrix} x+z & y+4x^2z \\ z^2 & 2yz \end{vmatrix}_{(1, -1, 1)} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$$

Tangentriktningen på skärningskurvan kan nu fås som kryssprodukten av ytnormalerna till de båda ytorerna, dvs

$$\mathbf{T} = \nabla f(1, -1, 1) \times \nabla g(1, -1, 1) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-7, 15, -3)$$

Ekvationen för tangenten blir  $(x, y, z) = (1, -1, 1) + t(-7, 15, -3)$ .