

BASKUNS
2013-01-19

SVAR!


A.

1. $\frac{1}{2}$

2. $\frac{x}{x-4}$

3. 15

5.



7. $x = -2, 3$

8. Radi 2

6. $x = \frac{3\pi}{8} + \frac{n\pi}{2}$

B.

q. Basfall: $n=0$ $\begin{cases} VL = \sum_{k=0}^0 3 \cdot 4^k = 3 \cdot 4^0 = 3 \cdot 1 = 3 \\ HL = 4^{0+1} - 1 = 4^1 - 1 = 4 \cdot 1 = 3 \end{cases}$ OK!

Visa: $\sum_{k=0}^{n_0} 3 \cdot 4^k = 4^{n_0+1} - 1 \Rightarrow \sum_{k=0}^{n_0+1} 3 \cdot 4^k = 4^{(n_0+1)+1} - 1.$

$$VL(B) = \sum_{k=0}^{n_0+1} 3 \cdot 4^k = \left(\sum_{k=0}^{n_0} 3 \cdot 4^k \right) + 3 \cdot 4^{n_0+1} = \left(\begin{array}{l} \text{Eftersom (A)} \\ \text{är sant!} \end{array} \right) =$$

$$= (4^{n_0+1} - 1) + 3 \cdot 4^{n_0+1} = 4^{n_0+1} + 3 \cdot 4^{n_0+1} - 1 = 4^{n_0+1} (1+3) - 1 =$$

$$= 4 \cdot 4^{n_0+1} - 1 = 4^{n_0+2} - 1 = HL(B)$$

Så om påståendet gäller för ett visst tal n_0 , så gäller det även för n_0+1 . Induktionsaxiomet ger då att formeln gäller för alla $n \in \mathbb{N}$. \square

10.

$$\frac{3x-5}{1-2x} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{3x-5}{1-2x} - 2 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{3x-5-2(1-2x)}{1-2x} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{7x-7}{1-2x} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{7(x-1)}{2(\frac{1}{2}-x)} \geq 0 \quad (1)$$

Teckenschema

Vi ser att (1) är
uppfyllt om

Svar: Olikheten gäller
om $\frac{1}{2} < x \leq 1$

x	$\frac{1}{2}$	1
x-1	- - - 0 + + +	
$\frac{1}{2}-x$	+ + 0 - - - - -	
$\frac{x-1}{\frac{1}{2}-x}$	- - * + + 0 - - -	

11.

$$\frac{i(1+i)}{1-i} = \frac{i-1}{1-i} = \frac{(-1)(1-i)}{1-i} = -1 \quad \text{så polärt:}$$

$$-1 = 1 \cdot (\cos \pi + i \sin \pi) (= e^{i\pi}).$$

Svar: $1(\cos \pi + i \sin \pi)$

12.

$$\ln(VL) = \ln(a^{b^c}) = \ln b \cdot \ln a = \ln a - \ln b = \ln(b^{-1}a) = \ln(HL)$$

så $VL = HL!$

13.

5³ ← antal val.
↑
antal
valmöjligheter

dvs. 125.

$$14. \quad 5^{2x} + 1 = 2 \cdot 5^x \Leftrightarrow (5^x)^2 + 1 = 2 \cdot 5^x.$$

$$\text{Sätt } 5^x = t: \quad t^2 + 1 = 2t \Leftrightarrow t^2 - 2t + 1 = 0 \\ \Leftrightarrow (t-1)^2 = 0, \quad \underline{t=1} \text{ (dubbelrot)}$$

$$5^x = t \text{ för } 5^x = 1 \Rightarrow \boxed{x=0}$$

C 15. $z^4 = -16$. Polär form: $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \Rightarrow$

$$\begin{cases} z^4 = r^4 (\cos 4\theta + i \sin 4\theta) & \text{(Moivre's formula)} \\ -16 = 16 (\cos \pi + i \sin \pi) \end{cases}$$

$$\text{Så vi får } \begin{cases} r^4 = 16 \\ 4\theta = \pi + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 2 \\ \theta = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \quad k=0,1,2,3 \end{cases}$$

Så lösningarna ges av

$$z_k = 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \right) \right) \quad k=0,1,2,3.$$


eller

$$z_0 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

$$z_1 = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

$$z_2 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$$

$$z_3 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$$




16. Dubbla vinkeln : $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ ges

$$2\cos^2 x - 1 = \cos x - 1 \Leftrightarrow 2\cos^2 x - \cos x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\cos x (2\cos x - 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + n\pi \\ \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + 2n\pi \end{cases}$$



Svar: $\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + n\pi \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + 2n\pi \end{cases}$

17. $(x^2 - 4x + 4) - 4 + 4(y^2 + y + 1/4) - 1 = 11$

KVADRATKOMPLETTERA!

$$(x-2)^2 + 4(y+1/2)^2 = 16 \Leftrightarrow \frac{(x-2)^2}{4^2} + \frac{(y+1/2)^2}{2^2} = 1$$

$$\begin{cases} \text{Halva svaxeln} = 4 \\ \text{Halva lillaxeln} = 2 \end{cases}$$


Omkrivna cirkeln C_1

har area $\pi \cdot 4^2 = 16\pi$

Inskrivna cirkeln C_2

har area $\pi \cdot 2^2 = 4\pi$

$$\frac{\text{Area}(C_1)}{\text{Area } C_2} = \frac{16\pi}{4\pi} = \boxed{4}$$



18.

$$x^3 - ax = 6 \quad x = -2 \text{ rot.}$$

Sätt in $x = -2$:

$$(-2)^3 - a(-2) = 6 \Leftrightarrow -8 + 2a = 6 \Leftrightarrow \underline{\underline{a = 7}}$$

Ekvationen blir:

$$x^3 - 7x - 6 = 0 \text{ och } x = -2 \text{ är}$$

en rot. Faktorsatsen ger att

 $x^3 - 7x - 6$ är delbart med $x - (-2) = x + 2$.

Al. 1. $x^3 - 7x - 6 = (x + 2)(x^2 - 2x - 3)$

$$x = 1 \pm \sqrt{1 + 3} = 1 \pm 2 = \begin{cases} 3 \\ -1 \end{cases}$$

Svar: $a = 7$,
rötter: $-2, -1, 3$

Al. 2.

$$\begin{array}{r}
 x^2 - 2x - 3 \\
 \hline
 x^3 - 7x - 6 \quad | \quad x + 2 \\
 - x^3 - 2x^2 \\
 \hline
 -2x^2 - 7x \\
 + 2x^2 + 4x \\
 \hline
 -3x - 6 \\
 3x + 6 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$