

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Asignatura:
Algebra Lineal y Numérica

Autor:
Fernando José Mateos Gómez

Ultima Modificacion: **28 de enero de 2022**

≈ ρατ ρδ ηηρδω ρρρρρρρ ρρδ ρτ ≈
≈ ρτρρρ ρρρρ ρρρρρρρρρ ≈

Indice

1. Tema 1: Sistemas de Ecuaciones Lineales, Métodos Directos	2
1.1. Sistema de Ecuaciones Lineales	2
1.1.1. Método de Eliminacion de Gauss	2
1.1.2. Discusión	2
1.2. Matrices Elementales	2
1.2.1. Propiedades	3
1.3. Método de Gauss-Jordan	3
1.3.1. Matriz Inversa	3
1.4. Método LU	3
1.4.1. Método de Cholesky	4
2. Tema 2: Interpolación	5
3. Tema 3: Polinomio de Taylor	6
4. Tema 4: Series Numéricas. Series de Potencias	7
5. Tema 5: Series de Fourier. Series Trigonómicas	8
6. Tema 6: Funciones de Varias Variables	9

1. Tema 1: Sistemas de Ecuaciones Lineales, Métodos Directos

1.1. Sistema de Ecuaciones Lineales

Considerando que un sistema de ecuaciones lineales se puede representar como $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ podemos decir entonces que esta expresión equivale a:

$$\begin{cases} ax + by + cz + \dots = k \\ \dots + \dots + \dots + \dots = \dots \\ \dots + \dots + \dots + \dots = \dots \\ \dots + \dots + \dots + \dots = \dots \end{cases}$$

Que es lo mismo que:

$$\begin{pmatrix} ax & by & cz & \dots \\ \vdots & \ddots & \dots & \dots \\ \vdots & \dots & \ddots & \dots \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}$$

1.1.1. Método de Eliminación de Gauss

Aplicando transformaciones elementales simplificamos la matriz $(A|b)$ de forma que sea triangular superior:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & | 3 \\ -1 & 1 & | 3 \\ 1 & 1 & | 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{21}(1) \ F_{31}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & | 3 \\ 0 & 3 & | 6 \\ 0 & -1 & | 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{32}(\frac{1}{3}) \ F_2(\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & 2 & | 3 \\ 0 & 1 & | 2 \\ 0 & 0 & | 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3y = 6 \\ 0 = 2 \end{cases}$$

En este caso no tiene solución.

1.1.2. Discusión

Existen 3 tipos de sistemas de ecuaciones:

- Incompatible: No tiene soluciones.
- Compatible:
 - Determinado: Tiene una sola solución.
 - Indeterminado: Tiene infinitas soluciones.

Para determinar cual es, sin resolverla, aplicamos el método de Rouché-Fröbenius:

Si el $\text{Rango}(A) \neq \text{Rango}(A|b)$ entonces es Incompatible.

Si el $\text{Rango}(A)$ es igual al número de incógnitas, es Determinado.

Si el $\text{Rango}(A)$ es menor al número de incógnitas es Indeterminado.

1.2. Matrices Elementales

Llamamos a estas a las matrices que surgen de operar con sus filas (F) o columnas C .

- $F_{ij} \Rightarrow F_i \leftrightarrow F_j$
- $F_i(\lambda) \Rightarrow F_i \leftarrow \lambda F_i$
- $F_{ij}(\lambda) \Rightarrow F_i \leftarrow F_i + F_j \lambda$

1.2.1. Propiedades

1. Mover dos filas o columnas implica en multiplicar la matriz por (-1) .
2. Multiplicar una fila o columna por un número, implica multiplicar la matriz por ese valor.
3. $F_{ij} = F_{ij}^{-1}$
4. $F_i^{-1}(\lambda) = F_i(\frac{1}{\lambda})$
5. $F_{ij}^{-1}(\lambda) = F_{ij}(-\lambda)$

1.3. Método de Gauss-Jordan

Se basa en el método de Gauss, partiendo de una matriz I , unitaria, debemos de encontrar otra tal que su producto nos devuelva la solución que buscamos.

1.3.1. Matriz Inversa

Para calcularla debemos de hacer transformaciones elementales de la matriz $A|I$ tal que A se convierta en I , haciendo transformaciones elementales para obtener una matriz triangular superior y luego diagonal. Es decir:

$$A^{-1} = FI$$

1.4. Método LU

Para poder aplicar este algoritmo, y sus derivados, debemos de cerciorarnos que A es una matriz definida positiva, cada una de sus submatrices, partiendo desde el elemento en la primera columna, primera fila, y de ahí expandiendo, es positiva.

$$Ax = b \quad A = LU$$

Considerando A como la matriz con la que partimos, las matrices L y U son matrices diagonales inferior y superior, respectivamente. Considerando esto, podemos usar el método de Gauss para obtener la matriz U y para L , aplicamos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} Ly = b \\ Ux = y_0 \end{cases}$$

Siendo x la solución del sistema. ¿Cómo hayar L ? A partir de las transformaciones elementales que hemos hecho, le hacemos la inversa, y se las aplicamos a una matriz unitaria, veamos este ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{21}(-1) \ F_{31}(1) \ F_{41}(\frac{1}{2})} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{32}(-1) \ F_{42}(\frac{1}{2})} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ahora tenemos la siguiente ecuacion:

$$F_{42}\left(\frac{1}{2}\right) F_{32}(-1) F_{41}\left(\frac{1}{2}\right) F_{31}(1) F_{21}(-1) A = U$$

$$L = (F_{42}\left(\frac{1}{2}\right) F_{32}(-1) F_{41}\left(\frac{1}{2}\right) F_{31}(1) F_{21}(-1))^{-1}$$

$$L = F_{21}(1)F_{31}(-1)F_{41}\left(\frac{-1}{2}\right)F_{32}(1)F_{42}\left(\frac{-1}{2}\right)I$$

Con todo esto, ya seríamos capaces de plantear los sistemas de ecuaciones.

1.4.1. Método de Cholesky

Es una derivación del método LU, solo se puede usar cuando la matriz es simétrica $A = A^t$, en cuyo caso $A = KK^t$

De esta forma, ahora la ecuación que tendremos que resolver es la siguiente:

$$\begin{cases} Ky = b \\ K^t x = y_0 \end{cases}$$

Para obtener K debemos de obtener L y multiplicarla por una matriz formada por los elementos de la diagonal de U , con su raíz cuadrada:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{21}(\frac{-1}{2}) F_{32}(1)} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = U$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

2. Tema 2: Interpolación

3. Tema 3: Polinomio de Taylor

4. Tema 4: Series Numéricas. Series de Potencias

5. Tema 5: Series de Fourier. Series Trigonométricas

6. Tema 6: Funciones de Varias Variables