

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Asignatura:

Matemáticas Discretas

Autor:

Fernando José Mateos Gómez

Ultima Modificacion: **12 de Febrero del 2022**

≈ ραδ ρα ηηρρρ ρρρρρρ ρρρ ρ ρ ρ
≈ ρρρρ ρρρρ ρρρρρρ ρρρρ ρ ρ

Indice

1. Tema 1: Introducción a la Teoría de Grafos	2
1.1. Nociones Básicas	2
1.1.1. Tipos de Grafos	2
1.1.2. Adyacencia	3
1.1.3. Secuencia Gráfica	3
1.1.4. Havel-Hakimi	4
1.1.5. Adyacencia en Digrafos	5
1.1.6. Grafos Especiales	5
1.2. Sugrafos	6
1.2.1. Subgrafo especial	6
1.3. Operaciones con Grafos	6
1.4. Definir un Grafo	7
1.5. Isomorfismo de Grafos	7
2. Tema 2: Conectividad en Grafos	8
3. Tema 3: Árboles	9
4. Tema 4: Planaridad	10
5. Tema 5: Transversalidad en Grafos	11
6. Tema 6: Coloración en Grafos	12


1. Tema 1: Introducción a la Teoría de Grafos

1.1. Nociones Básicas


Los *grafos* son estructuras compuestas por **vértices** y **aristas**, si el grafo es simple, tienen una propiedad respecto a las aristas, que están formadas por pares no ordenados de vértices.

Los podemos representar así:

$$\mathcal{G} = \{\mathcal{V}, \mathcal{A}\} \begin{cases} \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}, \{2, 4\}, \{2, 6\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}\} \end{cases}$$



Representación Gráfica




Grafo Plano

La figura de la derecha es su representación gráfica, de la fórmula, mientras que la figura contigua es un *grafo plano*, cuya representación gráfica no posee aristas que se crucen entre sí.


1.1.1. Tipos de Grafos

Simple: Un grafo cuyos vertices están conectados por una única arista, y no se unen a si mismos.

Multigrafo: Grafos cuyos vértices pueden poseer una o más aristas que conecten al mismo vértice:




Pseudografo: Tipo de multigrafo, que posee aristas que conectan a un vértice consigo mismo:




Digrafo o dirigido: Grafo cuyas aristas tienen un sentido, puede ser:

- Digrafo, refiriendose a un grafo simple.
- Digrafo Múltiple o multigrafo dirigido.
- Pseudo Digrafo o pseudografo dirigido.



Ponderado: Grafo cuyas aristas poseen un peso:



1.1.2. Adyacencia

Decimos que dos vértices son adyacentes cuando poseen una arista que los conecta directamente. Si miramos el grafo del principio del tema, podemos decir que, el vértice v_1 es adyacente al vértice v_5 pero no al vértice v_4 :

$$v_i, v_j \in \mathcal{V} \Leftrightarrow e = \{v_i, v_j\} \in \mathcal{A}$$

Sabiendo esto, podemos también decir que las aristas que conectan con el mismo vértice, se llaman *incidentes*. Por ejemplo $\{1, 3\}$ y $\{4, 3\}$ son incidentes sobre el vértice v_3 pero no lo serán sobre el vértice v_6 .

Con todo esto, podemos definir entonces que el **grado** o **valencia** de un vértice es el número de aristas que inciden sobre este:

$$\delta(v_k) = n$$

En función del valor de la valencia podemos catalogar al vértice como:


- Vértice Par, valencia par.
- Vértice Impar, valencia impar.
- Vértice Aislado, no tiene valencias.

Poseen ciertas características, pero estas pertenecen a los grafos simples, para esto usaremos la siguiente nomenclatura: $\mathcal{G} = \{\mathcal{V}, \mathcal{A}\}$ será el grafo y $n = |\mathcal{V}|$ será la cardinalidad del conjunto de vértices.

- Un vértice puede poseer un grado entre 0 y $n - 1$
- Un grafo \mathcal{G} no puede poseer simultáneamente un vértice de valencia 0 y otro de valencia $n - 1$
- $\sum_{v \in \mathcal{V}} \delta(v) = 2|\mathcal{A}|$ es decir, la suma de todas las valencias debe de ser el doble del número de aristas, y por tanto no puede tener un número impar de vértices con una valencia total impar.

1.1.3. Secuencia Gráfica

Llamaremos a una secuencia gráfica a la lista decreciente de las valencias de todos los vértices del grafo, por ejemplo:



$$SG = \{4, 4, 3, 3, 2\}$$

Con una secuencia gráfica, podemos ser capaces de definir si con esas valencias podemos construir un grafo, a partir del teorema de Havel-Hakimi.

1.1.4. Havel-Hakimi


Este teorema dice dada una secuencia gráfica, con el primer término mayor que cero, es equivalente a:

1. Eliminar el primer término, a_1 .
2. Restarle 1 a los a_1 primeros elementos.
3. Ordenarla decrecientemente
4. Continuar hasta que a_1 sea menor que 1.

Por ejemplo, dada la $SG = \{1, 2, 2, 3, 4\}$:

1. $SG = \{4, 3, 2, 2, 1\}$
2. $SG = \{3, 2, 2, 1\}$
3. $SG = \{2, 1, 1, 0\}$
4. $SG = \{1, 1, 0\}$
5. $SG = \{0, 0, 0\}$

Sabiendo que esta combinación es posible, podemos construir un grafo, llenando de la última a la primera operación, creando tantos vértices como valores vayan apareciendo, cada vértice tendrá un número de aristas que se determinará por el valor que hemos ido decrementando:



Si a_1 es menor que cero en algún momento, esa estructura nunca será posible. Tampoco si el número de vértices es impar y existe un número impar de valencia impar, o si a_1 es mayor que el número total de vértices.

1.1.5. Adyacencia en Digrafos


Simplemente tenemos que tener en cuenta, que en este tipo de grafos, debemos de separar las valencias de las aristas que **entran** y de las que **salen**.

1.1.6. Grafos Especiales


Grafos Triviales: No poseen aristas.

Sin ciclos: Grafos que no están cerrados, no puedes llegar a un vértice desde si mismo. Pueden ser:

Árbol:



Bosque de Árboles:



Con ciclos:


Grafo Ciclo C_n .

Grafo Completo K_n , todos los vértices tienen la máxima valencia posible.


Grafo Regular: Todos los vértices tienen el mismo número de valencia.

Grafo Bipartito: Por definición, son aquellos grafos que pueden formarse a partir de dos conjuntos de vértices, que no comparten ningún vértice en común (es decir, son grafos **disjuntos**):

$$\mathcal{G} = \{\mathcal{V}, \mathcal{A}\} \begin{cases} \mathcal{V} = \mathcal{V}_1 \cup \mathcal{V}_2, \mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2 = \emptyset \\ \forall_e \in \mathcal{A} : e = \{v_i, v_j\}, v_1 \in \mathcal{V}_1, v_2 \in \mathcal{V}_2 \end{cases}$$





Grafo Bipartito Completo $K_{n,m}$: Son grafos que cumplen la condición de ser bipartito, y además todos sus vértices tienen valencia máxima.



1.2. Sugrafos

No es más que un subconjunto de \mathcal{V} y \mathcal{A} que nos permite obtener otro nuevo grafo:

$$\mathcal{G}' \subseteq \mathcal{G} \Leftrightarrow \begin{cases} \mathcal{V}' \subseteq \mathcal{V} \\ \mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A} \end{cases}$$



Podemos obtener un subgrafo a partir de un conjunto de vértices, o aristas, u ambas (en cualquier caso, también deberemos de obtener los vértices y aristas que pertenezcan a esa arista u vertice).

1.2.1. Subgrafo especial


Un subgrafo especial es el *subgrafo recubierto*, el cual se genera cuando solo generamos un subgrafo con **todos** los vértices del grafo original, obteniendo la menor cantidad de aristas

1.3. Operaciones con Grafos


Solo podemos hacer 5 operaciones con grafos:

- **Eliminación de Aristas:** Eliminar una arista, no implica borrar sus vértices.
- **Eliminación de Vértices:** Si eliminamos un vértice, borramos cualquier arista que se conecte a este.


- **Unión de Grafos:**



- **Intersección de Grafos:**



- **Suma de Grafos** (cuando son Disjuntos): Hacemos todas las posibles combinaciones de aristas entre los vértices de los dos grafos, un producto cartesiano:



1.4. Definir un Grafo

1.5. Isomorfismo de Grafos

2. Tema 2: Conectividad en Grafos

3. Tema 3: Árboles

4. Tema 4: Planaridad

5. Tema 5: Transversalidad en Grafos

6. Tema 6: Coloración en Grafos