Gizli durumlar:

$S = \{e, v\}$

Gözlemler: $O = \{High, low\}$

Gözlem dizisi: [High, low]

Başlangıç olasılığı:

$p(e \to e) = 0.6$	$p(v \to v) = 0.8$
$p(e \to v) = 0.4$	$p(v \to e) = 0.2$

Emisyon olasılıkları:

$p(High \mid e) = 0.7$	$p(High \mid v) = 0.1$
$p(low \mid e) = 0.3$	$p(low \mid v) = 0.9$

1- İlk Gözlem (High)

$\delta 1(e) = p(e) \times p(High \mid e)$

$= 1 \cdot 0.7 = 0.7$

$\delta 1(v) = 0$

2- İkinci gözlem (low)

$e \to e$ yolu:

$0.7 \cdot 0.6 \cdot 0.3 = 0.126$

$v \to e$ yolu:

$0 \cdot 0.2 \cdot 0.3 = 0$

$\delta 2(e) = 0.126$

$e \to v$ yolu:

$0.7 \cdot 0.4 \cdot 0.9 = 0.252$

$v \to v$ yolu:

$0 \cdot 0.8 \cdot 0.9 = 0$

$\delta 2(v) = 0.252$

Sonuç karşılaştırması

$e - e = 0.126$

$e - v = 0.252$

En olası fonem dizisi:

$e \to v$