



Examen d'Analyse 1

Les Calculatrices et les Téléphones portables sont strictement interdits

Exercice 1 : (03 pts)

On considère l'ensemble $A = \left\{ x + \frac{1}{x} : x \in \mathbb{R}_+^* \right\}$

- 1) Montrer que $x + \frac{1}{x} \geq 2$ pour tout $x > 0$.
- 2) Montrer que A admet une borne inférieure, et déterminer $\inf A$.
- 3) Montrer que A n'est pas majorée.

Exercice 2 : (08.5 pts)

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ la suite récurrente définie par
$$\begin{cases} u_1 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} ; n \geq 1 \end{cases}$$

- 1/ Montrer que $u_n \leq 2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.
- 2/ Etudier la monotonie de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$.
- 3/ Etudier la nature de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$,
et déterminer sa limite dans le cas où elle est convergente.
- 4/ Montrer que $u_n = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.
(Vérifier que $\forall t \in \mathbb{R} : \cos(2t) = 2 \cos^2(t) - 1$).
- 5/ En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et de $\cos\left(\frac{\pi}{16}\right)$.

Exercice 3 : (08.5 pts)

On donne la fonction suivante :
$$f(x) = \begin{cases} 1 + x\sqrt{x} & : x \geq 0 \\ 1 + \ln(1 + x^2) & : x < 0 \end{cases}$$

- 1) Déterminer son domaine de définition D_f .
- 2) Montrer que f est continue sur D_f .
- 3) Montrer que f est dérivable sur D_f , et f' est continue.
La fonction f est-elle de classe C^1 sur \mathbb{R} ? Justifier.
- 4) Peut-On appliquer à f le Théorème des accroissements finis dans l'intervalle $[-1, 1]$?
Si oui, trouver tous les réels c tels que $f(1) - f(-1) = 2f'(c)$.
(On rappelle que : $e \simeq 2.72$ et $\ln 2 \simeq 0.69$.)

Bon courage

A. Ghanem

Corrigé d'examen d'Analyse 1 : 1^{er} MI 2021/2022

Exercice 1 (03pts)

1) Soit $x > 0$, alors $x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2+1+2x}{x} = \frac{(x+1)^2}{x} \geq 0$ car $x > 0$
donc $\forall x > 0, x + \frac{1}{x} \geq 2$(01pts)

autre Méthode : $\forall x > 0, \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 \geq 0$, d'où $x + \frac{1}{x} - 2 \geq 0$.

2) On a $2=1+\frac{1}{1}$ et $1 \in \mathbb{R}_+$, d'où $2 \in A$, alors $A \neq \emptyset$. Et d'après la première question A est minorée par 2, donc A admet une borne inférieure(0.5pts)

$\inf A$: Comme 2 est un minorant de A et $2 \in A$, alors $\inf A = 2$(0.5pts)

3) Par l'absurde, supposons que A est majorée, alors :

$\exists M > 0 : \forall a \in A, a \leq M$.

D'où $\exists M > 0, \forall x > 0 : x + \frac{1}{x} \leq M$, en particulier pour $x = M$, on a : $M + \frac{1}{M} \leq M$

d'où $\frac{1}{M} < 0$ ou encore $1 < 0$ ce qui est absurde.....(01pts)

Exercice 2 (8.5pts)

On a $\begin{cases} u_1 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} \end{cases} ; n \geq 1$. 1/ Montrons que $u_n \leq 2$ (par récurrence)

Pour $n=1 : u_1 = \sqrt{2} \leq 2$ est vraie.....(0.5pts)

Supposons que $u_n \leq 2$ et on montre que $u_{n+1} \leq 2$?

On a $u_n \leq 2 \Rightarrow u_n + 2 \leq 4 \Rightarrow \sqrt{u_n + 2} \leq \sqrt{4} \Rightarrow u_{n+1} \leq 2$(01pts)

2/ La monotonie: $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} = f(u_n)$ où $f(x) = \sqrt{x + 2}$: On a

$\forall x > -2 : f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} > 0$

donc f est croissante. D'où (u_n) est croissante.....(01.5pts)

3/ D'après 1/ : $u_n \leq 2$ donc la suite (u_n) est majorée

et (u_n) croissante alors elle est convergente.....(01pts)

La limite : (u_n) convergente alors il existe $l \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$.

Comme $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} = f(u_n)$ alors $f(l) = l \Leftrightarrow \sqrt{l + 2} = l$

$l^2 - l - 2 = 0 \Rightarrow l = 2$ ou $l = -1$. $u_1 = \sqrt{2}$ et $u_n \geq 0$ alors

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l = 2$(01.5pts)

4/ Soit $\forall t \in \mathbb{R} : \cos(2t) = \cos^2(t) - \sin^2(t) = \cos^2(t) - (1 - \cos^2(t)) = 2\cos^2(t) - 1$.

.....(0.5pts)

Montrons que $u_n = 2 \cos(\frac{\pi}{2^{n+1}})$? $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Par récurrence pour $n = 1, 2 \cos(\frac{\pi}{2^{1+1}}) = 2 \cos(\frac{\pi}{4}) = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} = u_1$

.....(0.5pts)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, supposons que $u_n = 2 \cos(\frac{\pi}{2^{n+1}})$ et montrons $u_{n+1} = 2 \cos(\frac{\pi}{2^{n+2}})$?

$u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} = \sqrt{2 \cos(\frac{\pi}{2^{n+1}}) + 2} = \sqrt{2(\cos(\frac{\pi}{2^{n+1}}) + 1)} = \sqrt{2 \cdot \cos^2(\frac{1}{2} \frac{\pi}{2^{n+1}})}$

$= \sqrt{2} \cdot |\cos(\frac{\pi}{2^{n+2}})| = \sqrt{2} \cdot \cos(\frac{\pi}{2^{n+2}})$. (car $0 < \frac{\pi}{2^{n+2}} < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos(\frac{\pi}{2^{n+2}}) \geq 0$)

$\sqrt{2} \cdot \cos(\frac{\pi}{2^{(n+1)+1}}) = u_{n+1}$(01pts)

3/ $\cos(\frac{\pi}{8}) = \cos(\frac{\pi}{2^{2+1}}) = \frac{1}{2} u_2$ (d'après la question précédente)

$= \frac{1}{2} \sqrt{u_1 + 2} = \frac{1}{2} \sqrt{\sqrt{2} + 2}$(0.5pts)

$\cos(\frac{\pi}{16}) = \cos(\frac{\pi}{2^{3+1}}) = \frac{1}{2} u_3 = \frac{1}{2} \sqrt{u_2 + 2} = \frac{1}{2} \sqrt{\sqrt{\sqrt{2} + 2} + 2}$(0.5pts)

Exercice 3 (8.5pts)

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x\sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \\ 1 + \ln(1+x^2) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

1) Le domaine de définition : l'expression $1 + x\sqrt{x}$ est bien définie si $x \geq 0$.

Pour $x < 0$ on a $x^2 > 0$ et $x^2 + 1 > 1$ et donc le logarithme est bien définie. Ainsi

$D_f = \mathbb{R}$(01pts)

2) Continuité : * Sur $\mathbb{R} - \{0\}$, f est continue car définie à partir de fonctions continue $x \rightarrow x$, $x \rightarrow \sqrt{x}$, $x \rightarrow \ln(1+x^2)$(0.5pts)

* Reste la continuité en "0": On a $f(0) = 1 + 0\sqrt{0} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 + \ln(1+x^2) = 1 = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 + x\sqrt{x} = 1 = f(0)$$

Donc f est continue sur \mathbb{R}(01pts)

3) Dérivabilité : * Pour des raisons analogues à ceux de la continuité, f est dérivable sur $\mathbb{R} - \{0\}$(0.5pts)

$$\text{* Dérivabilité en "0": } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} = 0 = f'_g(0). \text{ (car}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1).$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0 = f'_d(0).$$

Comme $f'_g(0) = f'_d(0)$, alors f est dérivable sur \mathbb{R}(01pts)

$$\begin{cases} \frac{3}{2}\sqrt{x}, & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{2x}{1+x^2} & \text{si } x < 0 \end{cases} \text{.....(01pts)}$$

* f' est manifestement continue sur $\mathbb{R} - \{0\}$.

$$\text{*} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1+x^2} = 0 = f'(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{2}\sqrt{x} = 0 = f'(0). \text{ Donc } f' \text{ est continue en } 0.$$

D'où f' continue sur \mathbb{R}(01pts)

La fonction f est de classe C^1 sur \mathbb{R} , car les fonctions f et f' sont définies et continues sur \mathbb{R}(0.5pts)

4) **Oui** on peut appliquer à f' le Théorème des accroissements finis, car f' est continue sur $[-1, 1]$ (continue sur \mathbb{R}), et dérivable sur $[-1, 1]$ (dérivable sur \mathbb{R}). Ainsi $\exists c \in]-1, 1[$ tel que

$$f(1) - f(-1) = 2f'(c) \Rightarrow 2 - (1 + \ln 2) = 2f'(c) \Rightarrow f'(c) = \frac{1}{2}(1 - \ln 2) \text{.....(01pts)}$$

Remarquons que $1 - \ln 2 \simeq 1 - 0.69 \simeq 0.31 > 0$, donc il faut chercher c parmi les " x " tels que $f'(x) > 0$. Or pour $x < 0$, $f'(x) < 0$.

$$\text{Donc } f'(c) = \frac{1}{2}(1 - \ln 2) \Rightarrow \frac{3}{2}\sqrt{c} = \frac{1}{2}(1 - \ln 2) \Rightarrow \sqrt{c} = \frac{1}{3}(1 - \ln 2)$$

$$\text{et } c = \left(\frac{1}{3}(1 - \ln 2)\right)^2 \text{.....(01pts)}$$

▲▲▲▲▲▲▲▲