



UNIVERSIDAD LINDA VISTA

EX-FINCA STA CRUZ #1 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS

INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

CALCULO DIFERENCIAL

NOMBRE DEL ALUMNO: JOSÉ MOISÉS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

DOCENTE: ING. ISAAC PEREZ MORENO

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:

EJERCICIOS DE LABORATORIO

FECHA DE ENTREGA:

31/03/25

Contenido

Introducción.....	3
Definición.....	3
Ejercicios	4
Manual, ejercicios 5.4	4
Larsson (2015), pág. 136	13
Conclusión	18
Referencias	19
Anexo	20

Introducción

En el siguiente laboratorio se estudiará el concepto de derivadas, siguiendo reglas que nos facilitan la resolución de estas. Se hará por medio de ejercicios manuales y su comprobación con la herramienta de Scilab, un software matemático.

El objetivo es identificar la forma indicada para resolver los planteamientos y ejercitar las habilidades por medio de la práctica.

Definición

La derivada de f en x está dada por

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Siempre que exista ese límite. Para todos los x para los que exista este límite, f' es una función de x (Larson & Edwards, 2015).

Ejemplo:

$$f(x) = 3x^4 + 2x - 5$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} 3x^4 + \frac{d}{dx} 2x - \frac{d}{dx} 5$$

$$f'(x) = 3 \cdot 4x^{4-1} + 2 - 0$$

$$f'(x) = 12x^3 + 2$$

Ejercicios

Manual, ejercicios 5.4

$$a) y = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}; x = 64 \quad f'(x) = \frac{dy}{dx}(u) + \frac{dy}{dx}(v)$$

$$\frac{dy}{dx}(\sqrt[3]{x}) = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} \quad \frac{dy}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{1}{3} \sqrt[3]{64^2} \right) + \left(\frac{1}{2} \sqrt{64} \right) \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{3(16)} + \frac{1}{2(8)} = \frac{1}{48} + \frac{1}{16}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{64}{768} = \frac{1}{12}$$

--> deff('y=f(x)', 'y=(x^(1/3))+x^(1/2)')

--> dy=numderivative(f,64)

dy =

0.0833333

$$b) y = \frac{\sqrt{16+3x}}{x}; x = 3 \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \cdot \frac{du}{dx} - u \cdot \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$u = \sqrt{16+3x} \quad \frac{du}{dx} (16+3x)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2} (16+3x)^{-\frac{1}{2}} (3) \right) \quad \frac{dv}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \left[\frac{1}{2} (16+3x)^{-\frac{1}{2}} (3) \right] - \sqrt{16+3x}}{x^2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x \left[\frac{3}{2} \sqrt{16+3x} \right] - \sqrt{16+3x}}{x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{3x}{2\sqrt{16+3x}} - \frac{\sqrt{16+3x}}{1}}{x^2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{3x - 2(16+3x)}{2\sqrt{16+3x}}}{x^2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{3x - 2(16+3x)}{(x^2)2\sqrt{16+3x}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x - (32+6x)}{(x^2)2\sqrt{16+3x}} = \frac{4-50}{9(2\sqrt{25})} = -\frac{46}{90}$$

--> deff('y=f(x)', 'y=(sqrt(16+3*x))./(x)')

--> dy=numderivative(f,3)

dy = -0.4555556

$$c) y = \frac{x^2 + 2}{2 - x^2}; \quad x = 2 \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{u \cdot \frac{du}{dx} - v \cdot \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$u = x^2 + 2 \quad \frac{du}{dx} (x^2 + 2) = 2x \quad \frac{dv}{dx} (2 - x^2) = -2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2 - x^2 (2x) - (x^2 + 2)(-2x)}{(2 - x^2)^2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{(4x - 2x^3) - (-2x^3 - 4x)}{(2 - x^2)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4x - 2x^3 + 2x^3 + 4x}{(2 - x^2)^2} = \frac{4x + 4x}{(2 - x^2)^2} = \frac{dy}{dx} = \frac{8(2)}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

```
--> deff('y=f(x)', 'y=((x.^2)+2)./(2-(x.^2))')
```

```
--> dy=numderivative(f,2)
```

```
dy = 4.0000000
```

$$d) y = \frac{\sqrt{5-2x}}{2x+1}; \quad x = \frac{1}{2} \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{u \cdot \frac{du}{dx} - v \cdot \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$u = \sqrt{5-2x} \quad \frac{du}{dx} (u) = \frac{1}{2} \sqrt{5-2x} (-2) = \frac{1}{\sqrt{5-2x}} (-2) \quad \frac{dv}{dx} (v) = 2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x+1 \left[-\frac{2}{\sqrt{5-2x}} \right] - \frac{2\sqrt{5-2x}}{1}}{(2x+1)^2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-2x-1-(2\sqrt{5-2x})}{(2x+1)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x-11}{(2x+1)^2 \sqrt{5-2x}} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1-11}{4 \sqrt{4}} = -\frac{10}{8} = -1.25$$

```
--> deff('y=f(x)', 'y=(sqrt(5-2*x))./(2*x+1)')
```

```
--> dy=numderivative(f,(1./2))
```

```
dy = -1.2500000
```

$$c) y = x \sqrt{3+2x}; x=3 \quad \frac{d}{dx} = uv = uv' + vu'$$

$$u = \frac{x}{\sqrt{3+2x}} \quad \frac{d}{dx}(u) = x = \underline{1} \quad \frac{d}{dx}(v) = 3+2x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (3+2x)^{-\frac{1}{2}} (2)$$

$$\frac{dy}{dx} = x \left((3+2x)^{-\frac{1}{2}} \right) + \sqrt{3+2x} = \frac{x}{\sqrt{3+2x}} + \frac{\sqrt{3+2x}}{1} = \frac{x + (3+2x)}{\sqrt{3+2x}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3 + 3(3)}{\sqrt{3+2(3)}} = \frac{12}{3} = \underline{4}$$

```
--> deff('y=f(x)', 'y=(x*sqrt(3+2*x))')
```

```
--> dy=numderivative(f,3)
```

```
dy = 4.0000000
```

$$f) x = \sqrt{\frac{4x+1}{5x-1}}; x=2 \quad u = (4x+1)^{\frac{1}{2}} \\ v = (5x-1)^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5x-1(4) - 4x+1(5)}{(5x-1)^2} = \frac{dy}{dx} = \frac{(20x-4)-(20x+5)}{(5x-1)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cancel{20x}-4-\cancel{20x}-5}{(5x-1)^2} = \frac{-9}{(5x-1)^2} \cdot \left[\frac{1}{2} \left(\frac{4x+1}{5x-1} \right)^{\frac{1}{2}} \right]$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-9}{2(5x-1)^2 \sqrt{\frac{4x+1}{5x-1}}} = \frac{-9}{2(81)\sqrt{\frac{9}{8}}} = \frac{-9}{162} = -\frac{1}{18} = -0,0555556 //$$

```
--> deff('y=f(x)', 'y=(sqrt((4*x+1)/(5*x-1))))1
```

```
--> dy=numderivative(f,2)
```

```
dy = -0.0555556
```

$$g) y = \sqrt{\frac{x^2-5}{10-x^2}} ; x=3 \quad \frac{d}{dx} \frac{u}{v} = \frac{v \cdot u' - u v'}{v^2}$$

$$u = (x^2-5)^{\frac{1}{2}} \quad \frac{d}{dx} (x^2-5) = 2x \quad \frac{d}{dx} (10-x^2) = -2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{10-x^2(2x) - (x^2-5)(-2x)}{(10-x^2)^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{(20x-2x^3) - (-2x^3+10x)}{(10-x^2)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{20x-2x^3+2x^3-10x}{(10-x^2)^2} = \frac{10x}{(10-x^2)^2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{x^2-5}{10-x^2} \right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{10x}{2(10-x^2)^2 \sqrt{\frac{x^2-5}{10-x^2}}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{30}{2(1)\sqrt{4}} = \frac{30}{4} = 7.5$$

```
deff('y=f(x)', 'y=(sqrt((x.^2-5)./(10-x.^2)))')
```

```
--> dy=numderivative(f,3)
```

```
dy = 7.5000001
```

$$h) y = \ln(x^2+2) ; x=2 \quad \frac{d}{dx} (\ln u) = \frac{u'}{u}$$

$$\frac{d}{dx} (x^2+2) = 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{x^2+2} = \frac{2(2)}{2^2+2} = \frac{4}{6} = 0.6666667$$

```
--> deff('y=f(x)', 'y=(log(x.^2+2))')
```

```
--> dy=numderivative(f,2)
```

```
dy = 0.6666667
```

$$i) y = x e^{-2x}; x = \frac{1}{2} \quad \frac{d}{dx} uv = u'v + uv'$$

$$u = x \quad v = e^{-2x} \quad \frac{du}{dx} = 1 \quad \frac{dv}{dx} = e^{-2x} \cdot (-2) = -2e^{-2x}$$

$$\frac{dy}{dx} = 1(e^{-2x}) + x(-2e^{-2x}) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 1(e^{-2x}) + \frac{1}{2}(-2e^{-2x})$$

$$\frac{dy}{dx} = (e^{-1}) - e^{-1} = 0$$

```
--> deff('y=f(x)', 'y=x*exp(-2*x)')
```

```
--> dy=numderivative(f,0.5)
```

```
dy = 4.584D-12
```

$$j) y = \frac{\ln x^2}{x}; x = 4 \quad \frac{d}{dx} \frac{u}{v} = \frac{v \cdot u' - u \cdot v'}{v^2}$$

$$u = \ln x^2 \quad v = x \quad \frac{du}{dx} = \frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x} \quad \frac{dv}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \left(\frac{2}{x} \right) - \ln x^2 (1)}{x^2} = \frac{\frac{2x}{x} - 2 \ln x (1)}{x^2} = \frac{2 - 2 \ln(4)}{16}$$

$$\frac{dy}{dx} = -0.048286$$

```
--> deff('y=f(x)', 'y=(log(x^2))./(x)')
```

```
--> dy = numderivative(f, 4)
```

```
dy = -0.0482868
```


$$k) y = x \sin \frac{x}{2}; x=2 \quad \frac{d}{dx} uv = u'v + u.v'$$

$$u = x \quad \frac{du}{dx}(x) = 1 \quad \frac{dv}{dx}(\sin \frac{x}{2}) = \cos \frac{x}{2} \frac{d}{dx} \frac{x}{2} = \cos \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}$$

$$\frac{dy}{dx} = x \left(\frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} \right) + \sin \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} \right) + \sin \frac{x}{2} =$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2} \cos \frac{2}{2} + \sin \frac{2}{2} = \cos(1) + \sin(1) = \underline{1.381773}$$

--> deff('y = f(x)', 'y = x .* sin(x / 2)')

--> dy = numderivative(f, 2)

dy = 1.3817733

$$l) y = \ln \cos x; x = 0.5$$

$$\frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x \frac{d}{dx} x = -\sin x \cdot 1 = -\sin x$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x = -\tan(0.5) = \underline{-0.54630}$$

--> deff('y = f(x)', 'y = log(cos(x))')

--> dy = numderivative(f, 0.5)

dy = -0.5463025

$$m) y = \text{Sen } x \cos 2x; \quad x = 1 \quad \frac{d}{dx} uv = u \cdot v' + u' v$$

$$U = \text{Sen } x \quad \frac{dU}{dx} (\text{Sen } x) = \cos x \quad \frac{d}{dx} x = \underline{\cos x} //$$

$$V = \cos 2x \quad \frac{dV}{dx} (\cos 2x) = -\text{Sen } 2x \quad \frac{d}{dx} 2x = -2 \text{Sen } 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos 2x (\cos x) + \text{Sen } x (-2 \text{Sen } 2x)$$

$$\frac{dy}{dx} = -0.2248 - 1.5302 = \underline{-1.7551} //$$

--> deff('y = f(x)', 'y=(sin(x)).*(cos(2*x))')

--> dy = numderivative(f,1)

dy = -1.7551399

$$n) y = 5 e^{\frac{x}{2}} \text{Sen } \frac{\pi x}{2}; \quad x = 2$$

$$U = 5 e^{\frac{x}{2}} \quad \frac{dU}{dx} (5 e^{\frac{x}{2}}) = 5 \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} = \frac{5}{2} e^{\frac{x}{2}} //$$

$$V = \text{Sen } \frac{\pi x}{2} \quad \frac{dV}{dx} (\text{Sen } \frac{\pi x}{2}) = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2} //$$

$$\frac{dy}{dx} = \text{Sen } \frac{\pi x}{2} \left(\frac{5}{2} e^{\frac{x}{2}} \right) + 5 e^{\frac{x}{2}} \left(\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2} \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5}{2} e^{\frac{x}{2}} \text{Sen } \frac{\pi x}{2} + \frac{5\pi}{2} e^{\frac{x}{2}} \cos \frac{\pi x}{2}$$

$$= \frac{5\pi}{2} e(-1) + \frac{5}{2} e(0) = \underline{-21.3493} //$$

--> deff('y = f(x)', 'y = 5*exp(x./2)*sin(%pi*x./2)')

--> dy = numderivative(f,2)

dy = -21.349336

$$o) y = \ln \sqrt{\tan x} ; x = \frac{1}{4} \pi \quad \frac{d}{dx} \ln v = \frac{v'}{v}$$

$$y = \frac{1}{2} \ln(\tan x) \quad \frac{d}{dv} \ln(\tan x) = \frac{1}{\tan x} \cdot \sec^2 x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{\tan x} \cdot \sec^2 x \right) \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sec^2 x}{\tan x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{\sin x}{\cos x}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sin x \cos x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\cos x}{\cos^2 x \sin x} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos x \sin x} = \frac{1}{2(\cos x \sin x)} = \frac{1}{2(\cos(\frac{\pi}{4}) \sin(\frac{\pi}{4}))}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2(0.5)} = \frac{1}{1} = 1 //$$

--> deff('y = f(x)', 'y = log(sqrt(tan(x)))')

--> dy = numderivative(f,%pi./4)

dy = 1.0000000

$$p) y = x \ln \sqrt{x+3} \quad x=6 \rightarrow y = \frac{x}{2} \ln(x+3) \quad \frac{d}{dx} uv = v u' + u v'$$

$$u = x/2 \quad \frac{du}{dx} = \frac{1}{2} \quad v = \ln(x+3) \quad \frac{dv}{dx} = \frac{1}{x+3}$$

$$\frac{dy}{dx} = \ln(x+3) \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{x}{2} \left(\frac{1}{x+3} \right) \rightarrow \frac{dy}{dx} = \ln(9) \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

$$\frac{dy}{dx} = \left(2 \ln 3 \cdot \frac{1}{2} = \ln 3 \right) + \frac{1}{3} = 1.0986 + 0.3333 = 1.4319 //$$

--> deff('y=f(x)', 'y=x*(log(sqrt(x+3)))')

--> dy = numderivative(f,6)

dy = 1.4319456

$$q) y = x \arcsin x ; x = \frac{1}{2} \quad \frac{d}{dx} uv = u'v + uv'$$

$$u = x \quad \frac{du}{dx} = 1 \quad \frac{dv}{dx} (\arcsin(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = (\arcsin(x)) (1) + x \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) = \frac{dy}{dx} = \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = 0.52359 + \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 0.52359 + 0.57735 = 1.10094$$

--> deff('y=f(x)', 'y=x*asin(x)')

--> dy = numderivative(f,0.5)

dy = 1.1009490

$$\frac{d}{dx} uv = u'v + u'v$$

$$r) y = \frac{1}{x} \arctg x ; x = 1$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{x(0) - (1) \cdot 1}{(x)^2} = -\frac{1}{x^2} \quad \frac{dv}{dx} (\arctg x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{1+x^2} \right) + \left(-\frac{1}{x^2} \right) \arctg x = \frac{1}{2(1+x^2)} - \frac{\arctg x}{x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = 0.5 - 0.78539 = -0.28539$$

--> deff('y=f(x)', 'y=(1./x)*atan(x)')

--> dy = numderivative(f,1)

dy = -0.2853982

$$5) y = x^2 \operatorname{arccsc} \sqrt{x}; \quad x=2 \quad \frac{d}{dx} (x^2) = 2x \quad \frac{dy}{dx} (\operatorname{arccsc} \sqrt{x}) = \frac{1}{(\sqrt{x})\sqrt{x-1}}$$

$$\frac{dy}{dx} = (x^2) \left(-\frac{1}{2x\sqrt{x-1}} \right) + \operatorname{arccsc} \sqrt{x} (2x) = \frac{1}{(\sqrt{x})\sqrt{x-1}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4}{4} + 4 \operatorname{arccsc} \sqrt{2} = 4 (\operatorname{arcsin}^{-1}(1/\sqrt{2})) - 1 = 3.141592 - 1$$

$$\frac{dy}{dx} = 2.141592$$

--> deff('y=f(x)', 'y=x.^2*acsc(sqrt(x))')

--> dy = numderivative(f,2)

dy = 2.1415927

Larsson (2015), pág. 136

$$9) g(x) = 3(4-9x)^4 \quad \frac{d}{dx} uv = uv' + vu'$$

$$\frac{du}{dx} = (3) = 3 \quad \frac{dv}{dx} = (4-9x)^4 = 4(4-9x)^3 \cdot (-9)$$

$$\frac{dy}{dx} = 3 \left[-36(4-9x)^3 \right] + (4-9x)^4 (0) = \frac{dy}{dx} = \left[-36(4-9x)^3 \right] + 0 =$$

$$\frac{dy}{dx} = -108(4-9x)^3$$

$$12) g(x) = \sqrt{4-3x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} (4-3x^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (4-3x^2)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{4-3x^2}} \cdot (-6x) = -\frac{6x}{2\sqrt{4-3x^2}} = -\frac{3x}{\sqrt{4-3x^2}}$$

$$15) y = 2 \sqrt[3]{9-x^2} \quad \begin{matrix} U=2 \\ V=\sqrt[3]{9-x^2} \end{matrix}$$

$$\frac{dv}{dx}(2) = 0 \quad \frac{dv}{dx}(9-x^2)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3}(9-x^2)^{-\frac{2}{3}} \cdot (-2x)$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \left[\frac{1}{3}(9-x^2)^{-\frac{2}{3}}(-2x) \right] = 2 \left[-\frac{2x}{3}(9-x^2)^{-\frac{2}{3}} \right]$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4x}{3(9-x^2)^{\frac{2}{3}}} = -\frac{x}{(9-x^2)^{\frac{2}{3}}}$$

$$17) y = \frac{1}{x-2} \quad \begin{matrix} U=1 \\ V=x-2 \end{matrix} \quad \frac{d'}{dx} = -\frac{C}{x^2} \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{(x-2)^2} \cdot \frac{1}{1} = -\frac{1}{(x-2)^2}$$

$$22) y(t) = \frac{1}{\sqrt{t^2-2}} \Rightarrow g(t) = (t^2-2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}(t^2-2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2t = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2(t^2-2)^{\frac{3}{2}}} \cdot 2x = \frac{2t}{2(t^2-2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t}{(t^2-2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$23) f(x) = x^2(x-2)^4 \quad \begin{matrix} U=x^2 \\ V=(x-2)^4 \end{matrix}$$

$$\frac{dv}{dx}(x^2) = 2x \quad \frac{dv}{dx}(x-2)^4 = 4(x-2)^3 \cdot 1$$

$$\frac{dy}{dx} = (2x)(x-2)^4 + x^2(4(x-2)^3)$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x(x-2)(x-2)^3 + 4x^2(x-2)^3$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x(x-2)^3 [x-2 + 2x] = \frac{dy}{dx} = 2x(x-2)^3(3x-2)$$

$$24) f(x) = x(2x-5)^3 \quad \frac{d}{dx} uv = v u' + u v'$$

$$\frac{dv}{dx} f(x) = \underline{1} \quad \frac{dv}{dx} (2x-5)^3 = \underline{3(2x-5)^2 \cdot (2)}$$

$$\frac{dy}{dx} = (2x-5)^3 (1) + x(6(2x-5)^2) \quad \frac{dy}{dx} = (2x-5)^2 [2x-5 + 6x]$$

$$\frac{dy}{dx} = \underline{(2x-5)^2 (8x-5)}$$

$$26) y = \frac{1}{2} x^2 \sqrt{16-x^2}$$

$$\frac{dv}{dx} f(x^2) = \underline{2x} \quad \frac{dv}{dx} (16-x^2)^{\frac{1}{2}} = \underline{\frac{1}{2\sqrt{16-x^2}} \cdot (-2x)} = -\frac{2x}{2\sqrt{16-x^2}} = -\frac{x}{\sqrt{16-x^2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = x^2 \left(\frac{2x}{2\sqrt{16-x^2}} \right) + \sqrt{16-x^2} (2x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x\sqrt{16-x^2}}{1} - \frac{x^3}{\sqrt{16-x^2}} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{-2x(16-x^2) + x^3}{\sqrt{16-x^2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{32x-3x^3}{\sqrt{16-x^2}} \cdot \frac{1}{2} \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2-32}{2\sqrt{16-x^2}}$$

$$29) g(x) = \left(\frac{x+5}{x^2+2} \right)^2 \quad \begin{array}{l} u = x+5 = 1 \\ v = x^2+2 = 2x \end{array}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2+2)(1) - (x+5)(2x)}{(x^2+2)^2} = \frac{-x^2+10x+2}{(x^2+2)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \left(\frac{x+5}{x^2+2} \right) - \frac{x^2+10x+2}{(x^2+2)^2} = -\frac{2(x+5)(-x^2-10x+2)}{(x^2+2)^3}$$

$$32) g(x) = \left(\frac{3x^2 - 2}{2x + 3} \right)^3$$

$$\frac{dy}{dx} = 3 \left(\frac{3x^2 - 2}{2x + 3} \right)^2 \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{3x^2 - 2}{2x + 3} \right)$$

$$\frac{d}{dx} = \frac{(2x+3)(6x) - (3x^2-2)(2)}{(2x+3)^2} = \frac{12x^2 + 18x - 6x^2 + 4}{(2x+3)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = 3 \left(\frac{3x^2 - 2}{2x + 3} \right)^2 \cdot \frac{6x^2 + 18x + 4}{(2x+3)^2} = \frac{3(3x^2-2)^2(6x^2+18x+4)}{(2x+3)^4}$$

$$45) g(x) = 5 \tan 3x$$

$$\frac{dy}{dx} (5 \tan 3x) = 5 \frac{d}{dx} (\tan 3x) = 5 (\sec^2 3x) (3) = \underline{15 \sec^2 3x}$$

$$48) y = \cos (1-2x)^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 2(1-2x) \cdot -2 = -4(1-2x) \quad \frac{du}{dx} \cos = -\sin x$$

$$\frac{dy}{dx} = -\sin (1-2x)^2 \cdot -4(1-2x) = \underline{4 \sin (1-2x)^2 \cdot (1-2x)}$$

$$51) f(x) = \frac{\cot x}{\sin x}$$

$$\frac{du}{dx} \cot x = -\csc^2 x \cdot 1 = -\csc^2 x \quad \frac{dv}{dx} (\sin x) = \cos x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(-\csc^2 x)(\sin x) - \cot x (\cos x)}{\sin^2 x} = \frac{-\frac{1}{\sin^2 x} \sin x - \frac{\cos^2 x}{\sin x}}{\sin^2 x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\frac{1}{\sin x} - \frac{\cos^2 x}{\sin x}}{\sin^2 x}$$

$$60) y = 3x - 5 \cos(\pi x)^2$$

$$\frac{dy}{dx} 3x = 3 \quad \frac{dy}{dx} \cos^2 = 2 \cos(\pi x) \cdot (-\sin(\pi x)) \cdot \pi = -2\pi \cos(\pi x) \sin(\pi x)$$

$$= +10\pi \cos(\pi x) \sin(\pi x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \underline{3 + 10\pi \cos(\pi x) \sin(\pi x)}$$

$$64) y = \cos \sqrt{\sin(\tan \pi x)}$$

$$\frac{dy}{dx} = (-\sin \sqrt{\sin(\tan \pi x)}) \cdot \frac{d}{dx} (\sin(\tan \pi x))^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} (\sin(\tan(\pi x)))^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{d}{dx} (\sin(\tan(\pi x)))$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} (-\sin(\tan(\pi x)))^{-\frac{1}{2}} \left(\cos(\tan \pi x) \cdot \frac{d}{dx} (\tan(\pi x)) \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} (-\sin(\tan(\pi x)))^{-\frac{1}{2}} \left[\cos(\tan(\pi x)) \cdot \sec^2(\pi x) \cdot \frac{d}{dx} (\pi x) \right]$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} (-\sin(\tan(\pi x)))^{-\frac{1}{2}} \left[\cos(\tan(\pi x)) \cdot \sec^2(\pi x) \cdot \pi \right]$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}} \cdot (\cos(\tan(\pi x)) \cdot \sec^2(\pi x) \cdot \pi)$$

$$\frac{dy}{dx} = \underline{\underline{\frac{(\cos(\tan(\pi x))) \cdot (\sec^2(\pi x) \cdot \pi)}{2\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}}}}$$

Conclusión

Las derivadas muestran qué tan rápido cambian las funciones en un punto específico. En este trabajo, las resolví aplicando reglas y verifiqué mis resultados con el software Scilab.

Tuve algunas dificultades para identificar qué fórmulas usar, pero con la ayuda de mis compañeros y docente logré hacer las correcciones necesarias.

El propósito de este laboratorio se cumplió, ya que no solo se trató de resolver ejercicios, sino también de comprender los conceptos y fortalecer el razonamiento matemático.

Además de desarrollar habilidades cognitivas, este aprendizaje contribuye al crecimiento profesional, permitiéndonos ofrecer mejores soluciones y ayudar en distintos ámbitos.

Referencias

Larson, R., & Edwards, B. (2015). *Cálculo* (10.^a ed.). Cengage Learning.

Anexo

1. Selecciona las afirmaciones correctas sobre límites.

- a) El límite de una función existe cuando existe una aproximación al mismo valor L tanto por izquierda y derecha en x .
- c) No puede calcularse el valor de un límite cuando la función presenta un comportamiento no acotado.

2. Dado el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 2x^2 + x + 1}{4x^3 + 1}$$

¿Cuál es la afirmación correcta?

- a) El límite es infinito
- b) El límite es 0
- c) El límite es indeterminado
- d) El límite es $\frac{3}{4}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{3x^3}{x^3} + \frac{2x^2}{x^3} + \frac{1}{x^3}}{\frac{4x^3}{x^3} + \frac{1}{x^3}} = \frac{3 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^3}}{4 + \frac{1}{x^3}} \\ &= \text{El límite es } \frac{3}{4} \end{aligned}$$

3. Sea

$$\lim_{x \rightarrow 2\sqrt{3}} \frac{\sqrt{x^2 - 8} - 2}{x^2 - 12}$$

¿Cuál es el valor del límite?

a) No existe límite

b) $-1/4$

c) $1/4$

d) 0

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{x^2-8} - 2}{x^2 - 12} \cdot \frac{\sqrt{x^2-8} + 2}{\sqrt{x^2-8} + 2} = \frac{x^2 - 8 - 4}{(x^2 - 12)(\sqrt{x^2-8} + 2)} \\ &= \frac{x^2 - 12}{x^2 - 12(\sqrt{x^2-8} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x^2-8} + 2} = \frac{1}{\sqrt{12-8} + 2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

4. Considere la función definida a trozos

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \leq 5 \\ -x + 10, & x > 5 \end{cases}$$

Determine el límite de $f(x)$ cuando $x \rightarrow 5$ por izquierda y por derecha. Justifique su respuesta.

R = No existe, pues para que haya un límite, los límites de ambos lados deben ser iguales.

5. Calcule a través del proceso de límite el valor de la pendiente de la recta tangente en $(3, 1/9)$ para la función:

$$y = \frac{1}{x^2}$$

El valor encontrado es:

a) $1/9$

b) $2/9$

c) $2/27$

d) $-2/27$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\frac{1}{(x+\Delta x)^2} - \frac{1}{x^2}}{\Delta x} = \frac{\frac{x^2 - (x+\Delta x)^2}{x^2(x+\Delta x)^2}}{\Delta x} = \frac{\frac{x^2 - x^2 - 2x\Delta x - \Delta x^2}{x^2(x+\Delta x)^2}}{\Delta x} \\
&= \frac{\frac{-2x\Delta x - \Delta x^2}{x^2(x+\Delta x)^2}}{\Delta x} = \frac{-2x\Delta x - \Delta x^2}{(\Delta x)(x^2)(x+\Delta x)^2} = \frac{-2x - \Delta x}{(x^2)(x+\Delta x)^2} \\
&\lim_{\Delta x \rightarrow 0} = \frac{-2x - \Delta x}{(x^2)(x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2)} = \frac{-2x}{x^2(x^2)} = \frac{-2x}{x^4} = \frac{-2}{x^3} = -\frac{2}{27}
\end{aligned}$$

6. Compruebe mediante límites si las asíntotas horizontales y verticales de la función dada corresponden a las mostradas en la gráfica.

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{3x - 5}$$

Vertical

$$\begin{aligned}
3x - 5 &= 0 \\
3x &= 5 \\
x &= \frac{5}{3}
\end{aligned}$$

Horizontales

$$\frac{\frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{x}}{\frac{3x - 5}{x}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$