

## 實域拓展的三角函數

回顧直角三角形及三角函數：




Figure 1: 邊長為 $a, b, c$ 的直角三角形

對以上直角三角形，我們定義 $c$ 為斜邊。

對於 $\theta$ ，我們稱 $a$ 為 $\theta$ 的對邊， $b$ 為 $\theta$ 的鄰邊；對於 $\phi$ ，我們稱 $b$ 為 $\phi$ 的對邊， $a$ 為 $\phi$ 的鄰邊。

**定義 1** (三角函數). 參考上述直角三角形，我們定義以下三角函數：

- 正弦函數(*sine*):  $\sin \theta = \frac{a}{c}$ 。
- 餘弦函數(*cosine*):  $\cos \theta = \frac{b}{c}$ 。
- 正切函數(*tangent*):  $\tan \theta = \frac{a}{b}$ 。
- 正割函數(*secant*):  $\sec \theta = \frac{c}{b}$ 。
- 餘割函數(*cosecant*):  $\csc \theta = \frac{c}{a}$ 。
- 餘切函數(*cotangent*):  $\cot \theta = \frac{b}{a}$ 。

**小記.** 在描述三角函數的正整數次幂時，我們會寫 $\sin^n \theta := (\sin \theta)^n$ 。但留意此寫法只適用於 $n$ 為正整數的情況。一般而言，函數 $f$ 的次幂以 $(f)^n$ 記之。

**引理** (畢氏定理). 參考上述直角三角形，則以下等式成立：

$$a^2 + b^2 = c^2$$

設理 (恆等式). 參考上述直角三角形, 有以下恆等式:

1.  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ;
2.  $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ ;
3.  $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$ ,  $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$ ,  $\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$ ;
4.  $\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$ ,  $\cot^2 \theta + 1 = \csc^2 \theta$ ;
5.  $\sin \theta = \cos \phi$ ,  $\sin \phi = \cos \theta$ .

## 三角函數在圓上的拓展

在代數幾何學中, 一般考慮圓形為圓心與圓周的程差公式: 考慮半徑為 $r$ 的圓並設圓心於原點 $(0, 0)$ , 則任何位於圓周上的點 $P(x, y)$ , 其與圓心的距離為:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r \implies x^2 + y^2 = r^2$$

若設 $r = 1$ , 我們稱其為**單位圓**。留意圓形公式與三角恆等式 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 的相似性, 並參考下圖:




Figure 2: 半徑為1的圓

由此得出, 對於半徑為1的圓, 其坐標 $(x, y)$ 亦可寫作 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 。以此為鑒, 將 $\sin \theta$ 與 $\cos \theta$ 的定義域從 $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 拓展至 $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$ , 則有以下定義:

**定義 2 (象限).** 按一個圓的角度 $\theta$ 分類，給出以下名稱：

- 第一象限(I):  $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ ;
- 第二象限(II):  $90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ;
- 第三象限(III):  $180^\circ \leq \theta \leq 270^\circ$ ;
- 第四象限(IV):  $270^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$ .

第一象限為基本三角形的角度象限，至於第二、三、四象限，考慮以下圖像：




Figure 3: 第二、三、四象限的展現

因此，對於三角函數在圓上的拓展，我們給出以下定義：

**定義 3 (圓拓展三角函數).** 設 $P(x, y)$ 為單位圓上的一點，而 $\theta$ 為 $(1, 0)$ 展至 $P$ 的角度，則

$$x = \cos \theta, y = \sin \theta$$

**衍理.** 設 $P(x, y)$ 為半徑 $r$ 的圓上的一點，而 $\theta$ 為 $(r, 0)$ 展至 $P$ 的角度，則

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

**小記.** 考慮 $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 的值，第一象限給出所有(All)函數均為正數，第二象限給出 $\sin \theta$ 為正數，第三象限給出 $\tan \theta$ 為正數，第四象限給出 $\cos \theta$ 為正數。故引稱C-A-S-T圖以便考慮三角函數的符號。

至於如何求出此拓展函數的值，考慮以旋轉求出第二象限的數值：設 $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ ，則 $90^\circ \leq \theta + 90^\circ \leq 180^\circ$ 。考慮下圖：




Figure 4: 以順時針方向旋轉 $90^\circ$

留意 $\sin(\theta + 90^\circ) = y = \cos \theta$ ,  $\cos(\theta + 90^\circ) = -x = -\sin \theta$ 。因此得出

$$\begin{aligned} \sin(\theta + 90^\circ) &= \cos \theta, & \cos(\theta + 90^\circ) &= -\sin \theta, & \tan(\theta + 90^\circ) &= -\cot \theta \\ \sin(\theta + 180^\circ) &= -\sin \theta, & \cos(\theta + 180^\circ) &= -\cos \theta, & \tan(\theta + 180^\circ) &= \tan \theta \\ \sin(\theta + 270^\circ) &= -\cos \theta, & \cos(\theta + 270^\circ) &= \sin \theta, & \tan(\theta + 270^\circ) &= -\cot \theta \end{aligned}$$

因圓形每 $360^\circ$ 為一周期，故可定義：

**定義 4** (三角函數的周期性).  $\sin(\theta + 360^\circ) = \sin \theta$ ,  $\cos(\theta + 360^\circ) = \cos \theta$

**定理.** 設 $\sin \theta$ ,  $\cos \theta$ ,  $\tan \theta$ 為圓拓展三角函數,  $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ , 則：

$$\begin{aligned} \sin(\pm\theta) &= \pm \sin \theta, & \cos(\pm\theta) &= \cos \theta, & \tan(\pm\theta) &= \pm \tan \theta \\ \sin(90^\circ \pm \theta) &= \cos \theta, & \cos(90^\circ \pm \theta) &= \mp \sin \theta, & \tan(90^\circ \pm \theta) &= \mp \cot \theta \\ \sin(180^\circ \pm \theta) &= \mp \sin \theta, & \cos(180^\circ \pm \theta) &= -\cos \theta, & \tan(180^\circ \pm \theta) &= \pm \tan \theta \\ \sin(270^\circ \pm \theta) &= -\sin \theta, & \cos(270^\circ \pm \theta) &= \pm \cos \theta, & \tan(270^\circ \pm \theta) &= \mp \tan \theta \end{aligned}$$

**衍理.** 設 $\sin \theta$ ,  $\cos \theta$ ,  $\tan \theta$ 為圓拓展三角函數,  $\theta$ 為任意角度, 則：

$$\begin{aligned} \sin(\pm\theta) &= \pm \sin \theta, & \cos(\pm\theta) &= \cos \theta, & \tan(\pm\theta) &= \pm \tan \theta \\ \sin(90^\circ \pm \theta) &= \cos \theta, & \cos(90^\circ \pm \theta) &= \mp \sin \theta, & \tan(90^\circ \pm \theta) &= \mp \cot \theta \\ \sin(180^\circ \pm \theta) &= \mp \sin \theta, & \cos(180^\circ \pm \theta) &= -\cos \theta, & \tan(180^\circ \pm \theta) &= \pm \tan \theta \\ \sin(270^\circ \pm \theta) &= -\sin \theta, & \cos(270^\circ \pm \theta) &= \pm \cos \theta, & \tan(270^\circ \pm \theta) &= \mp \tan \theta \end{aligned}$$

**定義 5** (弧度). 依照圓周計算, 定義**弧度**為角度對應的單位弧長路徑, 並以 $rad$ 為單位 (使用時可忽略單位不寫)。 $\pi$ 對應 $180^\circ$ 。

衍理. 設 $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 為圓拓展三角函數,  $\theta$ 為任意角度, 則:

$$\begin{aligned} \sin(\pm\theta) &= \pm \sin \theta, & \cos(\pm\theta) &= \cos \theta, & \tan(\pm\theta) &= \pm \tan \theta \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right) &= \cos \theta, & \cos\left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right) &= \mp \sin \theta, & \tan\left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right) &= \mp \cot \theta \\ \sin(\pi \pm \theta) &= \mp \sin \theta, & \cos(\pi \pm \theta) &= -\cos \theta, & \tan(\pi \pm \theta) &= \pm \tan \theta \\ \sin\left(\frac{3\pi}{2} \pm \theta\right) &= -\sin \theta, & \cos\left(\frac{3\pi}{2} \pm \theta\right) &= \pm \cos \theta, & \tan\left(\frac{3\pi}{2} \pm \theta\right) &= \mp \cot \theta \end{aligned}$$

## 逆三角函數

考慮三角函數作為函數的可逆性並不理想 (不符合單射性), 故對於逆三角函數的討論, 雖稱其為逆函數, 卻視之為逆映射。

**定義 6** (三角函數的逆函數). 對於逆三角函數, 給出以下定義:

$$\begin{aligned} \arcsin : \{-1 \leq x \leq 1\} &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \{\theta \in \mathbb{R} : \sin \theta = x\} \\ \arccos : \{-1 \leq x \leq 1\} &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \{\theta \in \mathbb{R} : \cos \theta = x\} \\ \arctan : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \{\theta \in \mathbb{R} : \tan \theta = x\} \end{aligned}$$

同理, 對於另外三個三角函數:

$$\begin{aligned} \operatorname{arcsec} : \{-1 \leq x \leq 1\} &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \{\theta \in \mathbb{R} : \sec \theta = x\} \\ \operatorname{arccsc} : \{-1 \leq x \leq 1\} &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \{\theta \in \mathbb{R} : \csc \theta = x\} \\ \operatorname{arccot} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \{\theta \in \mathbb{R} : \cot \theta = x\} \end{aligned}$$

**小記.** 留意前綴‘*arc*’, 其意義為‘求弧度’。因此意義上與求角度是一樣的, 惟需注意的是因應三角函數的周期性, 符合條件的結果有無窮多項, 因此定義以數集表示。通常所求角度在 $0$ 至 $2\pi$ 之間, 對應結果有兩項。若限於 $0$ 至 $\pi/2$ 之間, 則可視為逆函數, 亦是常規解釋, 分別記為 $\sin^{-1}, \cos^{-1}, \tan^{-1}, \sec^{-1}, \csc^{-1}, \cot^{-1}$ 。

**設理.** 對於 $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} \arcsin(\sin x) &= \{2n\pi + x, (2n+1)\pi - x : n \text{ 為整數}\} \\ \arccos(\cos x) &= \{2n\pi \pm x : n \text{ 為整數}\} \\ \arctan(\tan x) &= \{n\pi + x : n \text{ 為整數}\} \end{aligned}$$

## 三角函數的和積互化


目前已知特殊角度的加減可簡化為單一角度的算式，如此衍伸問題：對於任意角度 $\alpha, \beta$ ，若寫 $\sin(\alpha + \beta), \cos(\alpha + \beta), \tan(\alpha + \beta)$ ，能否將之簡化為 $\alpha$ 與 $\beta$ 的三角函數算式呢？即是否有函數 $f, g, h$ 使得

$$\sin(\alpha + \beta) = f(\sin \alpha, \sin \beta, \cos \alpha, \cos \beta, \tan \alpha, \tan \beta)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = g(\sin \alpha, \sin \beta, \cos \alpha, \cos \beta, \tan \alpha, \tan \beta)$$

$$\tan(\alpha + \beta) = h(\sin \alpha, \sin \beta, \cos \alpha, \cos \beta, \tan \alpha, \tan \beta)$$

從 $\sin(\alpha + \beta)$ 入手，考慮以下扇形



如上圖所示， $\sin(\alpha + \beta) = x + y$ 。又見

$$x = \sin \beta \cos \alpha, y = \cos \beta \sin \alpha$$

則 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$ 。

現求得 $\sin(\alpha + \beta)$ 的變化，則可通過代入求得其餘變化：

$$\begin{aligned}
 \sin(\alpha - \beta) &= \sin(\alpha + (-\beta)) = \sin \alpha \cos(-\beta) + \sin(-\beta) \cos \alpha \\
 &= \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha \\
 \cos(\alpha + \beta) &= \sin\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos(-\beta) + \sin(-\beta) \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \\
 &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\
 \cos(\alpha - \beta) &= \cos(\alpha + (-\beta)) = \cos \alpha \cos(-\beta) - \sin \alpha \sin(-\beta) \\
 &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \\
 \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} \\
 &= \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \\
 \tan(\alpha - \beta) &= \frac{\tan \alpha + \tan(-\beta)}{1 - \tan \alpha \tan(-\beta)} \\
 &= \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}
 \end{aligned}$$

**定理.** 設 $\alpha, \beta$ 為弧度角，則

$$\begin{aligned}
 \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha \\
 \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \\
 \tan(\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}
 \end{aligned}$$

由此，可逆推算出以下設理：

**設理.** 設 $\alpha, \beta$ 為弧度角，則

$$\begin{aligned}
 \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)] \\
 \sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \\
 \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]
 \end{aligned}$$

**衍理.** 設 $\alpha, \beta$ 為弧度角，則

$$\begin{aligned}
 \sin \alpha \pm \sin \beta &= 2 \sin \frac{\beta \pm \alpha}{2} \cos \frac{\beta \mp \alpha}{2} \\
 \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\beta + \alpha}{2} \cos \frac{\beta - \alpha}{2} \\
 \cos \alpha - \cos \beta &= 2 \sin \frac{\beta + \alpha}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}
 \end{aligned}$$

## 兩倍角公式

從以上和積互化公式可見，若 $\alpha = \beta$ ，則可視為兩倍角公式：

定理. 設 $x$ 為弧度角，則

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

留意 $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$ 可化為

$$\begin{aligned} \cos^2 x - \sin^2 x &= (1 - \sin^2 x) - \sin^2 x \\ &= 1 - 2 \sin^2 x \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} \cos^2 x - \sin^2 x &= \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) \\ &= 2 \cos^2 x - 1 \end{aligned}$$

故當 $0 < x < \pi$ 時，

$$\sin x = \sqrt{\frac{1 - \cos(2x)}{2}} \implies \sin \frac{t}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos t}{2}}$$

當 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 時，

$$\cos x = \sqrt{\frac{1 + \cos(2x)}{2}} \implies \cos \frac{t}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos t}{2}}$$

當 $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ 時，

$$\cos x = -\sqrt{\frac{1 + \cos(2x)}{2}} \implies \cos \frac{t}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos t}{2}}$$

其中 $t = 2x$ 。此算式稱為半倍角公式。

同時考慮 $t = \tan \frac{x}{2}$ ，則對於所有三角函數，均可以 $t$ 表示。以 $\sin x$ 為例：

$$\begin{aligned} \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \\ &= \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{\sec^2 \frac{x}{2}} \\ &= \frac{2t}{1 + t^2} \end{aligned}$$

對此，以下定理成立：

定理. 設 $x \in \mathbb{R}$ ，若 $t = \tan \frac{x}{2}$ ，則

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \tan x = \frac{2t}{1 - t^2}$$



## 三倍角公式

定理. 設  $x \in \mathbb{R}$ , 則

$$\sin(3x) = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

$$\tan(3x) = \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}$$

證明. 重複運用兩倍角公式以推導出  $\sin(3x)$  和  $\cos(3x)$  的算式, 並運用  $\tan(3x) = \frac{\sin(3x)}{\cos(3x)}$  推導結果。□

## 輔助角

回顧和積互化公式, 大部分三角學算式都能化作  $\sin$  與  $\cos$  的組合, 如此便能讓大部分等式迎刃而解。但亦有例外:

$$2 \sin x + 3 \cos x = 4$$

對於以上等式, 我們無法直接套用任何一條三角形公式以求得答案。如此便需要額外技巧, 稱為**輔助角**。在運用輔助角時需要一定條件, 考慮通用式:

$$a \sin x + b \cos x = c$$

其中  $a, b, c \in \mathbb{R}$ 。考慮左邊算式與  $\sin(x + y)$  的展開式的相似性, 便作以下猜想:

主張. 設存在  $r$  與  $\alpha$  使得以下等式成立:

$$r \sin(x + \alpha) = a \sin x + b \cos x$$

且  $r \geq |c|$ , 則  $a \sin x + b \cos x = c$  可解。

證明. 直接計算即可。若

$$r \sin(x + \alpha) = a \sin x + b \cos x$$

則

$$r \sin x \cos \alpha + r \cos x \sin \alpha = a \sin x + b \cos x$$

$$\begin{aligned} \implies & \begin{cases} r \cos \alpha = a \\ r \sin \alpha = b \end{cases} \\ \implies & \begin{cases} r = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \end{cases} \end{aligned}$$

同時

$$r \sin(x + \alpha) = c \implies \sin(x + \alpha) = \frac{c}{r}$$

由於 $\sin x$ 的值域介乎 $-1$ 與 $1$ 之間，故 $|c|/r \leq 1 \implies |c| \leq r$ 時等式可解。  $\square$

**定理.** 設 $a, b, c$ 為常數， $x \in \mathbb{R}$ 。當 $a^2 + b^2 \geq c^2$ 時，則 $a \sin x + b \cos x = c$ 的解為

$$x = \sin^{-1}\left(\frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

## 複域幾何


回顧中四對於複數的教學：對於任意複數 $z \in \mathbb{C}$ ，均可寫

$$z = x + yi$$

其中 $x, y \in \mathbb{R}$ ， $i^2 = -1$ 。此表達式稱為**標準式**（或稱**笛卡爾式**），因為對於任何複數而言，此表達式都是獨特的，而且可輕易區分**實部**和**複部**：

- 實部：記 $\operatorname{Re}\{z\} = x$ ；
- 複部：記 $\operatorname{Im}\{z\} = y$ ；

對此，考慮 $i$ 並非實數，則可假設 $i$ 為與實數綫垂直的方向。由此引用**阿根圖**：



以此為鑒，此圖考慮等價於笛卡爾坐標圖，作y軸為 $\text{Im}\{z\}$ 的向量，x軸為 $\text{Re}\{z\}$ 的向量，則任何複數 $z = x + yi \in \mathbb{C}$ ，都可記為：

$$x + yi \sim (x, y)$$

並且留意到

$$i = 0 + 1i \sim (0, 1)$$

$$(a, b) + (c, d) \sim (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i \sim (a + c, b + d)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) \sim (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i \sim (ac - bd, ad + bc)$$

運用坐標可使我們對複數的理解更具體。現定義：

**定義 7 (模).** 對於 $z \in \mathbb{C}$ ，我們稱 $z$ 與0的距離為**模**，並記為：

$$|z| = \sqrt{(\text{Re}\{z\})^2 + (\text{Im}\{z\})^2}$$

**定義 8 (模).** 對於 $z \in \mathbb{C}$ ，定義 $z$ 的**共軛**為：

$$\bar{z} = \text{Re}\{z\} - \text{Im}\{z\}$$

若以坐標描述，可定義為 $(x, y) \mapsto (x, -y)$ ，並視為沿實數軸反射。

**設理.** 對於任意 $z \in \mathbb{C} - \{0\}$ ，均有

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}}$$

**衍理.** 對於任意 $z \in \mathbb{C} - \{0\}$ ， $z$ 可逆，並且

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

**小記.** 需注意0沒有逆元素，除非對於 $\frac{1}{0}$ 有明確定義，否則不作考慮。詳細參考擴充平面的敘述。

考慮笛卡爾平面與極坐標的轉換，參考




Figure 5: 阿根圖與極坐標

坐標的對應方式如下：

複數	笛卡爾	極坐標
0	(0,0)	(0,0)
1	(1, 0)	(1, 0)
$i$	(0, 1)	$(1, \pi/2)$
-1	(-1, 0)	$(1, \pi)$
$-i$	(0, -1)	$(1, 3\pi/2)$


並且回憶圓形與三角函數的關係，可得以下表達式：

**定理.** 對於任意  $z \in \mathbb{C}$ ，均可寫作

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

其中  $r = |z|$ ,  $\theta = \arctan \frac{\text{Im}\{z\}}{\text{Re}\{z\}}$ 。

**證明.** 考慮單位圓：



並由定義3之衍理，可得  $z \sim (r \cos \theta, r \sin \theta) \sim r \cos \theta + ir \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 。其中

$$\begin{aligned} |z| &= \sqrt{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} \\ &= \sqrt{r^2} \\ &= r \\ \tan \theta &= \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} = \frac{\operatorname{Im}\{z\}}{\operatorname{Re}\{z\}} \\ \theta &= \arctan \frac{\operatorname{Im}\{z\}}{\operatorname{Re}\{z\}} \end{aligned}$$

□

## 棣莫弗定理與多倍角

對於複數加減法，我們不再多說，因為加減法屬於非常簡單的運算。但是，對於乘除法，我們可有更深刻的瞭解，而且其中牽涉的很大程度與三角函數有關。

**定理 (棣莫弗定理).** 設  $z, w \in \mathbb{C}$ ，並表  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ,  $w = s(\cos \phi + i \sin \phi)$ 。則

$$zw = rs(\cos(\theta + \phi) + i \sin(\theta + \phi))$$

證明. 通過直接計算:

$$\begin{aligned}
 zw &= r(\cos \theta + i \sin \theta)s(\cos \phi + i \sin \phi) \\
 &= rs(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \phi + i \sin \phi) \\
 &= rs(\cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi + i(\cos \theta \sin \phi + \sin \theta \cos \phi)) \\
 &= rs(\cos(\theta + \phi) + i \sin(\theta + \phi))
 \end{aligned}$$

□

設理 (棣莫弗定理的推廣形式). 設  $(z_k)_{k=1}^n$  為一系列複數, 其中對於所有  $1 \leq k \leq n$ ,  $z_k = r_k(\cos \theta_k + i \sin \theta_k)$ . 則

$$\prod_{k=1}^n z_k = \left( \prod_{k=1}^n r_k \right) \left[ \cos \left( \sum_{k=1}^n \theta_k \right) + i \sin \left( \sum_{k=1}^n \theta_k \right) \right]$$

證明. 運用數學歸納法。

□

設理 (乘方形式). 對於任意  $z \in \mathbb{C}$ , 若  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ , 則對於任何整數  $n$ , 均有

$$z^n = r^n(\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))$$

證明. 推廣形式中所有  $\theta_k$  相等時的結果。

□

衍理. 若考慮乘方形式中  $r = 1$ , 即模為 1 的複數, 則

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

根據以上衍理, 可得出多倍角的算式為

$$\begin{aligned}
 \cos(nx) &= \sum_{0 \leq k \leq n/2} \cos^{n-2k} x \sin^{2k} x \\
 \sin(nx) &= \sum_{0 \leq k \leq n/2} \cos^{n-2k-1} x \sin^{2k+1} x
 \end{aligned}$$

## 習題

1. 求以下  $x$  的值 ( $0 \leq x \leq 2\pi$ ):

$$\begin{array}{llll}
 \text{a) } \sin x = \frac{1}{2} & \text{b) } \cot x = -\frac{1}{3} & \text{c) } \cos x = \frac{3}{5} & \text{d) } \tan x = 1 \\
 \text{e) } \cot x = 3 & \text{f) } \cos x = -0.5 & \text{g) } \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} & \text{h) } \tan x = -2.4 \\
 \text{i) } \sin x = -0.4 & \text{j) } \cos x = -1 & \text{k) } \tan x = -\sqrt{3} & \text{l) } \cot x = \frac{1}{7}
 \end{array}$$

2. 簡化以下表達式：

- |  |  |
|--|--|
| a) $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$             | b) $\frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\sin x}$                                   |
| c) $\frac{\tan x \tan 2x}{\tan x - \tan 2x}$ | d) $\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} + \frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x}$                               |
| e) $\frac{\sin u + \sin v}{\cos u + \cos v}$ | f) $\frac{\sin x + \sin 3x + \sin 5x + \sin 7x}{\cos x + \cos 3x + \cos 5x + \cos 7x}$       |
| g) $\sin x \cot x + \cos x$                  | h) $\sin^2 x(1 + \cot x) + \cos^2 x(1 + \tan x) - 1 - \sin 2x$                               |
| i) $\frac{\cos x - \sin x}{1 - \tan x}$      | j) $\frac{\cos 3x + \cos x}{\cos 4x + \cos 2x} + \frac{\sin 3x + \sin x}{\sin 4x + \sin 2x}$ |
| k) $\frac{1 + \cos 2x}{1 - \cos 2x}$         | l) $\frac{1}{1 - \sin x} - \frac{\sin x}{1 - \sin^2 x} - \frac{1}{1 + \sin x}$               |
| m) $\frac{\sin 2x}{\cos^2 x}$                | n) $\frac{\sin x + \sin 5x - \sin 3x}{\cos x + \cos 5x - \cos 3x}$                           |
| o) $\frac{1 - \tan^2 x}{\cos 2x}$            | p) $\frac{1 + \cos 2x}{1 - \cos x} - \frac{4 \cos^2(x/2)}{\tan^2 x}$                         |
| q) $\frac{\sin^2 x - 1}{\cos^2 x - 1}$       | r) $\frac{\sin(\pi/6 + x) - \sin(\pi/6 - x)}{\cos(\pi/3 + x) + \cos \pi/3 - x}$              |
| s) $\frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$           | t) $\cos(\pi/4 + x) - \cos(\pi/4 - x)$   |

3. 證明以下等式：

$$\sin^2(n\theta) - \sin^2(m\theta) = \sin[(n+m)\theta] \sin[(n-m)\theta]$$

由此，解方程  $\sin^2(3\theta) - \sin^2(2\theta) - \sin \theta = 0$ ，其中  $0 \leq \theta \leq \pi$ 。

4. (a) 試以  $\cot \theta$  表述  $\cot 4\theta$ 。由此，解方程  $x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 4x + 1 = 0$ 。(答案以  $\pi$  表示。)

(b) i. 若  $\cos \theta - \cos \phi = a$  及  $\sin \theta - \sin \phi = b$  ( $b \neq 0$ )，證明

$$\frac{1}{2}(2 - a^2 - b^2) = \cos(\theta - \phi) \text{ and } \frac{-a}{b} = \tan \frac{\theta + \phi}{2}.$$

ii. 解以下方程組

$$\begin{cases} \cos \theta - \cos \phi = 1 \\ \sin \theta - \sin \phi = \sqrt{3} \end{cases}$$

其中  $0 \leq \theta \leq 2\pi$  及  $0 \leq \phi \leq 2\pi$ 。

5. (a) 解方程  $\sin x - \sin 2x + \sin 3x = 0$ ， $0 < x < 2\pi$ 。

- (b) 設  $f(\theta) = \sin 2\theta + \sin \theta + \cos \theta$ 。
- i. 試以  $p$  表述  $f(\theta)$ ，其中  $p = \sin \theta + \cos \theta$ 。
  - ii. 利用(i)和配方法，求  $f(\theta)$  的最小值。若  $0 < \theta < \pi$ ，求  $\theta$  的值使得  $f(\theta)$  到達最小值。
6. 解方程：  $2 \sin x + 3 \cos x = 1$ 。
7. 證明  $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$ 。
8. 利用數學歸納法，證明乘方形式及其衍理。