## 測驗2

## 數學延伸單元 單元1 (微積分與統計學)

## 試題-答題簿

限時: 2 小時

姓名:	得分:	/51+5
學校:		

## 規則

- 1. 此試卷必須使用中文回答。
- 2. 除特別指明外,需詳細列出所有算式。
- 3. 除特別指明外,數值答案必須用真確值表示。
- 4. 本試卷只作內部使用。
- 5. 所有試題取自AL/CE/DSE歷届試題,來源: https://www.dse.life/ppindex/m2/

-此爲空白頁-

1.	(12分) 已知 $t = y^3 + 1$ 及 $e^t = x^{x^2+1}$	
	(a) 求 $\frac{dt}{dy}$ 。	(1分)
	(b) 從以 $x$ 表 $t$ ,求 $\frac{dt}{dx}$ 。	(2分)
	(b) 從以 $x$ 表 $t$ , 求 $\frac{dt}{dx}$ 。 (c) 以 $x$ 及 $y$ 表 $\frac{dy}{dx}$ 。	(2分)
	(d) 求當 $x = e$ 時 $y$ 的值,並求出 $\frac{dy}{dx}\Big _{x=e}$ 的值。	(2分)
	(e) 求 $x = e$ 時以上述算式在 $xy$ 平面繪出的曲綫的切綫的 $x$ 軸截距及 $y$ 軸截距。	(3分)
	(f) 由此,求 $(e)$ 所述的切綫與 $x$ 軸及 $y$ 軸包裹區域的面積。	(2分)

2:導數及其	應用			

2.		分)某病菌在某時間點 $t(從16/4/2010$ 早上9時起計算的天數,可正可負)的數量 $p(t)$ 可以式估算
		$p(t) = \frac{a}{b + e^{-t}} + c, -\infty < t < \infty$
		a,b,c為正常數。定義原始數量為無限多天之前的病菌數量,以及終極數量為無限多天病菌數量。
	(a)	試以 $a,b,c$ 表下列各數:
		i. $p(t)$ 的增長速度最快之時;
		ii. 原始數量;
		iii. 終極數量。
		(5分
	(b)	某科學家通過繪畫 $\ln[p(t)-c]$ 對 $\ln(b+e^{-t})$ 的圖像來研究病菌數量,並發現圖像的縱軸截距為 $\ln 8000$ 。如果 $16/4/2010$ 早上9時的病菌數量及每天增長速度分別爲 $6000$ 及 $2000$ ,求 $a,b,c$ 的值。 (3分
	(c)	另一名科學家認爲當病菌的增長速度達到峰值時,病菌數量將等於原始數量及終極數量的平均值。你同意嗎?試解釋你的答案。 (2分
	(d)	透過以 $a, b, c$ 及 $p(t)$ 表 $e^{-t}$ ,以 $\frac{-b}{a}[p(t) - \alpha][p(t) - \beta]$ 的形式表 $p'(t)$ ,其中 $\alpha < \beta$ 。由此以 $a, b, c$ 表 $\alpha$ 及 $\beta$ 。描繪於 $\alpha < p(t) < \beta$ 時 $p'(t)$ 對 $p(t)$ 的圖像並驗證(c)題的答案。 (5分

2:導數及其	應用			

測驗2	<b>掌數及其應用</b>	
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

2:導數及其	應用			

(6分) 某倒立正圓錐形容器的底半徑為 $15 \text{ cm}$ 且高為 $20 \text{ cm}$ 。該容器在初版器内的水正以 $2\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ 的速度流走。設 $h \text{ cm}$ 為容器内餘下的水的深度, $r \text{ c}$ (如圖), $V \text{ cm}^3$ 為水的體積,而 $A \text{ cm}^2$ 為容器浸濕部分的面積。	
(a) 試 <b>只以</b> $r$ 表 $V$ 及 $A$ 。	(2分)
(b) 當 $r=3$ 時,	
i. 求半徑的變率;	(2分)
ii. 求容器浸濕部分的面積的變率。	(2分)

測驗2	<b>掌數及其應用</b>	
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

4	(0/1)	计数子对子产维八明照	
4.	(8分)	計算下列不定積分問題	0

(a) 
$$\int 3x^7 + 4\sqrt{x} + x^{-1} + 2dx$$
 (25)

(b) 
$$\int \frac{2x^3 + 4x^2 + 6x + 3}{x^2 + x + 1} dx$$
 (2 $\%$ )

(c) 已知某曲綫在(x,y)的斜率為 $\frac{dy}{dx}=xe^x$ ,且y截距為0。考慮 $\frac{d}{dx}(xe^x)$ 的結果,求曲綫的x截距。

Ζ:∻	<b>算數及其應用</b>	
-		
_		

- 5. (10分)按要求回答下列定積分問題。
  - (a) 利用梯形法則,n=6的情況,估算  $\int_{1/7}^1 \ln x dx$  的值,並判斷估算值為過高估算或過低估算。 (4分)
  - (b)  $\bar{x}y = \frac{1}{x \ln x}$ 的圖像從 $x = e \bar{x} = e^4$ 的曲綫下面積。 (2分)
  - (c) i. 證明對於任意實數a,  $\int_{-a}^{a} \frac{e^{x}}{e^{x}+1} dx = \int_{-a}^{a} \frac{1}{e^{x}+1} dx$ .

ii. 由此,求
$$\int_{-a}^{a} \frac{e^{x}}{e^{x}+1} dx$$
及 $\int_{-a}^{a} \frac{e^{x}-1}{e^{x}+1} dx$ 的值。

 $\int_{-a} e^x + 1^{-a} \int_{-a} e^x + 1^{-a} \int_{-$ 

-		
-		

測驗2:導數及其應用		

挑戰題I.	. (3分) 設 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ,其中值的條件。	$\Box a, b, c, d$ 為常數且 $a \neq 0$ 。	試以 $a,b,c$ 表 $f(x)$ <b>沒有極</b>

挑戰題II.	(2分) 設 $f(x) = e^{-x^2}$ 。求 $f(x)$ 及 $-f(x)$ 所包裹的區域内最大圓形的面積。

2: 學 5	敗及其應用				
-					

挑戰題III.	(1分) 已知 $\sum_{k=0}^{n} \int_{0}^{n} C_{k}^{n} x^{k} dx = \frac{n}{n+1}$ ,求 $n$ 的所有可能值。

2:導數及其應	用			
-				