空间任意力系简化程序设计报告

基于 Python 的三维交互计算程序

报告日期 2026 年 10 月 16 日　程序基线 3785ddd

摘要

本程序面向理论力学中空间任意力系的简化问题，将若干集中力及可选的自由力偶等效为指定点处的主矢和主矩，再进一步判定平衡力系、纯力偶、单一合力或力螺旋。对于具有定位要求的合力，程序给出作用线；对于一般空间力系，给出力螺旋中心轴及轴上剩余力偶。

程序采用 Python 标准库 tkinter 构建桌面界面，以三维正交投影展示载荷、简化点和等效结果。用户可旋转、缩放和平移场景，并保存项目或导出报告与矢量图。四类运行实例与重新执行的自动化测试共同核验了计算结果。

一 程序概述

力系简化的目的，是在保持刚体外部静力效应的条件下，用较少的力学量表示原有载荷。本报告依次说明理论模型、程序流程、操作方法和运行实例，便于读者理解算法并复现计算。

项目	具体要求
输入	各力大小与方向或三个分量、作用点坐标、任意简化点；可附加自由力偶矩。
主矢与主矩	输出三个分量、模长、单位方向向量以及与三个正坐标轴的方向角。
最简结果	给出四类判定；需要定位时给出轴上一点、单位轴方向及参数方程。
交互与文件	三维视图操作，JSON 项目读写，TXT 报告与 SVG 场景导出。

适用范围为刚体集中力系的静力等效。分布载荷须先换算为集中合力及相应作用位置；本程序不求解支座反力、运动响应或物体内部应力。

二 力系简化的数学模型

坐标与输入约定

采用右手直角坐标系。第 i 个力的作用点为 P_i，力向量为 F_i，简化点为 O；可选附加自由力偶向量记为 C。所有坐标使用同一全局坐标系，单位统一为 m、N 和 N·m。

主矢与主矩

各力的矢量和称为主矢。各力对简化点的矩与自由力偶之和称为该点的主矩。它们共同确定力系对刚体的外部静力效应。[1]

$$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{F}_i$$

$$\mathbf{M}_O = \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{P}_i - \mathbf{O}) \times \mathbf{F}_i + \mathbf{C}$$

令 $r_i = P_i - O$。主矢的三个分量分别为各力对应分量之和，主矩则按叉积展开。

$$R_x = \sum_{i=1}^{n} F_{ix},\quad R_y = \sum_{i=1}^{n} F_{iy},\quad R_z = \sum_{i=1}^{n} F_{iz}$$

$$M_{Ox} = \sum_{i=1}^{n} \left(r_{iy}F_{iz} - r_{iz}F_{iy}\right) + C_x$$

$$M_{Oy} = \sum_{i=1}^{n} \left(r_{iz}F_{ix} - r_{ix}F_{iz}\right) + C_y$$

$$M_{Oz} = \sum_{i=1}^{n} \left(r_{ix}F_{iy} - r_{iy}F_{ix}\right) + C_z$$

大小与方向

对于任一非零向量 v，程序按下式计算模长、单位方向和三个方向角。方向角按度输出，范围为 0° 至 180°；零向量的方向未定义。

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2},\quad \mathbf{u}_v = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{v_x}{\|\mathbf{v}\|}\right),\qquad \beta = \arccos\left(\frac{v_y}{\|\mathbf{v}\|}\right),\qquad \gamma = \arccos\left(\frac{v_z}{\|\mathbf{v}\|}\right)$$

主矢不随简化点改变；主矩随简化点改变。更换简化点时，可用下式检验计算结果。

$$\mathbf{M}_{O'} = \mathbf{M}_O - (\mathbf{O}' - \mathbf{O}) \times \mathbf{R}$$

三 最简力系与作用线

四种最简结果

主矢与主矩是指定点处的等效表示，未必就是最简表示。主矢非零时，可以沿垂直于主矢的方向移动合力作用线，消去主矩中垂直于主矢的分量；平行分量需要另行判定。

判定条件	最简结果	定位信息
R 为零且主矩为零	平衡力系	无需定位
R 为零且主矩非零	纯力偶	自由矢量，无固定作用线
R 非零且轴向力偶为零	单一合力	必须给出合力作用线
R 非零且轴向力偶非零	力螺旋	给出中心轴及平行力偶

中心轴的确定

当 R 非零时，令 u 为主矢的单位方向向量，M∥ 为主矩沿主矢的投影。选择中心轴上一点 A，并定义带符号的螺距 h。

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{R}}{\|\mathbf{R}\|},\ \mathbf{A} = \mathbf{O} + \frac{\mathbf{R} \times \mathbf{M}_O}{\|\mathbf{R}\|^2}$$

$$\mathbf{M}_{\parallel} = (\mathbf{M}_O \cdot \mathbf{u})\mathbf{u},\ h = \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{M}_O}{\|\mathbf{R}\|^2}$$

$$\mathbf{P}(t) = \mathbf{A} + t\,\mathbf{u},\ t \in \mathbb{R}$$

A 是中心轴上距离 O 最近的点，t 的单位为 m。把合力移动到 A 后，其力矩补偿恰好消去垂直分量，轴上仅剩平行力偶。

$$\mathbf{M}_A = \mathbf{M}_O - (\mathbf{A} - \mathbf{O}) \times \mathbf{R} = \mathbf{M}_{\parallel}$$

若 M∥ 在容差内为零，最简结果为沿该作用线的单一合力；否则为力螺旋。h>0 表示剩余力偶与合力同向，h<0 表示反向。力偶与合力平行不等于只能同向，负螺距同样属于力螺旋。

等效性校验

对单一合力或力螺旋，使用轴上的合力与保留的力偶重构原主矩。程序报告重构结果与原主矢、主矩之间的残差，便于发现叉积符号或作用线错误。

$$\mathbf{M}_O = (\mathbf{A} - \mathbf{O}) \times \mathbf{R} + \mathbf{M}_{\parallel}$$

四 程序结构与总体流程

程序将界面、力学计算和三维绘图分离。下图表示一次数据输入至结果输出的主处理路径；输入无效时保留已应用数据，避免部分更新。




图 1 程序总体处理流程

app.py 管理输入、文件和事件；mechanics.py 完成向量运算、分类与报告；scene.py 负责投影、相机交互和 SVG 导出。窗口使用事件循环，视角调整只触发重绘，不改变物理计算数据。

五 最简结果的算法流程

判定流程先检查主矢，再处理主矩或轴向力偶，因而覆盖一般空间力系，避免把所有非零合力都误判为单一合力。




图 2 四类最简力系的判定流程

浮点零值与计算稳定性

程序使用“绝对容差加相对容差乘输入尺度”判断零值。默认相对容差为 10^{-10}，力绝对容差为 10^{-12} N，矩绝对容差为 10^{-12} N·m，避免使用同一阈值直接比较量纲不同的量。

力的输入尺度取各力模长之和。矩的输入尺度取各力对作用点形心的矩模长之和再加自由力偶模长，从而减少仅更换简化点导致分类变化的情况。计算中先在载荷附近求矩，再将主矩移到指定点，并使用 math.fsum 改善求和稳定性。

容差只用于分类，输出分量保留实际浮点结果。零向量不计算方向角；非零向量的反余弦参数限制在 [−1,1]，防止舍入误差导致定义域异常。

六 程序启动与基本操作

运行环境

使用 Python 3.10 或更高版本，并安装其 Tcl/Tk 组件。程序不依赖 NumPy 或 Matplotlib。Windows 用户可双击 launch.bat；也可在程序目录中执行以下命令。

```
python app.py
```



图 3 程序主界面及默认空间力系算例

一次完整计算

第一步，在“力与作用点”页签填写名称、输入方式、力数据和作用点，点击“新增并计算”。第二步，依次加入其余各力。已有力可从表格或图中点选，修改后点击“更新选中”。

第三步，进入“简化点 / 力偶”页签填写 O 和可选的 C，并点击“应用简化点 / 力偶”。第四步，在右侧读取分量、大小、方向角以及最简结果；有定位要求时继续查看 A、u 和参数方程。最后按需保存 JSON、导出报告或导出图像。

编辑区中的新内容只有点击相应应用按钮后才进入计算。删除操作作用于当前选中的力；“清空编辑区 / 取消选择”仅清除编辑状态，“清空力系”则清空全部力并重置简化点和附加力偶。

七 输入方式与交互说明

三种力输入方式

分量方式直接输入带正负号的 Fx、Fy、Fz。大小与方向向量方式输入非负大小 F 和非零方向向量 d，程序按下式归一化，不要求 d 预先为单位向量。

$$\mathbf{F} = F\,\frac{\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|}$$

方位角与仰角方式中，φ 在 XY 平面内从 +X 向 +Y 计量，θ 为相对 XY 平面的仰角，范围为 −90° 至 90°。输入角度使用度，换算关系为：

$$F_x = F\cos\theta\cos\varphi,\ F_y = F\cos\theta\sin\varphi,\ F_z = F\sin\theta$$

例如 F=100 N、φ=0°、θ=0° 得到沿 +X 的力；F=100 N、φ=90°、θ=0° 得到沿 +Y 的力。输入大小为零时允许零方向向量，输出方向仍为未定义。

视图与文件操作

操作	功能
左键拖动 滚轮 右键拖动	分别旋转、缩放和平移场景；双击可复位。
3D XY XZ YZ	切换等轴观察方向或坐标平面视图。
原力系 简化到 O	分别显示原始载荷，或指定点处主矢与主矩。
最简结果 对照	分别显示最简力系，或与原始力叠加比较。
打开与保存 JSON	保留已应用载荷、简化点与附加力偶，便于复现。
导出报告与图像	输出 TXT 数值报告和当前相机视角的 SVG 图像。

绿色表示等效合力及作用线，红色双箭头表示力矩，其他颜色表示各原始力。力与力矩分别缩放；短矢量使用最小示意箭长，因此图上箭长不能用于读取力臂或比较不同量纲的数值。

输入检查与常见问题

所有数值必须有限，允许科学计数法。非零力不能使用零方向向量；力的大小不能为负；仰角不能越界。JSON 项目固定使用 N 和 m，坐标和分量均须为三个数的数组。单位不同应在输入前换算。

八 运行实例 单一合力

选择内置算例“平行力系 · 单一合力”，或打开 examples/02_parallel_resultant.json。简化点 O=(0,0,0) m，无附加力偶。输入数据如下。

力	力分量 N	作用点 m
F1	(0, 0, −100)	(0, 0, 0)
F2	(0, 0, −200)	(3, 0, 0)

计算结果与手算核对

$$\mathbf{R} = (0, 0, -300)\ \mathrm{N}$$

$$\mathbf{M}_O = (3, 0, 0) \times (0, 0, -200) = (0, 600, 0)\ \mathrm{N{\cdot}m}$$

输出量	程序结果
主矢大小与方向	300 N；方向为 −Z；方向角 (90°, 90°, 180°)。
主矩大小与方向	600 N·m；方向为 +Y；方向角 (90°, 0°, 90°)。
最简结果	单一合力，轴向剩余力偶为零。
作用线	A=(2,0,0) m；u=(0,0,−1)。

$$\mathbf{P}(t) = (2, 0, 0) + t\,(0, 0, -1)$$

合力作用线满足 x=2 m、y=0，方向沿 −Z。用 A 点的合力重构主矩，有 (2,0,0)×(0,0,−300)=(0,600,0) N·m，与原力系一致，矩残差为零。




图 4 平行力系及其合力作用线

九 运行实例 力螺旋

选择内置算例“空间力系 · 力螺旋”，或打开 examples/01_wrench.json。简化点取原点，无附加自由力偶，输入三个互相异面的空间力。

力	力分量 N	作用点 m
F1	(80, 0, 0)	(0, 1, 0)
F2	(0, 60, 0)	(0, 0, 1)
F3	(0, 0, 40)	(1, 0, 0)

输出量	主矢 R	主矩 MO
分量	(80, 60, 40) N	(-60, -40, -80) N·m
大小	107.703296 N	107.703296 N·m
方向角 °	(42.0311, 56.1455, 68.1986)	(123.855, 111.801, 137.969)

三个力对原点的矩分别为 (0,0,−80)、(−60,0,0)、(0,−40,0) N·m。主矢与主矩点积为 −10400 N²·m，故存在不能通过移动合力消去的轴向力偶。

$$\mathbf{A} = (-0.2758621, 0.3448276, 0.03448276)\ \text{m}$$

$$\mathbf{u} = (0.7427814, 0.557086, 0.3713907)$$

$$\mathbf{M}_{\parallel} = (-71.72414, -53.7931, -35.86207)\ \text{N·m}$$

$$h = -0.89655172\ \text{m}$$

中心轴参数方程为 P(t)=A+t u。h<0 表示轴上剩余力偶与合力反向，最简结果必须同时保留合力与力偶。以未舍入数值重构主矩，残差约为 1.00e-14 N·m。




图 5 空间力系及负螺距力螺旋

十 运行实例 纯力偶与平衡

等大反向力形成纯力偶

打开 examples/03_couple.json：F1=(100,0,0) N 作用于 (0,1,0) m，F2=(−100,0,0) N 作用于 (0,−1,0) m，O 为原点。两力等大反向但不共线。

$$\mathbf{R} = (0,0,0)\ \mathrm{N},\quad \mathbf{M}_O = (0,0,-200)\ \mathrm{N\cdot m}$$

主矢为零，方向未定义；主矩大小为 200 N·m，方向为 −Z，方向角为 (90°,90°,180°)。最简结果为自由力偶，没有固定作用点或作用线，更换简化点不改变该力偶矩。




图 6 等大反向非共线力的纯力偶结果

共线反向力形成平衡力系

打开 examples/05_equilibrium.json：F1=(100,0,0) N 作用于 (1,0,0) m，F2=(−100,0,0) N 作用于 (−1,0,0) m。两力共线，对原点的矩均为零。

$$\mathbf{R} = (0,0,0)\ \mathrm{N},\quad \mathbf{M}_O = (0,0,0)\ \mathrm{N\cdot m}$$

主矢和主矩均为零，二者方向均未定义，最简结果为平衡力系。该结果说明“等大反向”本身不足以判定平衡，还必须检查两力是否共线以及合力矩是否为零。




图 7 共线反向力的平衡结果

十一 结果验证与程序结论

自动化验证

2026 年 10 月 16 日重新执行项目测试，共 47 项通过。其中力学计算 24 项、项目文件与命令行 18 项、三维绘图 5 项；随机等效性测试包含固定种子的 250 组空间力系。

验证内容	核对依据
基本结果	四类最简结果、正负螺距及内置算例均与预期一致。
等效重构	检查轴上不同点处的合力与保留力偶能否重构原主矩。
坐标变化	核对平移与旋转变换后主矢、主矩和作用线的对应关系。
边界与输入	检查空力系、零向量、极小方向量、非有限数与溢出处理。
读写与图形	检查 JSON 往返、批处理报告、标签避让及 SVG XML 有效性。

更换简化点的核对

在第八节平行力算例中，将简化点从 O=(0,0,0) 改为 O′=(1,1,0) m。程序计算主矢仍为 (0,0,−300) N，而主矩变为 (300,300,0) N·m。

$$\mathbf{M}_{O'} = (0,600,0) - (1,1,0) \times (0,0,-300)$$

$$\mathbf{M}_{O'} = (300,300,0)\ \text{N·m}$$

新的合力作用线仍为 x=2 m、y=0。这说明主矩与简化点相关，而最终合力作用线保持不变；一般情况下，程序给出的最近点 A 可以沿同一作用线变化。

结论与使用范围

程序完成了从载荷输入、主矢主矩计算、最简力系判定到三维展示的全过程。实例表明，平行力可以简化为具有确定作用线的合力，非共线反向力可以形成纯力偶，而一般空间力系可能需要保留平行自由力偶。

程序使用双精度浮点运算。对于接近零值阈值或数量级相差很大的输入，应结合输入精度、显示残差与单位理解结果。三维图采用正交投影和示意箭长，实际数值应以结果区和导出的计算报告为准。

十二 数据格式与复现资料

JSON 项目格式

下例表示一个作用于 (0,1,0) m、沿 +X 的 80 N 集中力。项目将各种方向输入统一保存为三个分量，schema_version 固定为整数 1。

```
{
  "schema_version": 1,
  "units": {"force": "N", "length": "m"},
  "origin": [0, 0, 0],
  "free_couple": [0, 0, 0],
  "forces": [
    {"name": "F1", "components": [80, 0, 0],
     "point": [0, 1, 0]}
  ]
}
```

各向量必须是三个有限实数组成的 JSON 数组。不能用字符串、布尔值或数字字符串代替数值。free_couple 可省略，默认取零；无集中力时 forces 可以为空数组。

文件与复现命令

项目入口为 app.py，力学计算与绘图分别由 mechanics.py 和 scene.py 完成。examples 目录提供六个 JSON 算例；test_*.py 文件为自动化测试。

```
python app.py
python app.py --input examples/01_wrench.json --report report.txt
python -m unittest -v
python -m unittest -v test_mechanics.py test_app.py
```

第二行从保存的项目生成报告，不打开窗口。第三行运行全部测试，绘图测试需要显示环境。第四行仅验证计算和文件批处理，可用于不提供图形显示的环境。

参考资料

[1] Engineering Statics. Statically Equivalent Systems, Section 4.7. https://engineeringstatics.org/statically-equivalent-systems.html，访问日期 2026 年 10 月 16 日。

[2] 空间任意力系简化程序源码及算例，提交 3785ddd。https://github.com/Monkey-cmd/force-system-3d，仓库为私有，查看需要相应权限。