

## 미확인 도착지


| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출    | 정답    |
|-------|--------|-------|-------|
| 3 초   | 256 MB | 35513 | 10722 |

### 문제

(취익)B100 요원, 요란한 옷차림을 한 서커스 예술가 한 쌍이 한 도시의 거리들을 이동하고 있다. 너의 임무는 그들이 어디로 가고 있는지 알아내는 것이다. 우리가 알아낸 것은 그들이 s지점에서 출발했다는 것, 그리고 목적지 후보들 중 하나가 그들의 목적지라는 것이다. 그들이 급한 상황이기 때문에 목적지까지 우회하지 않고 최단거리로 갈 것이라 확신한다. 이상이다. (취익)

어휴! (요란한 옷차림을 했을지도 모를) 듀오가 어디에도 보이지 않는다. 다행히도 당신은 후각이 개만큼 뛰어나다. 이 후각으로 그들이 g와 h 교차로 사이에 있는 도로를 지나갔다는 것을 알아냈다.

이 듀오는 대체 어디로 가고 있는 것일까?



예제 입력의 두 번째 케이스를 시각화한 것이다. 이 듀오는 회색 원에서 두 검은 원 중 하나로 가고 있고 점선으로 표시된 도로에서 냄새를 맡았다. 따라서 그들은 6으로 향하고 있다.

### 입력

첫 번째 줄에는 테스트 케이스의  $T(1 \leq T \leq 100)$ 가 주어진다. 각 테스트 케이스마다

- 첫 번째 줄에 3개의 정수  $n, m, t$  ( $2 \leq n \leq 2\,000$ ,  $1 \leq m \leq 50\,000$  and  $1 \leq t \leq 100$ )가 주어진다. 각각 교차로, 도로, 목적지 후보의 개수이다.

- 두 번째 줄에 3개의 정수  $s, g, h$  ( $1 \leq s, g, h \leq n$ )가 주어진다.  $s$ 는 예술가들의 출발 지이고,  $g, h$ 는 문제 설명에 나와 있다. ( $g \neq h$ )
- 그 다음  $m$ 개의 각 줄마다 3개의 정수  $a, b, d$  ( $1 \leq a < b \leq n$  and  $1 \leq d \leq 1\,000$ )가 주어진다.  $a$ 와  $b$  사이에 길이  $d$ 의 양방향 도로가 있다는 뜻이다.
- 그 다음  $t$ 개의 각 줄마다 정수  $x$ 가 주어지는데,  $t$ 개의 목적지 후보들을 의미한다. 이  $t$ 개의 지점들은 서로 다른 위치이며 모두  $s$ 와 같지 않다.

교차로 사이에는 도로가 많아봐야 1개이다.  $m$ 개의 줄 중에서  $g$ 와  $h$  사이의 도로를 나타낸 것이 존재한다. 또한 이 도로는 목적지 후보들 중 적어도 1개로 향하는 최단 경로의 일부이다.

출력

테스트 케이스마다

- 입력에서 주어진 목적지 후보들 중 불가능한 경우들을 제외한 목적지들을 공백으로 분리시킨 오름차순의 정수들로 출력한다.

예제 입력 1

2

5 4 2

1 2 3

1 2 6

2 3 2

3 4 4

3 5 3

5

4

6 9 2

2 3 1

1 2 1

1 3 3

2 4 4

2 5 5

3 4 3

3 6 2

4 5 4

4 6 3

5 6 7

5

6

예제 출력 1

4 5

6

출처



[ICPC](#) > [Regionals](#) > [Europe](#) > [Northwestern European Regional Contest](#) > [Benelux Algorithm Programming Contest](#) > [BAPC 2013 D번](#)

- 문제를 번역한 사람: [ZZangZZang](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [degurij](#), [eldpswp99](#), [ksaid0203](#), [robin252525](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최단 경로](#)
- [데이크스트라](#)