

# 1 Teilchen mit Spin im magnetischen Feld

Betrachten Sie ein Elektron mit einem Magnetischen Moment  $\vec{\mu}$

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{mc}\vec{S} = -\frac{e}{mc}\frac{\hbar}{2}\sigma \quad (e > 0)$$

Das Teilchen ruht in einem homogenen magnetischen Feld  $\vec{B} = B_0(\vec{e}_x + \sqrt{3}\vec{e}_y)$ . Am Anfang bei  $t = 0$  befindet sich das Elektron in einem Zustand, in dem die Wahrscheinlichkeit einen Wert  $\frac{\hbar}{2}$  für die  $z$ -Komponente des Spins  $\hat{S}_z$  zu messen  $P_z\left(\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{1}{2}$  ist, d.h.  $P_z\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{1}{2}$ .

- a) Schreiben Sie den Anfangszustand  $\psi$  als Überlagerung von Eigenzuständen der Paulimatrix  $\sigma_z$ . Zur Erinnerung: Die Eigenwerte und Eigenvektoren von  $\sigma_z$  lauten:

$$\lambda_1 = 1, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_2 = -1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Lösung: Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit,  $\frac{\hbar}{2}$  in  $z$ -Richtung zu messen, berechne deshalb die Eigenwerte und Eigenvektoren von  $\sigma_z$  (sind bereits gegeben!). Die Eigenvektoren repräsentieren jeweils den Zustand „Spin  $\pm\frac{\hbar}{2}$ “ in  $z$ -Richtung.  $\psi$  ist die normierte Superposition der Eigenvektoren (=Zustände) gewichtet mit den Wahrscheinlichkeiten

$$\begin{aligned} \psi' &= \frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2 \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Normiere  $\psi'$  zu  $\psi$ :

$$\psi = \frac{\psi'}{\|\psi'\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- b) Der Hamiltonoperator des Systems lautet  $\hat{H} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ . Berechnen Sie die Eigenvektoren und die Eigenwerte (die Energien  $E_1, E_2$ ) von  $\hat{H}$ . Ist  $\psi$  ein stationärer Zustand? Begründen Sie.

Lösung:

$$\begin{aligned} \hat{H} &= -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \\ &= -\frac{e}{mc}\frac{\hbar}{2}\sigma B_0(\vec{e}_x + \sqrt{3}\vec{e}_z) \\ &= -\frac{e\hbar B_0}{2mc} \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \end{pmatrix} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \sqrt{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{e\hbar B_0}{2mc}(\sigma_x + \sqrt{3}\sigma_z) \\
&= \underbrace{-\frac{e\hbar B_0}{2mc}}_{=: \Lambda} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ 1 & -\sqrt{3} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Eigenwerte von  $\hat{H}$ :

$$\begin{vmatrix} \sqrt{3} - E & \Lambda \\ \Lambda & -\sqrt{3} - E \end{vmatrix} = (E^2 - \Lambda^2(1+3)) = E^2 - 4\Lambda^2 \stackrel{!}{=} 0 \\
\Rightarrow E_{1,2} = \pm 2\Lambda = \mp \frac{e\hbar B_0}{mc}$$

Eigenvektoren von  $\hat{H}$ :

$$\lambda_1 = 2\Lambda:$$

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} -2\Lambda & (1-i\sqrt{3})\Lambda \\ (1+i\sqrt{3})\Lambda & -2\Lambda \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -2 & 1-i\sqrt{3} \\ 2 & \frac{-2\cdot 2}{1+i\sqrt{3}} \end{pmatrix} \\
&\rightsquigarrow \begin{pmatrix} -2 & 1-i\sqrt{3} \\ 0 & \frac{(1-i\sqrt{3})(1+i\sqrt{3})}{(1+i\sqrt{3})} - \frac{4}{1+i\sqrt{3}} \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{4}{(1+i\sqrt{3})} - \frac{4}{1+i\sqrt{3}} \end{pmatrix} \\
&\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow -1\text{-Trick: Eigenraum zu } \lambda_1 = 2 \text{ ist } \left[ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right]. \text{ Wähle } v_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda_2 = -2\Lambda:$$

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} 2\Lambda & (1-i\sqrt{3})\Lambda \\ (1+i\sqrt{3})\Lambda & 2\Lambda \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 1-i\sqrt{3} \\ -2 & \frac{-2\cdot 2}{1+i\sqrt{3}} \end{pmatrix} \\
&\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 1-i\sqrt{3} \\ 0 & \frac{-4}{1+i\sqrt{3}} + \frac{(1-i\sqrt{3})(1+i\sqrt{3})}{1+i\sqrt{3}} \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow -1\text{-Trick: Eigenraum zu } \lambda_2 = -2 \text{ ist } \left[ \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right]. \text{ Wähle } v_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$\psi$  ist nicht stationär, da  $\psi$  nicht das vielfache eines Eigenvektors ist.

c) Schreiben Sie  $\psi$  als Linearkombination der Eigenzustände von  $\hat{H}$  um.

Lösung:

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha v_1 + \beta v_2$$

$$\begin{aligned}
&= \alpha \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Durch scharfes Hinsehen erkennt man (nicht wirklich...):

$$\alpha = \frac{3 + \sqrt{3}i}{4\sqrt{2}}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{3}i}{4\sqrt{2}}$$

- d) Bestimmen Sie nun die Wahrscheinlichkeit in dem Zustand  $\psi$  die Energie  $E_1$  und  $E_2$  zu messen. Geben Sie anschließend den Mittelwert der Energie

$$\langle E \rangle = \psi^\dagger H \psi$$

Lösung: Wahrscheinlichkeit im Zustand  $\psi$  Energie  $E_n$  zu messen ist