

2,000 patients
Sex-Specific Cohort

34000.0 [17000.0, 71000.0]	income, Median [IQR]
66.0 [56.0, 75.0]	age, Median [IQR]
80.2 ± 10.0	dbp, Mean ± SD
129.3 ± 19.3	sbp, Mean ± SD
28.1 ± 6.1	bmi, Mean ± SD
49.0	sex, %
50.9	

116 patients excluded for
Missing demographics

sex, %: M
sex, %: F
Missing

1,884 patients
Step 1

SMD (0, 1)		
0.0	34000.0 [17000.0, 70000.0]	income, Median [IQR]
0.0	66.0 [56.0, 75.0]	age, Median [IQR]
0.0	80.2 ± 10.1	dbp, Mean ± SD
0.0	129.3 ± 19.3	sbp, Mean ± SD
0.0	28.1 ± 6.1	bmi, Mean ± SD
0	48.8	sex, %
	51.2	

197 patients excluded for
Age outside range 30-85

1,687 patients
Step 2

SMD (1, 2)		
0.0	35000.0 [18000.0, 71000.0]	income, Median [IQR]
-0.2	64.0 [55.0, 72.0]	age, Median [IQR]
0.0	80.2 ± 10.1	dbp, Mean ± SD
0.0	129.3 ± 19.4	sbp, Mean ± SD
0.0	28.1 ± 6.1	bmi, Mean ± SD
0	49.5	sex, %
	50.5	

337 patients excluded for
Missing vital measurements

1,350 patients
Step 3

SMD (2, 3)		
-0.0	35000.0 [18000.0, 68000.0]	income, Median [IQR]
0.0	64.0 [55.0, 72.0]	age, Median [IQR]
0.0	80.2 ± 10.1	dbp, Mean ± SD
0.0	129.3 ± 19.5	sbp, Mean ± SD
0.0	28.1 ± 6.0	bmi, Mean ± SD
0	49.9	sex, %
	50.1	

587 patients excluded for
No health conditions

763 patients
Step 4

SMD (3, 4)		
-0.0	33000.0 [18000.0, 70000.0]	income, Median [IQR]
0.0	65.0 [56.0, 73.0]	age, Median [IQR]
0.0	80.5 ± 9.8	dbp, Mean ± SD
-0.0	129.2 ± 19.1	sbp, Mean ± SD
0.1	28.4 ± 5.9	bmi, Mean ± SD
0	47.8	sex, %
	52.2	