
QCM · CONCOURS

Concours-Clinique-CHU-Tanger-Tetouan-Al-Hoceir

40 questions

Questions

1 Concernant le diagnostic de la Covid-19, quelles sont les affirmations fausses?

A	L'absence de symptômes élimine l'infection
B	Une PCR négative élimine l'infection
C	Un test rapide antigénique négatif élimine l'infection
D	La TDM thoracique normale élimine l'infection
E	Une sérologie négative élimine l'infection

2 Les deux signes cliniques les plus fréquents dans la Covid-19 sont

A	Anosmie
B	Agueusie
C	Fièvre
D	Diarrhée
E	Toux

3 Les critères d'alerte au cours de la surveillance des paramètres chez un patient infecté par la Covid-19 sont :

A	Pression artérielle à 100/60 mmhg
B	Température à 38°C
C	Saturation en oxygène à 94% en air ambiant
D	Fréquence cardiaque à 80 battements par minute
E	Fréquence respiratoire à 25 cycles par minute au repos

4 La prévention de la transmission de l'infection en milieu de soins repose sur.

- | | |
|---|--|
| A | Se laver fréquemment les mains |
| B | Maintenir une distance d'au moins 1 m |
| C | Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas d'éternuement |
| D | Porter un masque |
| E | Être vacciné contre le virus |

5 Les facteurs de risque d'une maladie Covid-19 grave sont.

- | | |
|---|---------------------------------|
| A | Age > 40 ans |
| B | Diabète compliqué |
| C | Indice de masse corporelle > 40 |
| D | Grossesse |
| E | Insuffisance rénale aigue |

6 Le malade nécessite une oxygénothérapie aux lunettes. Quel débit maximal est possible avec cette interface ?

- | | |
|---|---------|
| A | 3 L/min |
| B | 4 L/min |
| C | 5 L/min |
| D | 6 L/min |
| E | 7 L/min |

7 La levée de l'isolement après infection est autorisée après combien de jour du début des symptômes ?

A J7

B J10

C J14

D J21

E J28

8 Après le soin à un patient porteur de la Covid-19 dans quel ordre effectuez-vous les gestes suivants ? 1 Retirer la blouse. 2 Retirer les lunettes. 3 retirez les gants. 4 Effectuer l'hygiène des mains 5 Retirer le masque

A 12345

B 35421

C 23154

D 32154

E 42135

9 Les caractéristiques fondamentales d'un soin sont :

A Le respect de la dignité

B La satisfaction du patient

C L'éducation

D La sécurité

E La réactivité

10 La gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques :

A	Les déchets médicaux sont classés en quatre catégories
B	Ils doivent dès leurs générations être triés
C	ils doivent être stuqués dans le service puis triés immédiatement avant de les transportés
D	Le tri se fait selon les catégories et dans des sacs et receptions de couleurs différentes
E	Toutes les réponses sont fausses

11 Dans un ECG normal ACD

A	l'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes
B	l'onde P correspond à la repolarisation des oreillettes
C	Elle doit précéder chaque complexe QRS
D	Elle est négative en avR

! Options are limited to 4 | The prompt text 'ACD' suggests potential answers

12 Dans un ECG normal. (C)

A	La fréquence est comprise entre 40-120/mn
B	La fréquence est comprise entre 40-100/mn
C	La fréquence est comprise entre 60-100/mn
D	La fréquence est comprise entre 60-130/mn

13 Dans un ECG normal. (ABC D)

A	tous les incidents électriques doivent être négatifs en avR
B	L'onde P sinusale est positive en DI-DII
C	l'onde R pousse de façon harmonieuse de V1 à V6
D	Chaque QRS est précédé d'une seule onde P

14 Dans un ECG normal (A)

A	L'intervalle P-R (ou P-Q, a une durée constante (0,12 à 0,20 s)
B	L'intervalle P-R (ou P-Q, a une durée constante (0,10 à 0,20 s)
C	L'intervalle P-R (ou P-Q, a une durée constante (0,20 à 0,40 s)
D	L'intervalle P-R (ou P-Q, a une durée constante (0,20 à 0,50 s)

15 L'onde T. (BCD)

A	Traduit la repolarisation auriculaire
B	Est précédé du segment ST
C	Est de morphologie asymétrique
D	Est négative en avR

16 Le complexe QRS. (AB)

A	Correspond à la dépolarisation ventriculaire
B	Est d'une durée inférieure à 0,12 s
C	Est toujours à prédominance positive
D	Est toujours à prédominance négative

17 L'oedème aigu pulmonaire (ABD)

A	Se manifeste par une détresse respiratoire aiguë
B	Est une manifestation d'insuffisance cardiaque gauche
C	Survient à l'effort
D	Peut s'accompagner d'hémoptysie

18 L'orthopnée (CD)

A	Survient à l'orthostatisme
B	Survient à l'effort
C	Survient en décubitus
D	Est un signe d'insuffisance cardiaque

19 Un souffle cardiaque évoque en 1er lieu (B)

A	Une insuffisance cardiaque
B	Une valvulopathie
C	Une péricardite
D	Un infarctus du myocarde

20 A quel (s) diagnostic(s) faut-il penser en premier devant un patient de 65 ans qui consulte pour une douleur thoracique aiguë ? (ABCD)

A	Un infarctus du myocarde
B	Une dissection aortique
C	Une Embolie pulmonaire
D	Une Péricardite aiguë

21 Parmi ces choix, qu'est-ce qu'on entend par produits sanguins labiles (PSL) ?

A	Les culots globulaires
B	Les culots plaquettaires
C	Les facteurs anti hémophiliques
D	Le plasma frais congelé

22 Quel est le rôle de l'infirmier en cas de demande de PSL ?

- A Remplir la demande des PSL
- B Valider la demande des PSL
- C Prélever le malade pour demande de PSL
- D Envoyer la demande de PSL

23 Quel est le rôle de l'infirmier après la réception des PSL de la banque de sang ?

- A Réceptionner les PSL
- B Informer le médecin de la qualité des PSL
- C Remplir la fiche d'anomalies en cas de constatation d'une anomalie qualitative des PSL reçus
- D Rien, puisque la réception des PSL relève des fonctions du médecin

24 Quel est le rôle de l'infirmier avant l'acte transfusionnel ?

- A Vérifier la concordance entre le groupage du malade et celui du PSL reçu
- B Vérifier la concordance entre l'identité du malade et l'identité du receveur pour lequel le PSL a été livré
- C Réaliser la carte de contrôle pré-transfusionnel
- D Transfuser directement les PSL, puisque les vérifications relèvent des fonctions du médecin

25 en cas de réception de 3 CGR pour le même malade, comment réaliser la carte de contrôle pré-transfusionnel ?

- A Réaliser la carte au lit du malade
- B Réaliser la carte pour tous les CGR reçus dans la salle des soins
- C Réaliser la carte pour le CGR à transfuser (un par un)
- D L'acte transfusionnel est assuré par l'infirmier qui a réalisé la carte

26 Quel est le rôle de l'infirmier lors de l'acte transfusionnel ?

- A Valider l'acte transfusionnel
- B Réaliser l'acte transfusionnel
- C Surveiller la transfusion
- D Avertir le médecin en cas d'incident transfusionnel

27 Quelles sont les éléments qu'il faut surveiller lors de l'acte transfusionnel ?

- A L'apparition de signes rapportés par le malade au cours ou au décours immédiat de la transfusion
- B L'état hémodynamique toutes les 10 min au cours des 30 premières minutes puis de manière espacée
- C L'apparition de fièvre
- D Rien, puisque la surveillance de l'acte transfusionnel relève des fonctions du médecin

28 Quelle est la durée de transfusion maximale qu'il ne faut pas dépasser pour un culot globulaire ?

- A 30 min
- B 1 heure
- C 1h 30 min
- D 2 heures

29 En cas de transfusion de plusieurs types de produits sanguins labiles, quel est l'ordre qu'il faut respecter ?

- A CGR puis CPS puis PFC décongelés
- B CPS puis PFC décongelés puis CGR
- C PFC décongelés puis CPS puis CGR
- D CPS puis CGR puis PFC décongelés

30 En cas d'incident transfusionnel, que doit faire l'infirmier ?

- A Arrêter la transfusion et avertir le médecin
- B Arrêter la transfusion, avertir le médecin et prendre les constantes
- C Avertir le médecin
- D Rien, puisque la surveillance de l'acte transfusionnel relève des fonctions du médecin

31 La rétention urinaire complète et aigue :

- A Est Une urgence urologique
- B Nécessite un traitement médicamenteux
- C Se manifeste par une douleur avec impossibilité d'uriner
- D Se manifeste par une impossibilité d'uriner sans douleur
- E Nécessite la mise en place d'un drainage vésicale

32 Le cancer urologique le plus fréquent chez l'homme de plus de 50 ans :

- A Cancer de vessie
- B Cancer du rein
- C Cancer de l'urètre
- D Cancer de prostate
- E Cancer testiculaire

33 L'hématurie :

- A Est la présence du sang dans le sperme
- B Est un saignement urétral en dehors des mictions
- C Est la présence du sang dans les urines
- D Peut être en rapport avec un cancer de vessie
- E Peut être en rapport avec une infection urinaire

34 L'hypertension artérielle peut être secondaire à :

A	Une maladie rénale
B	Une tumeur des glandes surrénales
C	Un cancer du rein
D	Un cancer de vessie
E	Une infection urinaire

35 Le diagnostic d'une infection urinaire est confirmé par :

A	La numération formule sanguine
B	L'ionogramme complet
C	La cytologie urinaire
D	La bandelette urinaire
E	L'examen cyto bactériologique des urines

36 Le sondage vésical :

A	Est un geste simple ne nécessitant pas de précautions particulières
B	Est indiqué chez tout malade ayant des difficultés à uriner
C	Est indiqué en cas de rétention complète d'urine
D	Le matériel utilisé n'est pas obligatoirement stérile
E	L'infection urinaire en est une complication majeure

37 La principale cause du cancer de la vessie est :

A	L'alcool
B	La consommation excessive des viandes rouges
C	Le tabac
D	Infection urinaire
E	Le diabète

38 Les patients porteurs de sondes vésicales à demeure :

A	Ne nécessitent aucune surveillance particulière
B	Les soins de sonde sont indispensables chez eux
C	Ont un risque important d'infection urinaire
D	Nécessitent un changement de sonde régulièrement
E	Le changement de sonde ne nécessite pas obligatoirement des règles d'asepsie

39 La fièvre associée à une douleur lombaire chez un patient porteur d'une lithiase rénale :

A	Il s'agit fort probablement d'une infection rénale
B	La situation clinique n'est pas inquiétante
C	Il s'agit d'une urgence thérapeutique
D	Nécessite un prélèvement urinaire pour étude bactériologique
E	Le traitement repose sur l'administration du seul paracétamol

40 Suite à une intervention chirurgicale, un patient présente une hypotension sévère, pouls faiblement perceptible, des sueurs et une froideur des extrémités :

A	Il s'agit d'un état de choc
B	Ce tableau clinique peut être en rapport avec une hémorragie
C	Il peut s'agir d'un état de choc septique
D	La transfusion est obligatoire dans tous les cas
E	Nécessite une prise en charge en réanimation.