
QCM • CONCOURS

Concours de Recrutement des Infirmiers Diplômés d'Etat du Deuxième Grade - Session du 13 Février 2010

Technicien de Radiologie

Specialite : Technicien de Radiologie

Annee : 2010

9 questions

Questions

1 Le cliché d'abdomen sans préparation (A.S.P) de face couché avec rayon vertical permet de :

A	Voir des lithiases radio opaques
B	Un adénome prostatique
C	Un épanchement gazeux intra-abdominal
D	Des images hydro-aériques
E	Des calcifications

2 La présence d'images hydro-aériques sur un A.S.P debout avec R.H est secondaire à :

A	Une cholécystite aigue
B	Une occlusion mécanique
C	Un iléus biliaire
D	Un trouble de résorption (Diarrhée)

3 Le cliché standard pulmonaire de face en B.T :

A	Ne nécessite pas l'inspiration forcée
B	Est réalisé à 70KV-8mAs
C	Le médiastin est bien étudié
D	La D.F.P est de 80cm
E	Peut étudier le gril costal

4 Le cliché pulmonaire en incidence de Muller (décubitus latéral) :

- | | |
|---|---|
| A | Est moins irradiant |
| B | Est réalisé chez les patients en mauvais état général |
| C | Mobilise un épanchement pleural |
| D | Facilite le diagnostic de la tuberculose |
| E | Nécessite un portique vertical |

5 Sur le cliché pulmonaire de face en expiration forcée :

- | | |
|---|---|
| A | Les clavicules sont asymétriques |
| B | Les coupes diaphragmatiques sont hautes |
| C | Les bases pulmonaires sont surexposées |
| D | Le médiastin est élargi |
| E | Voir un pneumothorax |

6 Parmi les incidences radiologiques suivantes, lesquelles permettent d'étudier seulement les deux premières vertèbres cervicales :

- | | |
|---|---|
| A | Incidence du rachis cervical de face |
| B | Incidence du rachis cervical de profil |
| C | Incidence du rachis cervical en obliques antéropostérieur droit et gauche |
| D | Incidence de la charnière cervico-occipital de face |
| E | Incidence de la charnière cervico-occipital de profil |

7 Pour dégager l'articulation radio-scaphoïdienne, on choisie la/ les incidence(s) radiologique(s) suivantes :

A	Schreeck 1
B	Schreeck 2
C	Poignet de profil
D	Oblique interne de poignet

8 Une épaule traumatisée nécessite :

A	Face de l'épaule en rotation externe
B	Face de l'épaule en rotation neutre
C	Profil de l'épaule de haut en bas
D	Incidence de Bernageau

9 Parmi les incidences radiologiques suivantes, lesquelles faut il réaliser chez un patient présentant une fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus :

A	Profil du coude main en demi pronation
B	Profil de coude main en pronation
C	Face du coude main en supination
D	Face du coude main en pronation

Notes d'extraction

- Question 16 was omitted because it only has 2 options and schema requires 4-5.