

Họ và tên : Nguyễn Từ Huy.

MSSV: 1711127.

Bài kiểm tra giữa kì môn Phương pháp sai phân hữu hạn (Finite Difference Method).

**Question :**

Let  $\Omega = (0,1) \subset \mathbb{R}$  and  $f \in L^2(\Omega)$ .

$$-u_{xx} = f(x) \text{ in } \Omega$$

subject to a Dirichlet boundary condition:

$$u(0) = 0, \quad u(1) = 0$$

1. How to discretize the previous system equation by finite difference method with non-uniform mesh.
2. Prove the convergence of scheme.

**Answer :**

Xét bài toán trên miền  $\Omega$  được chia thành  $N+1$  điểm  $x_i$  (với  $i = \overline{0, N}$ ) không đều nhau

Đặt:

$$\begin{aligned} h_i &= x_{i+1} - x_i \\ h_{i-1} &= x_i - x_{i-1} \end{aligned}$$

Ta xấp xỉ giá trị hàm tại các điểm  $x_i$

$$u_i \simeq u(x_i) \quad , \forall i = \overline{0, N}$$

Sử dụng biến đổi Taylor tại  $x_i$  ta có:

Khi đó:

$$u_{i+1} = u_i + u'_i h_i + \frac{1}{2} u''_i h_i^2 + \frac{1}{6} u^{(3)}_i h_i^3 + O(h_i^4) \quad (1)$$

$$u_{i-1} = u_i - u'_i h_{i-1} + \frac{1}{2} u''_i h_{i-1}^2 - \frac{1}{6} u^{(3)}_i h_{i-1}^3 + O(h_{i-1}^4) \quad (2)$$

Nhân phương trình (1) cho  $h_{i-1}$ , phương trình (2) cho  $h_i$  ta được:

$$u_{i+1} h_{i-1} = u_i h_{i-1} + u'_i h_i h_{i-1} + \frac{1}{2} u''_i h_i^2 h_{i-1} + \frac{1}{6} u^{(3)}_i h_i^3 h_{i-1} + O(h_i^4) h_{i-1} \quad (1')$$

$$u_{i-1} h_i = u_i h_i - u'_i h_{i-1} h_i + \frac{1}{2} u''_i h_{i-1}^2 h_i - \frac{1}{6} u^{(3)}_i h_{i-1}^3 h_i + O(h_{i-1}^4) h_i \quad (2')$$

Cộng (1') và (2') ta được:

$$u_{i+1} h_{i-1} + u_{i-1} h_i = u_i (h_i + h_{i-1}) + \frac{1}{2} u''_i h_i h_{i-1} (h_i + h_{i-1}) + \frac{1}{6} u^{(3)}_i h_{i-1} h_i (h_i^2 - h_{i-1}^2) + O(h_{i-1} h_i (h_i^3 - h_{i-1}^3)).$$

Giả sử  $h = \max(h_i)$

Suy ra:

$$\begin{aligned}
u_i'' &= 2 \times \frac{u_{i+1}h_{i-1} - u_i(h_i + h_{i-1}) + u_{i-1}h_i}{h_i h_{i-1}(h_i + h_{i-1})} - \frac{1}{6} \frac{u_i^{(3)} h_{i-1} h_i (h_i^2 - h_{i-1}^2)}{h_i h_{i-1}(h_i + h_{i-1})} + O(h^2). \\
u_i'' &= \frac{2}{h_i(h_i + h_{i-1})} u_{i+1} - \frac{2}{h_i h_{i-1}} u_i + \frac{2}{h_{i-1}(h_i + h_{i-1})} u_{i-1} - \frac{1}{6} u_i^{(3)} (h_i - h_{i-1}) + O(h^2) \\
u_i'' &= \frac{2}{h_i(h_i + h_{i-1})} u_{i+1} - \frac{2}{h_i h_{i-1}} u_i + \frac{2}{h_{i-1}(h_i + h_{i-1})} u_{i-1} + O(h).
\end{aligned} \tag{*}$$

Từ đề bài, ta có:

$$-u_i'' = f(x_i) \quad , \forall i = \overline{1, N-1}$$

Sử dụng xấp xỉ ở trên ta có:

$$-\frac{2}{h_i(h_i + h_{i-1})} u_{i+1} + \frac{2}{h_i h_{i-1}} u_i - \frac{2}{h_{i-1}(h_i + h_{i-1})} u_{i-1} = f_i \quad , \forall i = \overline{1, N-1}$$

với  $f_i = f(x_i) \quad , \forall i = \overline{1, N-1}$

Sử dụng điều kiện biên Dirichlet, ta cũng có:

$$u_0 = 0 \quad \text{and} \quad u_N = 0$$

Khi đó ta có hệ xấp xỉ tuyến tính sau:

$$\begin{cases}
i = 0, u_0 & = 0 \\
i = 1, -\frac{2}{h_0(h_1 + h_0)} u_0 + \frac{2}{h_1 h_0} u_1 - \frac{2}{h_1(h_1 + h_0)} u_2 & = f_1 \\
i = 2, -\frac{2}{h_1(h_2 + h_1)} u_1 + \frac{2}{h_2 h_1} u_2 - \frac{2}{h_2(h_2 + h_1)} u_3 & = f_2 \\
\vdots & \\
i = N-1, -\frac{2}{h_{N-2}(h_{N-1} + h_{N-2})} u_{N-2} + \frac{2}{h_{N-1} h_{N-2}} u_{N-1} - \frac{2}{h_{N-1}(h_{N-1} + h_{N-2})} u_N & = f_{N-1} \\
i = N, u_N & = 0
\end{cases}$$

Ma trận dạng  $AU = F$

Trong đó  $A \in \mathbb{R}^{N+1} \times \mathbb{R}^{N+1}$  và  $U, F \in \mathbb{R}^{N+1}$  xác định bởi:

$$A = \begin{bmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
-\frac{2}{h_0(h_1+h_0)} & \frac{2}{h_1 h_0} & -\frac{2}{h_1(h_1+h_0)} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
0 & -\frac{2}{h_1(h_2+h_1)} & \frac{2}{h_2 h_1} & -\frac{2}{h_2(h_2+h_1)} & \dots & 0 & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -\frac{2}{h_{N-3}(h_{N-2}+h_{N-3})} & \frac{2}{h_{N-2} h_{N-3}} & \frac{2}{h_{N-2}(h_{N-2}+h_{N-3})} \\
0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\frac{2}{h_{N-2}(h_{N-1}+h_{N-2})} & \frac{2}{h_{N-1} h_{N-2}} \\
0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{N-2} \\ u_{N-1} \\ u_N \end{bmatrix}, F = \begin{bmatrix} 0 \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{N-2} \\ f_{N-1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Đánh giá một chút về bậc hội tụ:  
Từ phương trình (\*)

$$u_i'' = \frac{2}{h_i(h_i + h_{i-1})}u_{i+1} - \frac{2}{h_i h_{i-1}}u_i + \frac{2}{h_{i-1}(h_i + h_{i-1})}u_{i-1} - \frac{1}{6}u_i^{(3)}(h_i - h_{i-1}) + O(h^2) \quad (*)$$

Nếu lưới gần đều, tức là hiệu  $h_i - h_{i-1} \approx 0$  tại hầu hết i.

Thì bậc hội tụ của bài toán sẽ là bậc 2.

Điều này có thể thấy qua bài tập 1b:

Đoạn  $[0, 1]$  được chia thành các điểm  $x_i = 1 - \cos(\frac{\pi i}{2N})$ , khi lấy N lớn thì khoảng cách giữa các điểm gần như cách đều nhau nên bài toán này mặc dù chia theo lưới không đều nhưng vẫn hội tụ bậc 2.

Kế tiếp ta sẽ đánh giá "Stability", "Consistency" để suy ra "Convergence".

#### •Stability

Để tiện theo dõi ta viết lại:

$$\begin{cases} \frac{2}{h_i(h_i + h_{i-1})}u_{i+1} - \frac{2}{h_i h_{i-1}}u_i + \frac{2}{h_{i-1}(h_i + h_{i-1})}u_{i-1} = -f_i, \forall i = \overline{1, N-1} \\ u_0 = 0 \\ u_N = 0 \\ h_i = x_{i+1} - x_i, \forall i = 0, \dots, N-1 \end{cases}$$

Ta có nhận xét:

$$\sum_{i=0}^{N-1} h_i = x_N - x_0 = b - a = 1$$

Biến đổi phương trình đầu tiên:

$$\begin{aligned} \frac{2}{h_i(h_i + h_{i-1})}u_{i+1} - \frac{2}{h_i h_{i-1}}u_i + \frac{2}{h_{i-1}(h_i + h_{i-1})}u_{i-1} &= -f_i, \forall i = \overline{1, N-1} \\ \frac{2}{h_i}u_{i+1} - \frac{2(h_i + h_{i-1})}{h_i h_{i-1}}u_i + \frac{2}{h_{i-1}}u_{i-1} &= -f_i(h_i + h_{i-1}), \forall i = \overline{1, N-1} \\ \frac{1}{h_i}(u_{i+1} - u_i) - \frac{1}{h_{i-1}}(u_i - u_{i-1}) &= -f_i \frac{(h_i + h_{i-1})}{2}, \forall i = \overline{1, N-1} \end{aligned}$$

Nhân 2 vế phương trình với  $u_i$  rồi lấy tổng từ 1 tới N-1 ta được:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{N-1} \left[ \frac{(u_{i+1} - u_i)u_i}{h_i} - \frac{(u_i - u_{i-1})u_i}{h_{i-1}} \right] &= - \sum_{i=1}^{N-1} \left[ f_i u_i \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right] \\ \sum_{i=1}^{N-1} \left[ \frac{(u_{i+1} - u_i)u_i}{h_i} \right] - \sum_{i=1}^{N-1} \left[ \frac{(u_i - u_{i-1})u_i}{h_{i-1}} \right] &= - \sum_{i=1}^{N-1} \left[ f_i u_i \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right] \\ \sum_{i=1}^{N-1} \left[ \frac{(u_{i+1} - u_i)u_i}{h_i} \right] - \sum_{i=0}^{N-2} \left[ \frac{(u_{i+1} - u_i)u_{i+1}}{h_i} \right] &= - \sum_{i=1}^{N-1} \left[ f_i u_i \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right] \end{aligned}$$

Vì  $u_0 = 0$  và  $u_N = 0$  nên:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{N-1} \left[ \frac{(u_{i+1} - u_i)u_i}{h_i} \right] - \sum_{i=0}^{N-1} \left[ \frac{(u_{i+1} - u_i)u_{i+1}}{h_i} \right] &= - \sum_{i=1}^{N-1} \left[ f_i u_i \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right] \\
\sum_{i=0}^{N-1} \left[ \frac{(u_{i+1} - u_i)u_i}{h_i} - \frac{(u_{i+1} - u_i)u_{i+1}}{h_i} \right] &= - \sum_{i=1}^{N-1} \left[ f_i u_i \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right] \\
\sum_{i=0}^{N-1} \left[ \frac{(u_{i+1} - u_i)^2}{h_i} \right] &= \sum_{i=1}^{N-1} \left[ f_i u_i \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right] \quad (**)
\end{aligned}$$

Ta định nghĩa chuẩn rời rạc  $L_{h_i}^2$

$$\|u\|_{2,h_i}^2 = \sum_{i=1}^{N-1} \left[ u_i^2 \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right]$$

Ta định nghĩa chuẩn rời rạc  $H_{h_i}^1$

$$\|u\|_{1,h_i}^2 = \sum_{i=0}^{N-1} \left[ \frac{(u_{i+1} - u_i)^2}{h_i} \right]$$

Áp dụng bất đẳng thức Holder, ta được:

$$\sum_{i=1}^{N-1} \left[ f_i u_i \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right] \leq \left[ \sum_{i=1}^{N-1} f_i^2 \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right]^{1/2} \left[ \sum_{i=1}^{N-1} u_i^2 \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right]^{1/2} = \|f\|_{2,h_i} \|u\|_{2,h_i}$$

Mặt khác, tồn tại hằng số C dương sao cho:

$$\|u\|_{2,h_i}^2 \leq C \|u\|_{1,h_i}^2$$

Thật vậy,

Với  $u_0 = 0$

$$u_i = \sum_{i'=0}^i \left[ \frac{(u_{i'+1} - u_{i'})}{h_{i'}} h_i' \right]$$

Suy ra,

$$u_i^2 \leq \sum_{i'=0}^i h_i' \sum_{i'=0}^i \left[ \frac{(u_{i'+1} - u_{i'})^2}{h_i'} \right] \leq (x_N - x_0) \sum_{i'=0}^{N-1} \left[ \frac{(u_{i'+1} - u_{i'})^2}{h_i'} \right] = 1. \|u\|_{1,h_i}^2 = \|u\|_{1,h_i}^2$$

Do đó

$$\|u\|_{2,h_i}^2 = \sum_{i=1}^{N-1} \left[ u_i^2 \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right] \leq \sum_{i=1}^{N-1} \left[ \|u\|_{1,h_i}^2 \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right] \leq \|u\|_{1,h_i}^2 \sum_{i=1}^{N-1} \left[ \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right] \leq \|u\|_{1,h_i}^2$$

Vì:

$$\sum_{i=1}^{N-1} \left[ \frac{(h_i + h_{i-1})}{2} \right] = \frac{\sum_{i=1}^{N-1} h_i + \sum_{i=1}^{N-1} h_{i-1}}{2} = \frac{\sum_{i=1}^{N-1} h_i + \sum_{i=0}^{N-2} h_i}{2} = \frac{x_{N-1} - x_1 + x_{N-2} - x_0}{2} \leq x_N - x_0 = 1$$

Sử dụng điều đã chứng minh ta suy ra được:

$$\|u\|_{1,h_i} \leq \|f\|_{2,h_i}$$

### •Consistency

Trước tiên ta định nghĩa các toán tử:

$$L(\hat{u})(x_i) = -\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial x^2}(x_i)$$

$$L_{h_i}(\hat{u})(x_i) = -\left[ \frac{2}{h_i(h_i + h_{i-1})} \hat{u}(x_{i+1}) - \frac{2}{h_i h_{i-1}} \hat{u}(x_i) + \frac{2}{h_{i-1}(h_i + h_{i-1})} \hat{u}(x_{i-1}) \right]$$

Sử dụng giả thuyết cầu bài toán:

$$L(\hat{u})(x_i) = -\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial x^2}(x_i) = f(x_i)$$

Ta có:

$$\tau_i = L_{h_i}(\hat{u})(x_i) - f(x_i) = L_{h_i}(\hat{u})(x_i) - L(\hat{u})(x_i) = -\left[ \frac{2}{h_i(h_i + h_{i-1})} \hat{u}(x_{i+1}) - \frac{2}{h_i h_{i-1}} \hat{u}(x_i) + \frac{2}{h_{i-1}(h_i + h_{i-1})} \hat{u}(x_{i-1}) \right] + \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial x^2}(x_i)$$

Sử dụng khai triển Taylor, tồn tại  $\eta_i \in [x_{i-1}, x_{i+1}]$  sao cho:

$$-\left[ \frac{2}{h_i(h_i + h_{i-1})} \hat{u}(x_{i+1}) - \frac{2}{h_i h_{i-1}} \hat{u}(x_i) + \frac{2}{h_{i-1}(h_i + h_{i-1})} \hat{u}(x_{i-1}) \right] + \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial x^2}(x_i) = -\frac{h_i - h_{i-1}}{6} \frac{\partial^3 \hat{u}}{\partial x^3}(\eta_i)$$

Suy ra:

$$\tau_i = -\frac{h_i - h_{i-1}}{6} \frac{\partial^3 \hat{u}}{\partial x^3}(\eta_i) = -\frac{h_i - h_{i-1}}{6} \frac{\partial f}{\partial x}(\eta_i)$$

Suy ra:

$$\|\tau\|_{2,h_i} \leq \left\| \frac{h_i - h_{i-1}}{6} \right\|_{2,h_i} \left\| \frac{\partial f}{\partial x}(\eta_i) \right\|_{2,h_i}$$

### •Convergence

Từ những chứng minh trên ta suy ra:

$$\|\hat{u} - u\|_{1,h_i}^2 \leq \|\tau\|_{2,h_i} \leq \left\| \frac{h_i - h_{i-1}}{6} \right\|_{2,h_i} \left\| \frac{\partial f}{\partial x}(\eta_i) \right\|_{2,h_i}$$

Vậy khi những  $h_i$  tiến dần về 0 thì nghiệm chính xác  $u$  cũng tiến về nghiệm xấp xỉ  $\hat{u}$