
Khôlles : Fin de la Réduction

- 16 - 20 Octobre 2023 -

Sommaire

1	Questions de Cours - Tout groupe	1
1.1	Si deux endomorphismes commutent, le noyau, l'image et les s.e.p. de l'un sont stables par l'autre. (démonstration)	1
1.2	En dimension finie, tout endomorphisme admet un polynôme annulateur non nul. (démonstration)	1
1.3	Définition du polynôme minimal, en dimension finie.	2
1.4	Lien entre spectre et polynôme annulateur (démonstration)	2
1.5	Théorème de Cayley Hamilton (démonstration pour $n=2$)	3
1.6	Lemme de décomposition des noyaux.	3
1.7	Si u est diagonalisable, tout endo induit sur un sous-espace stable l'est. (démonstration)	4
1.8	Caractérisation des endo trigonalisables par le polynôme minimal ou un polynôme annulateur.	4
2	Questions de Cours - Groupes B et C	5
2.1	Existence et unicité du polynôme minimal en dimension finie (démonstration)	5
2.2	Le polynôme minimal divise tout polynôme annulateur (démonstration)	6
2.3	Exemple d'endomorphisme n'admettant pas de polynôme annulateur non nul	6
2.4	Le spectre est égal à l'ensemble des racines du polynôme minimal (démonstration)	7
2.5	Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé simple (démonstration)	7
2.6	Si F est un sous-espace stable par u , le polynôme minimal de l'endo induit divise celui de u (démonstration)	9
2.7	Définition des sous-espaces caractéristiques et traduction matricielle associée.	9
3	Questions de Cours - Groupe C	10
3.1	Codiagonalisation de deux endomorphismes qui commutent (démonstration HP)	10
3.2	Exemple d'endomorphisme n'admettant pas de polynôme annulateur non nul. (démonstration)	11
3.3	Lemme de décomposition des noyaux (démonstration, avec le théorème de Bézout admis).	11
3.4	Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ toute matrice est limite d'une suite de matrices inversibles. (démonstration HP)	12
3.5	Si une matrice est inversible son inverse est un polynôme en cette matrice. (démonstration HP)	13
3.6	Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, toute matrice est limite d'une suite de matrices diagonalisables. (démonstration HP)	14
3.7	Décomposition de Dunford (HP ?), avec démonstration de l'unicité. (démonstration HP)	15
3.8	Deux matrices réelles semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. (démonstration HP)	17
4	Exercices de Référence, Tout groupe	18
4.1	Exercice 1	18
4.2	Exercice 2	18
4.3	Exercice 3	18
4.4	Exercice 4	19
4.5	Exercice 5	20

1 Questions de Cours - Tout groupe

1.1 Si deux endomorphismes commutent, le noyau, l'image et les s.e.p. de l'un sont stables par l'autre. (démonstration)

Proposition

Soit E, \mathbb{K} -E.V. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = v \circ u$.

Alors, $\text{Ker}(u)$, $\text{Im}(u)$, $E_\lambda(u)$ sont stables par v (pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u)$).

Preuve :

Soit $x \in \text{Ker}(u)$, alors $(u \circ v)(x) = (v \circ u)(x) = 0$ par hypothèse, ainsi, $v(x) \in \text{Ker}(u)$.

Soit $y \in \text{Im}(u)$. Alors $\exists x \in E$, $y = u(x)$.

Alors, $v(y) = v(u(x)) = u(v(x)) \in \text{Im}(u)$. Donc $v(y) \in \text{Im}(u)$.

Soit enfin $\lambda \in \text{Sp}(u)$, $x \in E_\lambda(u)$. Alors $u(v(x)) = v(u(x)) = v(\lambda x) = \lambda v(x)$. Donc $v(x) \in E_\lambda(u)$.

Les espaces $\text{Ker}(u)$, $\text{Im}(u)$ et $E_\lambda(u)$ sont stables par v . La symétrie des rôles assure que $\text{Ker}(v)$, $\text{Im}(v)$ et $E_\lambda(v)$ sont stables par u .

1.2 En dimension finie, tout endomorphisme admet un polynôme annulateur non nul. (démonstration)

Proposition

Soit E, \mathbb{K} -E.V de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors $\exists P \in \mathbb{K}[X]$, $P(u) = 0$

Preuve :

Soit A la matrice de u dans une base de E .

Il suffit de remarquer qu'en dimension n^2 , la famille (I_n, A, \dots, A^{n^2}) est liée (car est de taille $n^2 + 1$). Ainsi, il existe une combinaison linéaire non nulle qui annule cette famille, i.e $\exists a_0, \dots, a_{n^2} \in \mathbb{K}$, $\sum_{i=0}^{n^2} a_i A^i = 0$.

En posant P , le polynôme $\sum_{i=0}^{n^2} a_i X^i$, nous avons $P(u) = 0$ par définition. Ainsi, il existe bien un polynôme annulateur non nul. (si u est l'endomorphisme nul, tout polynôme non nul est annulateur, on peut alors supposer u non nul dans cette démonstration)

1.3 Définition du polynôme minimal, en dimension finie.

Définition: Polynôme minimal

Soit $E, \mathbb{K}-E.V$ de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors il existe un unique polynôme annulateur Π_u de degré minimal et unitaire (et non nul). On appelle ce polynôme le polynôme minimal de u

1.4 Lien entre spectre et polynôme annulateur (démonstration)

Proposition

Soit $E, \mathbb{K}-E.V$ de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Soit P , polynôme annulateur de u .

Alors $\text{Sp}(u) \subset \text{Rac}(P)$

Preuve :

Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$. Par définition de P , ce polynôme est polynôme annulateur de u . Soit x_0 , vecteur propre (non nul par définition) associé à la valeur propre λ .

Alors, $\forall x \in E, P(u)(x) = 0 \Rightarrow P(u)(x_0) = 0$.

Or, x_0 est vecteur propre associé à λ , en notant $P = \sum_{i=0}^r a_i X^i$, nous avons :

$$\begin{aligned} P(u)(x_0) &= \sum_{i=0}^r a_i u^i(x_0) \\ &= \sum_{i=0}^r a_i \lambda^i x_0 \\ &= P(\lambda)x_0 \end{aligned}$$

Or, P est un polynôme annulateur, donc $\forall x \in E, P(u)(x) = 0$, donc $P(u)(x_0) = P(\lambda)x_0 = 0$.
Ainsi, $\lambda \in \text{Rac}(P)$ car x_0 est non nul par définition.

1.5 Théorème de Cayley Hamilton (démonstration pour $n=2$)

Théorème de Cayley - Hamilton

Soit E, \mathbb{K} -E.V de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors χ_u est un polynôme annulateur de u . i.e, $\chi_u(u) = 0$

Preuve Cas $n = 2$:

Si $n = 2$, alors posons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ la matrice de u dans la base canonique de E . Dès lors, $\chi_u(X) = X^2 - (a + d)X + (ad - bc)$. En calculant $\chi_u(u)$, nous obtenons :

$$\chi_u(u) = u^2 - au - du + adI_d - bcI_d.$$

Par définition de la représentation matricielle de u , en évaluant sur la base canonique de E , nous obtenons $u(e_1) = ae_1 + ce_2$ et $u(e_2) = be_1 + de_2$.

$$\text{Évaluons } \chi_u(u) \text{ sur la base canonique : } \chi_u(u)(e_1) = u^2(e_1) - (a + d)u(e_1) + (ad - bc)e_1 = 0$$

$$\text{Idem, } \chi_u(u)(e_2) = u^2(e_2) - (a + d)u(e_2) + (ad - bc)e_2 = 0$$

Or, l'image d'une base par une A.L détermine de manière unique cette A.L, donc $\chi_u(u) = 0$

1.6 Lemme de décomposition des noyaux.

Lemme Décomposition des Noyaux

Soit E, \mathbb{K} -E.V. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Soient $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X]$, **PREMIERS ENTRE EUX DEUX A DEUX**.

$$\text{Alors, } \text{Ker}[(P_1 \times \dots \times P_n)(u)] = \bigoplus_{k=1}^n \text{Ker}(P_k(u))$$

1.7 Si u est diagonalisable, tout endo induit sur un sous-espace stable l'est. (démonstration)

Proposition

Soit E, \mathbb{K} -E.V. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable.

Alors, pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u)$, $u|_{E_\lambda(u)}$ est également diagonalisable.

Preuve :

Nous avons par définition que u diagonalisable $\Rightarrow E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$.

Soit \mathcal{B} , base adaptée à cette décomposition (i.e $\mathcal{B} = \cup \mathcal{B}_{\lambda_i}$). Alors, dans cette base :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \left(\begin{array}{c|c|c} \begin{matrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_1 \end{matrix} & 0 & 0 \\ \hline 0 & \begin{matrix} \ddots & & \\ & \ddots & \\ & & \ddots \end{matrix} & 0 \\ \hline 0 & 0 & \begin{matrix} \lambda_p & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p \end{matrix} \end{array} \right)$$

Ainsi, $\text{Mat}_{\mathcal{B}_{\lambda_i}}(u|_{E_{\lambda_i}(u)}) = \begin{pmatrix} \lambda_i & (0) \\ (0) & \lambda_i \end{pmatrix}$ donc $u|_{E_{\lambda_i}(u)}$ est diagonalisable.

1.8 Caractérisation des endo trigonalisables par le polynôme minimal ou un polynôme annulateur.

Proposition

Soit E, \mathbb{K} -E.V de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors $[u \text{ Trigonalisable}] \iff \begin{cases} \Pi_u \text{ est Scindé} \\ \text{Il existe un polynôme annulateur scindé} \end{cases}$

2 Questions de Cours - Groupes B et C

2.1 Existence et unicité du polynôme minimal en dimension finie (démonstration)

Proposition

Soit $E, \mathbb{K}-E.V$ de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors il existe un unique polynôme annulateur Π_u de degré minimal et unitaire (et non nul). On appelle ce polynôme le polynôme minimal de u .

Preuve :

Posons $D_u = \{\deg(P) \mid P \in \mathbb{K}[X], P(u) = 0\}$ l'ensemble des degrés des polynômes annulateurs de u .

Alors D_u est une partie non vide de \mathbb{N} , donc admet un plus petit élément. Soit P_0 réalisant le minimum de D_u (i.e un polynôme annulateur de plus petit degré).

Posons alors $\Pi_u = \frac{P_0}{a_0}$ (On divise P_0 par son coefficient dominant, de cette manière Π_u est bien un polynôme annulateur unitaire de degré minimal de u).

Pour l'unicité, montrons que l'ensemble des polynômes annulateurs est de la forme $\Pi_u \mathbb{K}[X]$ (i.e tout polynôme annulateur est divisible par Π_u) :

Soit P , polynôme annulateur de u . D'après le théorème de division euclidienne, $\exists!(Q, R) \in \mathbb{K}[X], P = Q\Pi_u + R$ avec $\deg(R) < \deg(\Pi_u)$.

Or, nous avons $P(u) = 0 = \Pi_u(u) \circ Q(u) + R(u)$. De plus, $\Pi_u(u) = 0 \Rightarrow R(u) = 0$. Donc R est un polynôme annulateur de u de degré strictement inférieur au degré de Π_u (si $R \neq 0$), ce qui est absurde par définition de Π_u . Ainsi, $R = 0$, donc tout polynôme annulateur est divisé par Π_u .

S'il existe Q_u , un autre polynôme annulateur unitaire de degré minimal, d'après ce qui précède, nous avons $\Pi_u \mid Q_u$ et $Q_u \mid \Pi_u$, donc Π_u et Q_u diffèrent d'une constante multiplicative non nulle, or ces polynômes sont tous deux unitaires, donc $\Pi_u = Q_u$.

2.2 Le polynôme minimal divise tout polynôme annulateur (démonstration)

Proposition

Soit $E, \mathbb{K}-E.V$ de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors, $\forall P \in \mathbb{K}[X], P(u) = 0 \Rightarrow \Pi_u \mid P$

Preuve :

Soit P , polynôme annulateur de u . Appliquons le théorème de division euclidienne par Π_u à P :

$$\exists!(Q, R) \in \mathbb{K}[X], P = Q\Pi_u + R \text{ avec } \deg(R) < \deg(\Pi_u)$$

.

Or, nous avons $P(u) = 0 = \Pi_u(u)Q(u) + R(u)$. De plus, $\Pi_u(u) = 0 \Rightarrow R(u) = 0$. Donc R est un polynôme annulateur de u de degré strictement inférieur au degré de Π_u (si $R \neq 0$), ce qui est absurde par définition de Π_u . Ainsi, $R = 0$, donc tout polynôme annulateur est divisé par Π_u .

2.3 Exemple d'endomorphisme n'admettant pas de polynôme annulateur non nul

Exemple

Posons D , l'endomorphisme de dérivation dans $\mathbb{R}[X]$. S'il existe $P \in \mathbb{R}[X]$, annulateur de D , alors $\forall Q \in \mathbb{R}[X], P(D)(Q) = 0$.

Nous avons en posant $P = \sum_{k=0}^r a_k X^k$, $P(D)(Q) = \sum_{k=0}^r a_k D^k(Q)$.

En évaluant en le polynôme constant égal à 1, nous avons $P(D)(\tilde{1}) = a_0 = 0$, puis en évaluant en X , il vient de même que $a_1 = 0$, plus généralement, l'évaluation successive sur les $\left(\frac{X^k}{k}\right)_{k \in \mathbb{N}}$ donne que tous les coefficients de P sont nuls, donc P est le polynôme nul.

D ne possède pas de polynôme annulateur non nul, l'hypothèse de dimension finie est alors primordiale pour pouvoir affirmer l'existence d'un polynôme annulateur!

2.4 Le spectre est égal à l'ensemble des racines du polynôme minimal (démonstration)

Proposition

Soit $E, \mathbb{K}-E.V$ de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors $\text{Sp}(u) = \text{Rac}(\Pi_u)$

Preuve :

Π_u est un polynôme annulateur, nous avons donc $\text{Sp}(u) \subset \text{Rac}(\Pi_u)$.

Soit $\lambda \in \text{Rac}(\Pi_u)$. Si $\lambda \notin \text{Sp}(u)$, l'application $(u - \lambda I_d)$ est inversible. Alors $(X - \lambda) | \Pi_u$, et $\frac{\Pi_u}{(X - \lambda)}(u) = 0$, car en notant $\Pi_u = \left(\prod_{\mu \in \text{Sp}(u)} (X - \mu) \right) \times (X - \lambda) \times Q$, nous avons $\left(\left[\prod_{\mu \in \text{Sp}(u)} (X - \mu) \right] \times Q \right)(u) = 0$ car $(u - \lambda I_d)$ est inversible.

Ainsi, nous exhibons un polynôme annulateur de degré inférieur au degré de Π_u , ceci est absurde, donc $\lambda \in \text{Sp}(u)$

2.5 Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé simple (démonstration)

Proposition

Soit $E, \mathbb{K}-E.V$ de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors $[u \text{ Diagonalisable}] \iff \begin{cases} \Pi_u \text{ est Scindé Simple} \\ \text{Il existe un polynôme annulateur Scindé Simple} \end{cases}$

Preuve :

Si u est diagonalisable, alors Π_u est scindé.

Posons $P_0 = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$. Alors P_0 est produit de polynômes premiers entre eux, nous pouvons appliquer le

lemme de décomposition des noyaux : $\text{Ker}(P_0(u)) = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \text{Ker}(u - \lambda I_d) = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$

Or, u est diagonalisable, donc $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda$. Ainsi, $\text{Ker}(P_0(u)) = E$, donc P_0 est un polynôme annulateur, le polynôme minimal le divise donc. Π_u est alors scindé et à racines simples car divise un polynôme scindé à racines simples.

Réciproquement, si Π_u est scindé à racines simples, utilisons encore le lemme de décomposition des noyaux :

Posons $\Pi_u = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$.

Alors, les polynômes $(X - \lambda)$ sont premiers entre eux deux-à-deux, et Π_u correspond à leur produit. Ainsi, d'après le lemme de décomposition des noyaux :

$$E = \text{Ker}(\Pi_u(u)) = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \text{Ker}(u - \lambda I_d) = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$$

Ainsi, u est diagonalisable car il existe une base de E composée de vecteurs propres de u .

2.6 Si F est un sous-espace stable par u , le polynôme minimal de l'endo induit divise celui de u (démonstration)

Proposition

Soit E, \mathbb{K} -E.V de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Soit F , SEV stable par u

Alors, en posant $\tilde{u} = u|_F$, nous avons $\Pi_{\tilde{u}} \mid \Pi_u$

Preuve :

Le polynôme minimal de u est un polynôme annulateur de \tilde{u} , car $\forall x \in F, x \in E \Rightarrow \Pi_u(\tilde{u})(x) = \Pi_u(u)(x) = 0 \Rightarrow \Pi_u$ est un polynôme annulateur de \tilde{u} .

Donc Π_u est un multiple de $\Pi_{\tilde{u}}$

2.7 Définition des sous-espaces caractéristiques et traduction matricielle associée.

Définition: Sous-espaces caractéristiques

Soit E, \mathbb{K} -E.V. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u)$, on appelle sous-espace caractéristique associé à λ et on note N_λ le sous-espace

$$N_\lambda = \text{Ker}[(u - \lambda I_d)^{m_\lambda}]$$

où m_λ correspond à la multiplicité de λ comme valeur propre de u (remarquons que prendre $n \geq m$ ne change pas l'espace considéré).

Si le corps de départ est algébriquement clos, il est possible de trigonaliser une matrice de manière à avoir des "blocs stables", car les sous-espaces caractéristiques sont stables par u . Nous verrons plus tard que nous avons toujours

$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} N_\lambda$, ainsi, avec une base \mathcal{B} associée à cette décomposition :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} \lambda_1 & * & * & & & & & & \\ & \ddots & * & & & & & & \\ & & \lambda_1 & & & & & & \\ \hline & & & 0 & & & & & \\ & 0 & & \ddots & & & & & \\ \hline & & & & & & \lambda_p & * & * \\ & 0 & & 0 & & & & \ddots & * \\ & & & & & & & & \lambda_p \end{array} \right)$$

3 Questions de Cours - Groupe C

3.1 Codiagonalisation de deux endomorphismes qui commutent (démonstration HP)

Proposition

Soit $E, \mathbb{K}-E.V.$ Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ qui commutent. On suppose que u et v sont diagonalisables toutes deux.

Alors, il existe une base de E dans laquelle les matrices de u et v sont diagonales. (Il existe une base de diagonalisation commune)

Preuve :

u est diagonalisable, posons donc $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u)$.

Or, u et v commutent, donc les sous-espaces propres de u sont stables par v . Posons dès lors $v_{\lambda} = v|_{E_{\lambda}(u)}$ pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u)$.

Les v_{λ} sont tous diagonalisables, car v l'est (Donc Π_v est scindé simple, donc $\forall \lambda \in \text{Sp}(u)$, $\Pi_{v_{\lambda}} | \Pi_v \Rightarrow \Pi_{v_{\lambda}}$ scindé simple). Ainsi, nous pouvons trouver une base de vecteurs propres de v_{λ} dans chaque $E_{\lambda}(u)$. On pose \mathcal{B}_{λ} une telle base de vecteurs propres de v_{λ} dans $E_{\lambda}(u)$.

De plus, les $E_{\lambda}(u)$ sont composés par définition de vecteurs propres de u associés à la valeur propre λ . Les vecteurs des \mathcal{B}_{λ} sont vecteurs propres de v mais également de u . Ainsi, nous pouvons poser $\mathcal{B} = \bigsqcup_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \mathcal{B}_{\lambda}$ une base de E .

Auquel cas, dans une telle base, les matrices de u et v ont la forme :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \begin{matrix} \mathcal{B}_{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_1 \end{matrix} & \cdots & \begin{matrix} \mathcal{B}_{\lambda_p} \\ & & \end{matrix} \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p \end{pmatrix}$$

et

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} \begin{matrix} \mathcal{B}_{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_q \end{matrix} & \cdots & \begin{matrix} \mathcal{B}_{\lambda_p} \\ & & \end{matrix} \\ & \ddots & \\ & & \tau_1 \end{pmatrix}$$

3.2 Exemple d'endomorphisme n'admettant pas de polynôme annulateur non nul. (démonstration)

C.F cette question : Exemple d'endo sans polynôme annulateur non nul

3.3 Lemme de décomposition des noyaux (démonstration, avec le théorème de Bézout admis).

Lemme Décomposition des Noyaux

Soit $E, \mathbb{K} \text{--} E.V.$ Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Soient $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X]$, **PREMIERS ENTRE EUX DEUX A DEUX**.

$$\text{Alors, } \text{Ker}(P_1 \times \dots \times P_n(u)) = \bigoplus_{k=1}^n \text{Ker}(P_k(u))$$

Preuve :

Rappelons le théorème de Bézout (version Polynôme) :

Théorème de Bézout

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$.

1. $P \wedge Q = 1 \iff \exists U, V \in \mathbb{K}[X], PU + QV = 1$
2. On note $R = P \wedge Q$. Alors, $\exists U, V \in \mathbb{K}[X], PU + QV = R$

Procédons par récurrence sur n (le nombre de polynômes dans le produit) : Vérifions le cas $n = 2$:

D'après le théorème de Bézout, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P_1 U + P_2 V = 1$. Montrons la double inclusion voulue :

Montrons tout d'abord que la somme des noyaux est directe : Soit $x \in \text{Ker}(P_1(u)) \cap \text{Ker}(P_2(u))$. Alors, par la relation de Bézout, nous avons $P_1 U(u) + P_2 V(u) = I_d$.

Or, $P_1 U(u) = U P_1(u)$ par morphisme d'algèbre (le produit de polynômes commute). Donc, en appliquant la relation précédente avec x , cela donne :

$$U P_1(u)(x) + V P_2(u)(x) = x, \text{ avec } P_1(u)(x) = 0 = P_2(u)(x) \text{ par choix de } x.$$

Ainsi, $0 = x$: La somme est directe.

Montrons premièrement l'inclusion réciproque :

Par définition, nous avons $P = P_1 \times P_2 \Rightarrow P(u) = P_1(u) \circ P_2(u) = P_2(u) \circ P_1(u)$.

Soit $x \in \text{Ker}(P_1(u))$, alors $P(u)(x) = P_2(u)(0) = 0$, donc $x \in \text{Ker}(P(u))$. Idem pour $x \in \text{Ker}(P_2(u))$, donc $\text{Ker}(P_1(u)) \oplus \text{Ker}(P_2(u)) \subset \text{Ker}(P)$.

Réciproquement, Soit $x \in \text{Ker}(P(u))$. Alors, $(P_1(u) \circ P_2(u))(x) = 0$.

Posons $x_1 = P_1(u) \circ U(u)(x)$ et $x_2 = P_2(u) \circ V(u)(x)$. Par l'identité de Bézout : $x_1 + x_2 = x$.

Or, $P_2(u)(x_1) = P_2(u) \circ P_1(u) \circ U(u)(x)$. Nous avons $P_2(u) \circ P_1(u) \circ U(u)(x) = 0 \iff P(u) \circ U(u)(x) = 0 = U(u) \circ P(u)(x)$. Dès lors, $x_1 \in \text{Ker}(P_2(u))$, car x est par hypothèse dans $\text{Ker}(P(u))$, donc $U(u) \circ P(u)(x) = 0 \Rightarrow$

$$P_2(u)(x_1) = 0.$$

De même, $x_2 \in \text{Ker}(P_1(u))$. Donc, $x = x_1 + x_2 = x_2 + x_1 \in \text{Ker}(P_1(u)) \oplus \text{Ker}(P_2(u))$

Nous venons dès lors de montrer que pour le produit de deux polynômes premiers entre eux, l'égalité est vérifiée.

Pour vérifier l'hérédité, il suffit de vérifier que si P_1, \dots, P_{n+1} sont premiers entre eux deux-à-deux, alors P_{n+1} est premier avec $P_1 \times \dots \times P_n$, ce qui est immédiat.

Nous pouvons dès lors appliquer la même démarche (on copie-colle quoi) afin de démontrer le résultat pour n arbitraire.

3.4 Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ toute matrice est limite d'une suite de matrices inversibles. (démonstration HP)

Proposition Densité des matrices inversibles

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou \mathbb{C}).

Alors $\exists (M_n)_n \in \text{GL}_n(\mathbb{K})^{\mathbb{N}}$, $M_n \rightarrow A$

Preuve :

Il suffit de poser $A_n = A - \frac{1}{n}I_n$. Alors, cette suite est une suite de matrices inversibles définie pour n assez grand :

Observons pour $n \in \mathbb{N}$, $\det(A_n) = \det\left(A - \frac{1}{n}I_n\right) = (-1)^n \times \chi_A\left(\frac{1}{n}\right)$.

Or, A possède un nombre fini de valeurs propres (nous sommes en dimension finie). Ainsi, la suite (A_n) se trouve dans $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ pour n assez grand.

De plus, nous remarquons que $A_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} A$

D'où la densité des matrices inversibles dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

3.5 Si une matrice est inversible son inverse est un polynôme en cette matrice.(démonstration HP)

Proposition

Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$.

Alors $\exists P \in \mathbb{K}[X], A^{-1} = P(A)$

Preuve :

Considérons χ_A , le polynôme caractéristique de A (qui est également un polynôme annulateur d'après le théorème de Cayley-Hamilton).

A étant inversible, son coefficient constant se trouve être non nul (il vaut $(-1)^n \times \det(A)$). Remarquons que $I_n = A \times A^{-1}$.

Nous avons la relation $\chi_A(A) = \sum_{i=0}^n a_i A^i = 0 \Rightarrow I_n = \frac{1}{a_0} \sum_{i=1}^n a_i A^i$

Donc, en factorisant A dans les deux membres, et en simplifiant, il vient :

$$A^{-1} \times A = \frac{1}{a_0} \left(\sum_{i=1}^n a_i A^{i-1} \right) \times A$$

$$A^{-1} = \frac{1}{a_0} \left(\sum_{i=1}^n a_i A^{i-1} \right)$$

(A étant inversible, on multiplie à droite par A^{-1} dans les deux membres).

Ainsi, l'inverse d'une matrice est bien polynomiale en cette matrice.

3.6 Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, toute matrice est limite d'une suite de matrices diagonalisables. (démonstration HP)

Proposition Densité des matrices inversibles dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Alors A est limite d'une suite de matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Preuve :

A étant dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, A est trigonalisable. Ramenons nous au cas où A est triangulaire supérieure.

A est alors de la forme

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & 0 & & \ddots & \\ & & & & \lambda_p \\ & 0 & & 0 & & \ddots & & \lambda_p \end{pmatrix}.$$

Posons la suite de matrice $T_n =$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 + \frac{1}{n} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 + \frac{m_{\lambda_1}}{n} & & \\ & 0 & & \ddots & \\ & & & & \lambda_p + \frac{1}{n} \\ & 0 & & 0 & & \ddots & & \lambda_p + \frac{m_{\lambda_p}}{n} \end{pmatrix}.$$

Alors ces matrices sont diagonalisables pour n assez grand. En effet, on vérifie aisément que les éléments diagonaux reliés à une même valeur propre sont distincts pour tout n $\left(\lambda_i + \frac{a}{n} - \lambda_i + \frac{b}{n} = \frac{a-b}{n} \neq 0 \right)$

De plus, par hypothèse, si $i \neq j$, $\lambda_i \neq \lambda_j$. En posant $d = \max_{i,j \in \llbracket 1;p \rrbracket} (\|\lambda_i - \lambda_j\|)$, pour n assez grand, les $\lambda_i + \frac{k}{n}$ sont contenus dans la boule fermée de centre λ_i , de rayon $\frac{d}{3}$.

Dès lors, tous les éléments diagonaux (valeurs propres) des T_n sont distincts pour n assez grand. Les T_n sont donc diagonalisables pour n assez grand.

De plus, nous observons que $T_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} A$, ce qui permet de conclure dans le cas général par changement de base car toute matrice est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

3.7 Décomposition de Dunford (HP ?), avec démonstration de l'unicité. (démon HP)

Théorème Décomposition de Dunford

Soit E, \mathbb{K} -E.V de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tels que :

- d est Diagonalisable, n est nilpotente
- $u = d + n$
- d et n commutent
- d et n sont polynomiaux en u

Preuve :

Toute l'idée de la preuve part des sous-espaces caractéristiques.

Pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u)$, on pose $N_\lambda(u) = \text{Ker}[(u - \lambda I_d)^{m_\lambda}]$ le sous-espace caractéristique associé à la valeur λ .

D'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_u(u) = 0$, donc $\text{Ker}(\chi_u(u)) = E$.

Or, $\chi_u = \prod_{\lambda \in \text{Sp}} (X - \lambda)^{m_\lambda}$, et tout ces termes sont premiers entre eux (car les λ sont distincts).

Ainsi, d'après le lemme de décomposition des noyaux :

$$\text{Ker}(\chi_u(u)) = E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \text{Ker}[(u - \lambda I_d)^{m_\lambda}]$$

Pour chaque λ , posons $d_\lambda = \lambda \cdot \text{Id}_{|N_\lambda(u)}$, alors les d_λ sont bien définis car sont des endomorphismes sur les $N_\lambda(u)$.

Ces endomorphismes sont évidemment diagonalisables sur chaque $N_\lambda(u)$. Il suffit alors de poser $d = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} d_\lambda$ afin d'obtenir un endomorphisme diagonalisable. (observer la matrice de d dans une base adaptée à la décomposition $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} N_\lambda(u)$).

Posons alors $n = u - d$. Alors nous avons bien $n + d = u$ par définition. Montrons que n est nilpotente.

Les sous-espaces caractéristiques étant stables par u (et évidemment par l'identité donc par d), ils le restent par n , il suffit alors de montrer que chaque $n_\lambda = n|_{N_\lambda(u)}$ est nilpotente.

Or ce fait se vérifie par la définition des $N_\lambda(u) = \text{Ker}[(u - d_\lambda)^{m_\lambda}]$, ce qui donne m_λ comme indice de nilpotence pour chaque n_λ .

Nous avons alors $u = n + d$ avec d diagonalisable et n nilpotente.

Pour montrer l'unicité et le fait que ces endomorphismes commutent, montrons que d et n sont polynomiales en u : Posons pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u)$, p_λ la projection sur $N_\lambda(u)$ parallèlement à la somme directe des autres sous-espaces caractéristiques.

Alors, $\forall \lambda \in \text{Sp}(u)$, $d = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \lambda p_\lambda$. De plus, les projecteurs sur les sous-espaces caractéristiques sont polynomiaux en u d'après le théorème de Bézout :

Lemme

Posons $\forall \lambda \in \text{Sp}(u)$, $Q_\lambda = \prod_{\substack{\mu \in \text{Sp}(u) \\ \mu \neq \lambda}} (X - \mu)^{m_\mu}$.

Alors ces Q_λ sont premiers entre eux **DANS LEUR ENSEMBLE**, donc, d'après le théorème de Bézout, $\exists (U_\lambda)_{\lambda \in \text{Sp}(u)}$, $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} Q_\lambda U_\lambda = 1$.

On pose alors $\forall \lambda \in \text{Sp}(u)$, $p_\lambda = Q_\lambda U_\lambda(u)$. Alors les p_λ sont des projecteurs sur les sous-espaces caractéristiques et sont polynomiaux en u .

Preuve :

Par la relation de Bézout, nous avons alors $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} p_\lambda = I_d$. Ainsi, $\forall \lambda \in \text{Sp}(u)$, $\left(\sum_{\mu \in \text{Sp}(u)} p_\mu \right) \circ p_\lambda = p_\lambda$.

Or, pour tout $\lambda \neq \mu$, $p_\mu \circ p_\lambda = 0$, car $p_\mu \circ p_\lambda = U_\mu U_\lambda(u) \circ Q_\mu Q_\lambda(u) = 0$, car $P \mid Q_\lambda Q_\mu$ (par définition des Q_λ , le produit comble les trous de Q_λ), or $P(u) = 0 \Rightarrow Q_\lambda Q_\mu(u) = 0$.

Dès lors, $(p_\lambda)^2 = p_\lambda$ par linéarité de l'évaluation. Ainsi, les p_λ sont des projecteurs.

Montrons ensuite que $\text{Im}(p_\lambda) = N_\lambda(u)$:

Soit $y \in \text{Im}(p_\lambda)$, alors $\exists x \in E$, $y = p_\lambda(x)$. Montrons que $(u - \lambda I_d)^{m_\lambda}(y) = 0$:

$$\begin{aligned} (u - \lambda I_d)^{m_\lambda}(y) &= (u - \lambda I_d)^{m_\lambda}(p_\lambda(x)) \\ &= (X - \lambda)^{m_\lambda} \times U_\lambda \times Q_\lambda(u)(x) \\ &= 0 \quad \text{Car } P \mid (X - \lambda)^{m_\lambda} \times U_\lambda \text{ (Par définition des } Q_\lambda) \end{aligned}$$

Donc $x \in \text{Ker}[(u - \lambda I_d)^{m_\lambda}] = N_\lambda(u)$.

Réciproquement, si $x \in \text{Ker}[(u - \lambda I_d)^{m_\lambda}]$.

Or, par Bézout, $x = \sum_{\mu \in \text{Sp}(u)} p_\mu(x) = p_\lambda(x)$ car par définition de p_λ , Q_λ est le seul polynôme Q qui ne contient pas $(X - \lambda)$ par définition, donc p_λ est bien le seul projecteur dont l'image est non-nulle.

Finalement, les projecteurs sur $N_\lambda(u)$ sont polynomiaux en u .

Ainsi, d et n sont polynomiaux en u , ces deux endomorphismes commutent donc. Il ne reste plus qu'à montrer l'unicité :

Soit (d', n') , un autre couple qui convient. Alors, $d + n = d' + n' \Rightarrow d - d' = n - n'$.

Or, $d - d'$ est diagonalisable (car d et d' sont polynomiaux en u , donc commutent et sont alors codiagonalisables). De plus, $n - n'$ reste nilpotente.

Dès lors, la seule matrice diagonalisable nilpotente étant la matrice nulle, $d - d' = n - n' = 0 \Rightarrow d = d'$ et $n = n'$. D'où l'unicité.

3.8 Deux matrices réelles semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. (démonstration HP)

Proposition

Soient A et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que A et B soient semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ($\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{C}), PAP^{-1} = B$).

Alors A et B sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ($\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{R}), PAP^{-1} = B$).

Preuve :

Nous avons par hypothèse $PA = BP$. Posons $P = C + iD$, avec $C, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

Dès lors, nous avons $(C + iD)A = B(C + iD) \Rightarrow CA = BC$ et $DA = BD$. Posons pour $t \in \mathbb{C}$, $P_t = C + tD$.

Alors, $\det(P_t) = \det(C + tD) = Q(t)$ (un polynôme en t).

Or, $Q(i) = \det(P) \neq 0 \Rightarrow Q \neq 0 \Rightarrow Q$ possède un nombre fini de racines, or \mathbb{R} est infini (Woah), il existe alors $t_0 \in \mathbb{R}$, $\det(P_{t_0}) \neq 0$. Dès lors $C + t_0 D$ est inversible.

Dès lors, $P_{t_0} A (P_{t_0})^{-1} = B$ avec $P_{t_0} \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, donc A et B sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

4 Exercices de Référence, Tout groupe

4.1 Exercice 1

Soit $P(X) := X^3 + 1 = (X + 1)(X + j)(X + j^2)$. Alors P est un polynôme annulateur de A , scindé simple, donc A est diagonalisable dans \mathbb{C} . Or, la trace est un invariant de Similitude, donc $\text{Tr}(A) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} m_\lambda \times \lambda = -1 - j - j^2 = 0$

4.2 Exercice 2

Question 1. A est une matrice symétrique Réelle, donc est à ce titre Diagonalisable.

Question 2. Nous voyons que A est de rang 2, car les vecteurs colonnes C_2, \dots, C_n sont tous colinéaires. Le vecteur C_1 est quant à lui non-colinéaire à C_2 , donc la dimension de l'espace engendré par ces vecteurs colonnes est exactement deux (du fait que les a_i sont non tous nuls). Nous en déduisons que le spectre de A comporte 0, et ne peut comporter plus de deux valeurs propres non-nulles.

Question 3. Un calcul donne $A^2 = \begin{pmatrix} \sum_i a_i^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_1^2 & & a_1 a_n \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & a_n a_1 & & a_n^2 \end{pmatrix}$

Nous remarquons que la sous-matrice est de rang 1, car chaque vecteur colonne de cette sous-matrice correspond exactement à $a_i \times \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$. Ceci nous apporte l'information supplémentaire selon laquelle $\sum_i a_i^2$ est une valeur propre

de A^2 . Or, A est diagonalisable, donc A^2 l'est aussi, et ses valeurs propres correspondent aux valeurs propres de A , élevées au carré. Nous savons néanmoins que $\text{Tr}(A) = 0$, donc A comporte à la fois $\sqrt{\sum_i a_i^2}$ et $-\sqrt{\sum_i a_i^2}$ comme valeurs propres, car la trace de A correspond à la somme de ses valeurs propres (comptées avec multiplicité).

Dès lors, $\text{Sp}(A) = \left\{ \sqrt{\sum_i a_i^2}, -\sqrt{\sum_i a_i^2}, 0 \right\}$ et $\chi_A(X) = X^{n-1} \left(X - \sqrt{\sum_i a_i^2} \right) \left(X + \sqrt{\sum_i a_i^2} \right)$.

4.3 Exercice 3

Question 1. Si f admettait une valeur propre réelle $\lambda \in \mathbb{R}$, dont on dénote x_λ un vecteur propre associé, nous aurions

$$f^2(x_\lambda) = \begin{cases} -x_\lambda \\ \lambda^2 x_\lambda \end{cases}$$

Ceci est absurde avec $\lambda \in \mathbb{R}$, donc f ne comporte aucune valeur propre réelle.

De plus, $\det(f^2) = \det(f)^2 = (-1)^n \det(I_n) \Rightarrow \det(f) \neq 0$, donc f est bien bijective.

Question 2. Il vient de plus que $n = \dim(E)$ est pair, car $\det(f)$ est un réel, donc lorsque ce dernier est élevé au carré, nous devons avoir un réel positif, ce qui est impossible si $n \equiv 1[2]$, donc $n \equiv 0[2]$

Question 3. Par définition de l'espace fourni, $f(u) \in \text{Vect}(u, f(u))$. De plus, $f(f(u)) = -u$ par définition de f , donc $f(f(u)) \in \text{Vect}(u, f(u))$. Ainsi, $\text{Vect}(u, f(u))$ est stable par f , car tout vecteur de cet espace s'exprime comme combinaison linéaire des vecteurs u et $f(u)$, dont l'image appartient bien à $\text{Vect}(u, f(u))$.

Question 4. Soit $u \in E$. Nous savons $f(u) \notin \text{Vect}(u)$, car f n'admet pas de valeur propre réelle. Or, d'après ce qui précède, l'espace $\text{Vect}(u, f(u))$ est stable sous l'action de f . Ainsi, la famille $(u, f(u))$ est libre, et stable sous l'action de f . Nous savons que f est bijective, et que f ne comporte aucune valeur propre. Considérons l'espace \mathcal{G} , supplémentaire de $\mathcal{F} = \text{Vect}(u, f(u))$ dans E . Alors cet espace \mathcal{G} est de dimension deux. Par bijectivité de f , nous savons qu'il existe $v \in \mathcal{G}$ tel que $f(v) \in \mathcal{G}$, car un tel vecteur ne peut se trouver dans \mathcal{F} (clos sous l'action de f). Or, de par le fait que f ne possède aucune valeur propre réelle, nous savons que $(v, f(v))$ est libre, de bon cardinal pour former une base de \mathcal{G} . D'où l'existence de $u, v \in E$ tels que $(u, f(u), v, f(v))$ forme une base de E . (Nous pouvions également nous intéresser à $f|_{\mathcal{G}}$, qui respecte les mêmes propriétés que f , donc la question précédente s'applique).

Question 5. Opérons par récurrence sur la dimension de E . Remarquons que les cas $n = 2$, $n = 4$ viennent d'être traités.

Soit donc $n \geq 2$. Supposons que pour E de dimension n , tout endomorphisme f tel que $f^2 = -\text{Id}_E$ offre une base de la forme $(u_1, f(u_1), \dots, u_p, f(u_p))$. Alors en dimension $n + 2$, intéressons nous à un tel endomorphisme f :

Soit $u \in E \setminus \{0\}$. f étant bijective, et ne possédant aucune valeur propre réelle, il vient que $\text{Vect}(u, f(u))$ est un espace vectoriel de dimension deux, stable par f . Posons \mathcal{F} supplémentaire de cet espace. Alors f induit un endomorphisme $f|_{\mathcal{F}}$ (la bijectivité de f le garantit), qui nous permet d'appliquer l'hypothèse de récurrence. Soit $(u_1, f(u_1), \dots, u_p, f(u_p))$, base de \mathcal{F} . Par théorème de concaténation des bases, il vient que $(u, f(u), u_1, f(u_1), \dots, u_p, f(u_p))$ est une base de E .

4.4 Exercice 4

Question 1. Soit $x \in \text{Ker}(u) \cap \text{Im}(u)$. Alors $u(x) = 0$ et $\exists z \in E$, $x = u(z)$.

Or, nous avons $u^3 + u = 0$, donc $u^3(z) + u(z) = u^2(x) + x = 0$. Avec $u(x) = 0 \Rightarrow u^2(x) = 0$, nous obtenons $x = 0$, d'où $\text{Ker}(u) \oplus \text{Im}(u)$.

Question 2. Utilisons le Lemme de décomposition des noyaux : Nous avons $E = \text{Ker}(u^3 + u) = \text{Ker}(u \circ (u^2 + \text{Id}))$

Or, X et $X^2 + 1$ sont deux polynômes premiers entre eux, donc $E = \text{Ker}(u) \oplus \text{Ker}(u^2 + \text{Id})$. En particulier, ces espaces sont en somme directe.

Soit $x \in \text{Im}(u)$. Alors $x = u(z)$, donc $u^3(z) + u(z) = u^2(x) + \text{Id}(x) = 0 \Rightarrow x \in \text{Ker}(u^2 + \text{Id})$.

Réciproquement, soit $x \in \text{Ker}(u^2 + \text{Id})$, alors $u^2(x) + x = 0 \Rightarrow x = u(-u(x))$, supposons de plus x non nul (sinon $x = u(0)$ convient). Alors d'après la décomposition des noyaux, $x \notin \text{Ker}(u)$, donc $u(x) \neq 0$, et en particulier, $x \in \text{Im}(u)$ avec $x = u(-u(x))$.

Question 3. Supposons que u soit injective. Alors, en dimension finie, ceci équivaut à u surjective et u bijective. En particulier, $\text{Ker}(u) = \{0\}$. En particulier, $0 \notin \text{Sp}(u)$. Dès lors, du fait que $X^3 + X = X(X^2 + 1)$ soit un polynôme annulateur de u par définition de u , il vient que $\Pi_u \mid X(X^2 + 1)$: Nous avons donc $\Pi_u = X$, $\Pi_u = (X^2 + 1)$ ou $\Pi_u = X(X^2 + 1)$ comme possibilités. Or, du fait que $\text{Rac}(\Pi_u) = \text{Sp}(u)$ et $0 \notin \text{Sp}(u)$, nous devons donc avoir $\Pi_u = X^2 + 1$.

Ainsi, notre application u ne possède aucune valeur propre réelle, ce qui est absurde car χ_u est de degré 3 et possède à ce titre une racine réelle : u n'est pas injective.

Question 4. Nous venons donc d'éliminer le cas $\text{rg}(u) = 3$. Nous savons de plus que $\text{rg}(u) > 0$ car $u \neq 0$. Ainsi, $\text{rg}(u) \in \{1, 2\}$.

Or, si $\text{rg}(u) = 1$, du fait que $\text{Ker}(u) \oplus \text{Im}(u)$, il vient que $\text{Im}(u)$ est une droite stable, donc u possède une valeur propre non-nulle (en effet, si $x \in \text{Im}(u) \setminus \{0\}$, $u(x) \in \text{Im}(u) \Rightarrow u(x) = \lambda x$ et $u(x) \neq 0 \Rightarrow \lambda \neq 0$ car $x \notin \text{Ker}(u)$). Or, avec $\text{Sp}(u) \subset \text{Rac}(X(X^2 + 1))$, ceci est impossible, car ce polynôme ne possède que 0 pour racine réelle. Dès lors, nous devons avoir $\text{rg}(u) = 2$

4.5 Exercice 5

Question 1. Nous trouvons $\chi_A(X) = (X-5)(X-3) - (-3)(-1) = X^2 - 8X + 12 = (X-2)(X-6)$.

De plus, $E_2(A) = \text{Ker}(A - 2I_2) = \text{Ker}\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \text{Vect}(e_1 - e_2)$, et $E_6(A) = \text{Ker}\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \text{Vect}(3e_1 + e_2)$.

Ainsi, en posant $P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, nous obtenons $A = P \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/4 & -3/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$

Question 2.a Nous remarquons que si λ est une valeur propre de M associée à x_λ , nous avons :
 $M^2 x_\lambda + M x_\lambda = (\lambda^2 + \lambda)x_\lambda = A x_\lambda : x_\lambda$ est un vecteur propre de A , associé à la valeur propre $(\lambda^2 + \lambda)$

Alors $(\lambda^2 + \lambda) \in \text{Sp}(A) = \{2, 6\}$. Nous remarquons donc que les valeurs proposées conviennent, et qu'il s'agit là des uniques possibilités (nous avons deux polynômes réels de degré 2 : $X^2 + X - 2$ et $X^2 + X - 6$ dont il faut trouver les racines, qui sont au plus au nombre de 4).

Question 2.b Notons que $\Pi_A(A) = \Pi_A(M^2 + M) = 0$. Ainsi, en notant $\Pi_A = (X-2)(X-6)$ (scindé simple, dont les racines sont exactement le spectre de A), nous obtenons un polynôme annulateur pour M : $(X^2 + X - 2)(X^2 + X - 6)$ est annulateur pour M .

Or, ce polynôme se décompose comme $(X-1)(X+2)(X-2)(X+3)$, qui est scindé simple, donc M est diagonalisable car admet un polynôme annulateur scindé simple.

Question 3. A est un polynôme en M , donc commute avec M . Dès lors, ces deux matrices sont codiagonalisables. Or, les seules matrices de passage diagonalisant A sont les matrices P , et la matrice obtenue en échangeant la première et la deuxième colonne de P . Dès lors, les seules matrices convenant sont semblables à :

$$\begin{pmatrix} 1 & \\ & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & \\ & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \\ & -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & \\ & -3 \end{pmatrix}$$

Il faut ajouter l'échange de ces deux valeurs propres, et adapter à la base de diagonalisation adaptée (P ou P').

Looks like mine, but seriously I have my doubts...

