Диагноз: Не малобольшой клеточный рак легких

Лечение 1: Афатиниб

Выбранные клинические испытания:

1. 'Афатиниб в EGFR+NSCLC (рецидивирующий или IV стадии) - пациенты с плохим состоянием здоровья (ECOG 2 или 3)' завершено фаза4 https://clinicaltrials.gov/study/NCT02695290

Описание: Процент пациентов с возникновением Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 3 или более тяжелой диареи, кожной сыпи/акне+, стоматита+ и паронихии+ (+ означает объединённый термин)

Население: 1

Время: До 98 дней

Афатиниб Процент пациентов с возникновением CTCAE 3 или более тяжелой диареи, кожной сыпи/акне+, стоматита+ и паронихии+: 0.0

1. 'LUX-Lung 4: BIBW 2992 (Афатиниб) Фаза I испытания в пациентов с продвинутым не малобольшой клеточным раком легких & Фаза II испытания в пациентов с не малобольшой клеточным раком легких, не отвечающих на Эрлотиниб или Гефитиниб' завершено фаза2 https://clinicaltrials.gov/study/NCT00711594

Описание: Основным показателем был объективный показатель ответа (ORR), оцененный по критериям RECIST 1.1.

Население: 62

Время: Посещение скрининга

BIBW 50 мг (Фаза II) Объективный показатель ответа (ORR), оцененный по критериям RECIST 1.1: 28.333333333333336

Продолжительность ответа (DoR) в месяцах: 10.5

Продолжительность ремиссии (PFS) в месяцах: 4.1

Общая выживаемость (OS) в месяцах: 12.3

Описание: Вторичные показатели включали безопасность и переносимость BIBW 2992.

Население: 62

Время: Посещение скрининга

BIBW 50 мг (Фаза II) Отчеты о нежелательных явлениях (AEs): 56.0

Нежелательные явления 3 или более тяжелой степени: 14.0

Нежелательные явления, связанные с лечением: 32.0

Снижение дозы из-за AEs: 10.0

Прекращение лечения из-за AEs: 4.0

Описание: Вторичный показатель включал обзор результатов теста на мутации EGFR.

Население: 62

Время: Посещение скрининга

BIBW 50 мг (Фаза II) Тест на мутацию EGFR проведен (местный или центральный): 56.0

Положительный: 45.0

Del19: 22.0

Del19 + L858R: 1.0

Del19 + T790M: 1.0

Del19 + Другое: 1.0

L858R: 15.0

L858R + T790M: 1.0

L858R + Другое: 3.0

L861Q: 1.0

Отрицательный: 11.0

Выбранные научные статьи:

Афатиниб показал частичное восстановление иммунодепрессивного-подобного транскрипционного сигнатуры в резистентных NSCLC [1]. Афатиниб показал эффективность в старших пациентах с мутацией EGFR рак легких [2]. Афатиниб одобрен для первичного лечения в продвинутом EGFR-мутантном NSCLC [3].

[1] EGFR and IRE1α pathways are associated with distinct immunomodulatory gene expression profiles in NSCLC cells with acquired resistance to EGFR TKIs. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41672191

[2] Efficacy and safety findings of the EXTRA study in older adult EGFR-mutant lung cancer patients receiving afatinib as first-line treatment. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41673455

[3] Prospective Observational Real-World Study of Afatinib as First-Line Treatment in Patients with Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Mutation-Positive Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) in China. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41736995