Диагноз: Не малобольшой клеточный рак легких

Лечение 1: Афатиниб

Выбранные клинические испытания:

1. 'Афатиниб в EGFR+NSCLC (рецидивирующий или IV стадии) - пациенты с плохим состоянием здоровья (ECOG 2 или 3)' завершено фаза4 https://clinicaltrials.gov/study/NCT02695290

Описание: Процент пациентов с возникновением Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 3 или более тяжелой диареи, кожной сыпи/акне+, стоматита+ и паронихии+ (+ означает объединённый термин)

Население: 1

Время: До 98 дней

описание группы: Афатиниб

измерение: Процент пациентов с возникновением CTCAE 3 или более тяжелой диареи, кожной сыпи/акне+, стоматита+ и паронихии+ (0.0)

1. 'LUX-Lung 4: BIBW 2992 (Афатиниб) Фаза I испытания в пациентах с продвинутым не малобольшой клеточным раком легких & Фаза II испытания в пациентах с не малобольшой клеточным раком легких, не отвечающих на Эрлотиниб или Гевитиниб' завершено фаза2 https://clinicaltrials.gov/study/NCT00711594

Описание: Основным показателем был объективный показатель ответа (ORR), оцененный по критериям RECIST 1.1.

Население: 62

Время: Посещение для скрининга

описание группы: BIBW 50 мг (Фаза II)

измерение: Объективный показатель ответа (ORR), оцененный по критериям RECIST 1.1 (28.333333333333336)

измерение: Продолжительность ответа (DoR) в месяцах (10.5)

измерение: Прогрессия свободного выживания (PFS) в месяцах (4.1)

измерение: Общее выживание (OS) в месяцах (12.3)

Описание: Вторичными показателями были безопасность и переносимость BIBW 2992.

Население: 62

Время: Посещение для скрининга

описание группы: BIBW 50 мг (Фаза II)

измерение: Отчеты о нежелательных явлениях (AEs) (56.0)

измерение: Нежелательные явления 3 или более тяжелой степени (14.0)

измерение: Нежелательные явления, связанные с лечением (32.0)

измерение: Снижение дозы из-за нежелательных явлений (10.0)

измерение: Прекращение лечения из-за нежелательных явлений (4.0)

Описание: Вторичным показателем было резюме результатов теста на мутации EGFR.

Население: 62

Время: Посещение для скрининга

описание группы: BIBW 50 мг (Фаза II)

измерение: Тест на мутацию EGFR проведен (местный или центральный) (56.0)

измерение: Положительный (45.0)

измерение: Del19 (22.0)

измерение: Del19 + L858R (1.0)

измерение: Del19 + T790M (1.0)

измерение: Del19 + Другое (1.0)

измерение: L858R (15.0)

измерение: L858R + T790M (1.0)

измерение: L858R + Другое (3.0)

измерение: L861Q (1.0)

измерение: Отрицательный (11.0)

Выбранные научные статьи:

Афатиниб показал частичное восстановление иммунодепрессивного-подобного транскрипционного сигнатуры в резистентных NSCLC [1]. Афатиниб показал эффективность в старших пациентах с мутацией EGFR рака легких [2]. Афатиниб одобрен для первичного лечения в продвинутом EGFR-мутационно положительном NSCLC [3].

[1] EGFR and IRE1α pathways are associated with distinct immunomodulatory gene expression profiles in NSCLC cells with acquired resistance to EGFR TKIs. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41672191

[2] Efficacy and safety findings of the EXTRA study in older adult EGFR-mutant lung cancer patients receiving afatinib as first-line treatment. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41673455

[3] Prospective Observational Real-World Study of Afatinib as First-Line Treatment in Patients with Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Mutation-Positive Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) in China. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41736995