Диагноз: Колоректальный рак

Лечение 1: Кризотиниб

Выбранные клинические испытания:

1. 'MEK and MET Inhibition in Colorectal Cancer' завершенная фаза 1 https://clinicaltrials.gov/study/NCT02510001

   Популяция: 30

   Время: Фаза расширения дозы: изменение по сравнению с исходным уровнем и до 12 месяцев.

   Стабильное заболевание: 7

   Прогрессирующее заболевание: 22

   Ранняя смерть от злокачественного заболевания: 1

Выбранные научные статьи:

Кризотиниб блокировал ось HGF/STAT3/SOX13/c-MET, значительно подавляя миграцию, инвазию и метастазирование CRC, медиатизированную SOX13 [1]. Двойной ингибитор ALK-MET кризотиниб в сочетании с вемурафенибом показал быструю и выраженную эффективность в лечении колоректального рака с мутацией BRAF [2]. Кризотиниб показал частичный ответ у одного пациента с колоректальным раком [3]. Лечение кризотинибом преодолело резистентность кетексимаба в исследованиях in vitro и in vivo [4]. Кризотиниб использовали в сочетании с тиселизумабом и регорafenibом, достигнув хорошего клинического терапевтического эффекта без серьезных побочных эффектов [5]. Кризотиниб продемонстрировал усиленную цитотоксичность в клетках колоректального рака с дефицитом ARID1A [6]. Кризотиниб улучшает эффективность лечения в моделях колоректального рака при комбинации с EpAb2-6 [7]. TH588 и (S)-кризотиниб имеют четкие и различающиеся противораковые эффекты в 3D-культурах колоректального рака, но эти эффекты происходят через механизмы, независимые от ROS [8]. Кризотиниб проявляет умеренную цитотоксичность на линии клеток Caco-2 [9].

[1] SOX13 promotes colorectal cancer metastasis by transactivating SNAI2 and c-MET. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32111984

[2] MET-Driven Resistance to Dual EGFR and BRAF Blockade May Be Overcome by Switching from EGFR to MET Inhibition in BRAF-Mutated Colorectal Cancer. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27325282

[3] ALK fusions in the pan-cancer setting: another tumor-agnostic target? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37773318

[4] Inhibition of autocrine HGF maturation overcomes cetuximab resistance in colorectal cancer. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38212428

[5] Partial response to crizotinib + regorafenib + PD-1 inhibitor in a metastatic https://

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38711893

[6] ARID1A loss enhances sensitivity to c-MET inhibition by dual targeting of GPX4 and iron homeostasis, inducing ferroptosis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40369167

[7] Epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) regulates HGFR signaling to promote colon cancer progression and metastasis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37543570

[8] Differential anti-tumour effects of MTH1 inhibitors in patient-derived 3D colorectal cancer cultures. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30692572

[9] In silico-in vitro discovery of untargeted kinase-inhibitor interactions from kinase-targeted therapies: A case study on the cancer MAPK signaling pathway. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29803964