Диагноз: Не малобольшой клеточный рак легких

Лечение 1: Афатиниб

Выбранные клинические испытания:

1. 'Афатиниб в EGFR+NSCLC (рецидивирующий или IV стадии) - пациенты с плохим состоянием здоровья (ECOG 2 или 3)' завершено фаза4 https://clinicaltrials.gov/study/NCT02695290

Описание: Процент пациентов с развитием Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 3 или более тяжелой диареи, кожной сыпи/акне+, стоматита+ и паронихии+ (+ означает объединённый термин)

Население: 1

Время: До 98 дней

описание группы:Афатиниб измерение:Процент пациентов с развитием CTCAE 3 или более тяжелой диареи, кожной сыпи/акне+, стоматита+ и паронихии+(0.0)

1. 'LUX-Lung 4: BIBW 2992 (Афатиниб) Фаза I испытания в пациентах с продвинутым не малобольшой клеточным раком легких & Фаза II испытания в пациентах с не малобольшой клеточным раком легких, не отвечающих на Эрлотиниб или Гевитиниб' завершено фаза2 https://clinicaltrials.gov/study/NCT00711594

Описание: Основным показателем был объективный показатель ответа (ORR), оцененный по критериям RECIST 1.1.

Население: 62

Время: Посещение для скрининга

описание группы:BIBW 50 мг (Фаза II) измерение:Объективный показатель ответа (ORR), оцененный по критериям RECIST 1.1 (28.333333333333336)

измерение:Продолжительность ответа (DoR) в месяцах(10.5)

измерение:Прогрессия свободного выживания (PFS) в месяцах(4.1)

измерение:Общее выживание (OS) в месяцах(12.3)

Описание: Вторичные показатели включали безопасность и переносимость BIBW 2992.

Население: 62

Время: Посещение для скрининга

описание группы:BIBW 50 мг (Фаза II) измерение:Отчеты о нежелательных

явлениях (AEs)(56.0)

измерение:Нежелательные явления 3 или более тяжелой степени (14.0)

измерение:Нежелательные явления, связанные с лечением (32.0)

измерение:Снижение дозы из-за нежелательных явлений (10.0)

измерение:Прекращение лечения из-за нежелательных явлений (4.0)

Описание: Вторичный показатель включал обзор результатов теста на мутации EGFR.

Население: 62

Время: Посещение для скрининга

описание группы:BIBW 50 мг (Фаза II) измерение:Тест на мутацию EGFR (местный или центральный)(56.0)

измерение:Положительный (45.0)

измерение:Del19 (22.0)

измерение:Del19 + L858R (1.0)

измерение:Del19 + T790M (1.0)

измерение:Del19 + Другое (1.0)

измерение:L858R (15.0)

измерение:L858R + T790M (1.0)

измерение:L858R + Другое (3.0)

измерение:L861Q (1.0)

измерение:Отрицательный (11.0)

Выбранные научные статьи:

Афатиниб показал частичное восстановление иммунодепрессивного-подобного транскрипционного сигнатуры в резистентном NSCLC [1]. Афатиниб показал эффективность в пожилых пациентах с мутацией EGFR рака легких [2]. Афатиниб одобрен для первичного лечения в продвинутом EGFR мутации положительных NSCLC [3].

[1] EGFR and IRE1α pathways are associated with distinct immunomodulatory gene expression profiles in NSCLC cells with acquired resistance to EGFR TKIs. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41672191

[2] Efficacy and safety findings of the EXTRA study in older adult EGFR-mutant lung cancer patients receiving afatinib as first-line treatment. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41673455

[3] Prospective Observational Real-World Study of Afatinib as First-Line Treatment in Patients with Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Mutation-Positive Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) in China. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41736995