



Разделы теории



Главная (/) > Окружность. Основные теоремы

Окружность. Основные теоремы



1. Читай полную теорию



2. Вникай в доказательства



3. Применяй на практике



ШКОЛКОВО

Онлайн-марафоны «Школково»

**Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ
и олимпиадам**



Стримы



Домашка



Видеоуроки

(https://shkolkovo.online/landings/?utm_source=shkolkovonet&utm_medium=banner1)



Центральные и вписанные углы

Определения

Центральный угол – это угол, вершина которого лежит в центре окружности.

Вписанный угол – это угол, вершина которого лежит на окружности.



(//shkolkovo.net/)




Градусная мера дуги окружности – это градусная мера центрального угла, который на неё опирается.

Теорема

Градусная мера вписанного угла равна половине градусной меры дуги, на которую он опирается.

Доказательство

Доказательство проведём в два этапа: сначала докажем справедливость утверждения для случая, когда одна из сторон вписанного угла содержит диаметр. Пусть точка B – вершина вписанного угла ABC и BC – диаметр окружности:



Треугольник AOB – равнобедренный, $AO = OB$, $\angle AOC$ – внешний, тогда $\angle AOC = \angle OAB + \angle ABO = 2\angle ABC$, откуда $\angle ABC = 0,5 \cdot \angle AOC = 0,5 \cdot \overset{\frown}{AC}$.

Теперь рассмотрим произвольный вписанный угол ABC . Проведём диаметр окружности BD из вершины вписанного угла. Возможны два случая:

1) диаметр разрезал угол на два угла $\angle ABD, \angle CBD$ (для каждого из которых теорема верна по доказанному выше, следовательно верна и для исходного угла, который является суммой этих двух и значит равен полусумме дуг, на которые они опираются, то есть равен половине дуги, на которую он опирается). Рис. 1.

2) диаметр не разрезал угол на два угла, тогда у нас появляется ещё два новых вписанных угла $\angle ABD, \angle CBD$, у которых сторона содержит диаметр, следовательно, для них теорема верна, тогда верна и для исходного угла (который равен разности этих двух углов, значит, равен полуразности дуг, на которые они опираются, то есть равен половине дуги, на которую он опирается). Рис. 2.




рис. 1




рис. 2

Следствия

1. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны.
2. Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, прямой.
3. Вписанный угол равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

Касательная к окружности

Определения

Существует три типа взаимного расположения прямой и окружности:

- 1) прямая **a** пересекает окружность в двух точках. Такая прямая называется секущей. В этом случае расстояние **d** от центра окружности до прямой меньше радиуса **R** окружности (рис. 3).
- 2) прямая **b** пересекает окружность в одной точке. Такая прямая называется касательной, а их общая точка **B** – точкой касания. В этом случае $d = R$ (рис. 4).
- 3) прямая **c** не имеет общих точек с окружностью (рис. 5).






рис. 3



рис. 4



рис. 5

Теорема


1. Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведенному в точку касания.
2. Если прямая проходит через конец радиуса окружности и перпендикулярна этому радиусу, то она является касательной к окружности.

Следствие

Отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны.

Доказательство

Проведем к окружности из точки K две касательные KA и KB :



Значит, $OA \perp KA$, $OB \perp KB$ как радиусы. Прямоугольные треугольники $\triangle KAO$ и $\triangle KBO$ равны по катету и гипотенузе, следовательно, $KA = KB$.

Следствие

Центр окружности O лежит на биссектрисе угла AKB , образованного двумя касательными, проведенными из одной точки K .


[\(//shkolkovo.net/\)](https://shkolkovo.net/)


Разделы теории


Теоремы, связанные с углами

Теорема об угле между секущими

Угол между двумя секущими, проведенными из одной точки, равен полуразности градусных мер большей и меньшей высекаемых ими дуг.

Доказательство

Пусть M – точка, из которой проведены две секущие как показано на рисунке:



Покажем, что $\angle DMB = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{BD} - \overset{\frown}{CA})$.

$\angle DAB$ – внешний угол треугольника MAD , тогда $\angle DAB = \angle DMB + \angle MDA$, откуда $\angle DMB = \angle DAB - \angle MDA$, но углы $\angle DAB$ и $\angle MDA$ – вписанные, тогда $\angle DMB = \angle DAB - \angle MDA = \frac{1}{2} \overset{\frown}{BD} - \frac{1}{2} \overset{\frown}{CA} = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{BD} - \overset{\frown}{CA})$, что и требовалось доказать.

Теорема об угле между пересекающимися хордами


Угол между двумя пересекающимися хордами равен полусумме градусных мер высекаемых ими дуг:

$$\angle CMD = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{CD})$$

Доказательство

$\angle BMA = \angle CMD$ как вертикальные.





Из треугольника AMD :

$$\angle AMD = 180^\circ - \angle BDA - \angle CAD = 180^\circ - \frac{1}{2} \overset{\frown}{AB} - \frac{1}{2} \overset{\frown}{CD}.$$

Но $\angle AMD = 180^\circ - \angle CMD$, откуда заключаем, что

$$\angle CMD = \frac{1}{2} \cdot \overset{\frown}{AB} + \frac{1}{2} \cdot \overset{\frown}{CD} = \frac{1}{2} (\overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{CD}).$$


Теорема об угле между хордой и касательной

Угол между касательной и хордой, проходящей через точку касания, равен половине градусной меры дуги, стягиваемой хордой.

Доказательство

Пусть прямая a касается окружности в точке A , AB – хорда этой окружности, O – её центр.

Пусть прямая, содержащая OB , пересекает a в точке M . Докажем, что $\angle BAM = \frac{1}{2} \cdot \overset{\frown}{AB}$.



Обозначим $\angle OAB = \alpha$. Так как OA и OB – радиусы, то $OA = OB$ и $\angle OBA = \angle OAB = \alpha$. Таким образом, $\overset{\frown}{AB} = \angle AOB = 180^\circ - 2\alpha = 2(90^\circ - \alpha)$.

Там же OA — радиус, проведённый к точке касания, то $OA \perp MA$, следовательно, $\angle BAM = 90^\circ - \angle OAB = 90^\circ - \alpha = \frac{1}{2} \cdot \overset{\frown}{AB}$.


Теорема о дугах, стягиваемых равными хордами

Равные хорды стягивают равные дуги, меньшие полуокружности.

И наоборот: равные дуги стягиваются равными хордами.

Доказательство

1) Пусть $AB = CD$. Докажем, что меньшие полуокружности дуги $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$.



$\triangle AOB = \triangle COD$ по трем сторонам, следовательно, $\angle AOB = \angle COD$. Но т.к. $\angle AOB, \angle COD$ — центральные углы, опирающиеся на дуги $\overset{\frown}{AB}, \overset{\frown}{CD}$ соответственно, то $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$.


2) Если $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$, то $\triangle AOB = \triangle COD$ по двум сторонам $AO = BO = CO = DO$ и углу между ними $\angle AOB = \angle COD$. Следовательно, и $AB = CD$.

Теорема

Если радиус делит хорду пополам, то он ей перпендикулярен.

Верно и обратное: если радиус перпендикулярен хорде, то точкой пересечения он делит ее пополам.



**Доказательство**

1) Пусть $AN = NB$. Докажем, что $OQ \perp AB$.

Рассмотрим $\triangle AOB$: он равнобедренный, т.к. $OA = OB$ – радиусы окружности. Т.к. ON – медиана, проведенная к основанию, то она также является и высотой, следовательно, $ON \perp AB$.

2) Пусть $OQ \perp AB$. Докажем, что $AN = NB$.

Аналогично $\triangle AOB$ – равнобедренный, ON – высота, следовательно, ON – медиана. Следовательно, $AN = NB$.

Теоремы, связанные с длинами отрезков

Теорема о произведении отрезков хорд

Если две хорды окружности пересекаются, то произведение отрезков одной хорды равно произведению отрезков другой хорды.


Доказательство

Пусть хорды AB и CD пересекаются в точке E .





Разделы теории



Рассмотрим треугольники ADE и CBE . В этих треугольниках углы 1 и 2 равны, так как они вписанные и опираются на одну и ту же дугу BD , а углы 3 и 4 равны как вертикальные. Треугольники ADE и CBE подобны (по первому признаку подобия треугольников).


Тогда $\frac{AE}{EC} = \frac{DE}{BE}$, откуда $AE \cdot BE = CE \cdot DE$.

Теорема о касательной и секущей

Квадрат отрезка касательной равен произведению секущей на ее внешнюю часть.

Доказательство

Пусть касательная проходит через точку M и касается окружности в точке A . Пусть секущая проходит через точку M и пересекает окружность в точках B и C так что $MB < MC$. Покажем, что $MB \cdot MC = MA^2$.



Математика ЕГЭ
Рассмотрим треугольники

и $\triangle MCA$: $\angle M$ – общий, $\angle BCA = \angle BMA$. По теореме

об угле между касательной и секущей, $\angle BMA = \angle BCA$. Таким образом, треугольники $\triangle MBA$ и $\triangle MCA$ подобны по двум углам.


Разделы теории

Из подобия треугольников $\triangle MBA$ и $\triangle MCA$ имеем: $\frac{MB}{MA} = \frac{MA}{MC}$, что равносильно

$$MB \cdot MC = MA^2.$$

Следствие

Произведение секущей, проведённой из точки O , на её внешнюю часть не зависит от выбора секущей, проведённой из точки O :



$$OA \cdot OC = OB \cdot OD$$



(<https://vk.com/shkolko.net>) (<https://www.youtube.com/channel/UCxWeAHyOBQWsw8jZhxV>)

Будь в курсе!

Мы в соц. сетях



Индивидуальное обучение

КУРСЫ ШКОЛКОВО

(<https://moscow.shkolko.net/>)



Математический турнир

ШКОЛКОВО БАТТЛ

(<https://battle.shkolko.net/>)



© 2024 Все права защищены | Карта сайта (/sitemap)

Политика конфиденциальности (<https://shkolko.net/politika-konfidencialnosti>)

Пользовательское соглашение (/media/files/oferta_shkolko.net.pdf)