

Лекция 9

Приложения двойного и тройного интеграла.

Геометрические приложения двойного интеграла.

1. Площадь плоской фигуры (рис. 9.1)




Рис. 9.1.

$$S = \iint_D dx dy$$

2. Объем цилиндрического тела (рис. 9.2)




Рис. 9.2.

$$V = \iint_D (z_2(x, y) - z_1(x, y)) dx dy$$

Пример 1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной графиками функций $y = x^2$, $y = 2x + 3$ (рис. 9.3)

$$\begin{aligned} S &= \iint_D dx dy = \int_{-1}^3 dx \int_{x^2}^{2x+3} dy = \int_{-1}^3 y \Big|_{x^2}^{2x+3} dx = \int_{-1}^3 (2x + 3 - x^2) dx = \\ &= \left(x^2 + 3x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^3 = (9 + 9 - 9) - \left(1 - 3 + \frac{1}{3} \right) = \frac{32}{3} \end{aligned}$$




Рис. 9.3.

Пример 2. Вычислить площадь области, ограниченной графиками функций $y = \sin x$, $y = \cos x$, $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$




Рис. 9.4.

$$S = \iint_D dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} dx \int_{\cos x}^{\sin x} dy =$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (\sin x - \cos x) dx =$$

$$= (-\cos x - \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

Пример 3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной лемнискатой Бернулли $r = 2\sqrt{\cos 2\varphi}$ (рис. 9.5).




Рис. 9.5.

$$S = \iint_D dx dy = 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2\sqrt{\cos 2\varphi}} r dr =$$

$$= 2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{r^2}{2} \right) \Big|_0^{2\sqrt{\cos 2\varphi}} d\varphi =$$

$$= 2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2 \cos 2\varphi d\varphi = 2 \sin 2\varphi \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = 4$$

Пример 4. Вычислить объем тела, ограниченного цилиндром $y = x^2$ и плоскостями $z = 0$, $y + z = 4$ (рис. 9.6).




Рис. 9.6.

$$\begin{aligned} V &= \iint_D z(x, y) dx dy = \int_0^4 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} (4 - y) dx = \\ &= \int_0^4 (4 - y) x \Big|_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy = \int_0^4 (4 - y) 2\sqrt{y} dy = \\ &= \int_0^4 (8\sqrt{y} - 2y\sqrt{y}) dy = \end{aligned}$$

$$= \left(8 \cdot \frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} - 2 \cdot \frac{2}{5} y^{\frac{5}{2}} \right) \Big|_0^4 = 8 \cdot \frac{16}{3} - 32 \cdot \frac{4}{5} = \frac{256}{15}$$

Пример 5. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями: $z = 1 + x^2 + y^2$, $z = 3 - x^2 - y^2$ (рис. 9.7).




Рис. 9.7.

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (z_2(x, y) - z_1(x, y)) dx dy = \\ &= \iint_D (3 - x^2 - y^2 - (1 + x^2 + y^2)) dx dy = \\ &= 2 \iint_D (1 - x^2 - y^2) dx dy = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (1 - r^2) r dr = 2 \cdot 2\pi \cdot \int_0^1 (r - r^3) dr = \\ &= 4\pi \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^1 = 4\pi \cdot \frac{1}{4} = \pi \end{aligned}$$

Пример 6. Вычислить объем области, заданной системой неравенств:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 4 \\ z^2 \geq x^2 + y^2 \end{cases}$$




Рис. 9.8.

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (z_2(x, y) - z_1(x, y)) dx dy = \\ &= \iint_D (2 + \sqrt{4 - x^2 - y^2} - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (2 + \sqrt{4 - r^2} - r) r dr = \\ &= 2\pi \left(\int_0^2 (2r - r^2) dr + \int_0^2 \sqrt{4 - r^2} \cdot r dr \right) = 2\pi \left(\left(r^2 - \frac{r^3}{3} \right) \Big|_0^2 - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{4 - r^2} d(4 - r^2) \right) = 2\pi \left(4 - \frac{8}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (4 - r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 \right) = \\ &= 2\pi \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{3} \cdot 8 \right) = 8\pi \end{aligned}$$

Механические приложения двойного интеграла.

Если область D расположена на плоскости xOy и по области распределена масса так, что плотность ρ в каждой точке $M(x, y)$, принадлежащей области D , известна как функция координат точки:

$$\rho = \rho(x, y)$$

то масса области (пластины) вычисляется по формуле

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$$

Статические моменты пластины относительно координатных осей Ox и Oy соответственно равны

$$m_x = \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

$$m_y = \iint_D x \rho(x, y) dx dy$$

а координаты центра масс C пластины вычисляются по формулам

$$x_c = \frac{m_y}{m}, y_c = \frac{m_x}{m}$$

Моменты инерции пластины относительно координатных осей Ox и Oy и момент инерции относительно начала координат также вычисляются с помощью двойного интеграла:

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) dx dy$$

$$I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) dx dy$$

$$I_o = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) dx dy = I_x + I_y$$

Заметим, что, моменты инерции пластины относительно начала координат I_o и относительно оси Oz I_z совпадают: $I_z = I_o = I_x + I_y$.

Рассмотрим примеры.

Пример 1. Вычислить координаты центра масс однородной пластины ($\rho(x, y) = 1$) ограниченной параболой $y = 2x^2$ и прямой $y = 2$ (рис. 9.9).




Рис. 9.9.

Вычислить также момент инерции этой пластины относительно координатных осей и относительно начала координат.

$$m = S = \iint_D dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{2x^2}^2 dy =$$

$$= \int_{-1}^1 (2 - 2x^2) dx = \left(2x - 2 \cdot \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{8}{3}$$

В силу симметрии относительно оси Oy и однородности пластины, абсцисса центра масс $x_c = 0$. Для определения ординаты центра масс вычислим статический момент относительно оси Ox :

$$\begin{aligned} m_x &= \iint_D y dx dy = \int_0^2 dy \int_{-\sqrt{\frac{y}{2}}}^{\sqrt{\frac{y}{2}}} y dx = \int_0^2 y x \Big|_{-\sqrt{\frac{y}{2}}}^{\sqrt{\frac{y}{2}}} dy = \int_0^2 y \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{y}{2}} dy = \\ &= \sqrt{2} \int_0^2 y^{\frac{3}{2}} dy = \sqrt{2} \left(\frac{2}{5} y^{\frac{5}{2}} \right) \Big|_0^2 = \sqrt{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot 4\sqrt{2} = \frac{16}{5} \\ y_c &= \frac{m_x}{m} = \frac{16}{5} \cdot \frac{3}{8} = \frac{6}{5}, \quad C \left(0; \frac{6}{5} \right) \end{aligned}$$

Вычислим моменты инерции относительно осей координат и относительно начала координат:

$$\begin{aligned} I_x &= \iint_D y^2 dx dy = \int_0^2 dy \int_{-\sqrt{\frac{y}{2}}}^{\sqrt{\frac{y}{2}}} y^2 dx = \int_0^2 y^2 \sqrt{2y} dy = \left(\sqrt{2} \cdot \frac{2}{7} \cdot y^{\frac{7}{2}} \right) \Big|_0^2 = \frac{32}{7} \\ I_y &= \iint_D x^2 dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{2x^2}^2 x^2 dy = \int_{-1}^1 x^2 y \Big|_{2x^2}^2 dx = \int_{-1}^1 x^2 (2 - 2x^2) dx = \\ &= 2 \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{8}{15} \\ I_o &= I_x + I_y = \frac{32}{7} + \frac{8}{15} = \frac{536}{105} \end{aligned}$$

Пример 2. Вычислить координаты центра масс однородной пластины ($\rho(x, y) = 1$), ограниченной кардиоидой $r = 1 + \cos \varphi$ (рис. 9.10).

Т.к. кардиоида симметрична относительно оси Ox и пластина однородна, ее центр масс находится на оси Ox ($y_c = 0$). Вычислим массу пластины:




Рис. 9.10.

$$m = S = \iint_D dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{1+\cos\varphi} r dr =$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^2}{2} \right) \Big|_0^{1+\cos\varphi} d\varphi =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(1 + 2 \cos \varphi + \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right) d\varphi = \frac{3\pi}{2}$$

Вычислим статический момент пластины относительно оси Oy :

$$m_y = \iint_D x dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{1+\cos\varphi} r \cos \varphi r dr = \int_0^{2\pi} \cos \varphi \left(\frac{r^3}{3} \right) \Big|_0^{1+\cos\varphi} d\varphi =$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \cos \varphi (1 + 3 \cos \varphi + 3 \cos^2 \varphi + \cos^3 \varphi) d\varphi$$

$$\int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} d\varphi = \left(\frac{1}{2} \varphi + \frac{\sin 2\varphi}{4} \right) \Big|_0^{2\pi} = \pi$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^3 \varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} (1 - \sin^2 \varphi) d(\sin \varphi) = \left(\sin \varphi - \frac{\sin^3 \varphi}{3} \right) \Big|_0^{2\pi} = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^4 \varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi =$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \left(1 + 2 \cos 2\varphi + \frac{1 + \cos 4\varphi}{2} \right) d\varphi = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} \varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{3\pi}{4}$$

$$m_y = \frac{1}{3} \left(3\pi + \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{5\pi}{4}$$

$$x_c = \frac{m_y}{m} = \frac{5\pi}{4} \cdot \frac{2}{3\pi} = \frac{5}{6}, \quad C\left(\frac{5}{6}; 0\right)$$

Пример 3. Вычислить координаты центра масс однородной пластины ($\rho(x, y) = 1$), ограниченной дугой эллипса




Рис. 9.11.

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

и осями координат (область расположена в первой четверти, рис. 9.11). Вычислить также моменты инерции пластины относительно осей Ox , Oy и относительно начала координат.

Воспользуемся обобщенными полярными координатами:

$$x = 3r \cos \varphi, y = 2r \sin \varphi, \varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$$

Якобиан этого отображения $I = 6r$.

Уравнение эллипса в этих координатах имеет наиболее простой вид: $r = 1$.

$$m = S = \iint_D dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 6r dr = \frac{3\pi}{2}$$

$$m_x = \iint_D y dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 2r \sin \varphi \cdot 6r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 12r^2 dr = 4$$

$$m_y = \iint_D x dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 3r \cos \varphi \cdot 6r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^1 18r^2 dr = 6$$

$$x_c = \frac{m_y}{m} = \frac{4}{\pi}, \quad y_c = \frac{m_x}{m} = \frac{8}{3\pi}, \quad C\left(\frac{4}{\pi}; \frac{8}{3\pi}\right)$$

$$I_x = \iint_D y^2 dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 4r^2 \sin^2 \varphi \cdot 6r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^1 24r^3 dr = \frac{3\pi}{2}$$

$$I_y = \iint_D x^2 dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 9r^2 \cos^2 \varphi \cdot 6r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^1 54r^3 dr = \frac{27\pi}{8}$$

$$I_o = I_x + I_y = \frac{3\pi}{2} + \frac{27\pi}{8} = \frac{39\pi}{8}$$

Пример 4. Вычислить координаты центра масс пластины, ограниченной окружностью

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1$$

если плотность пластины в каждой точке пропорциональна расстоянию от этой точки до начала координат (рис. 9.12)

$$\rho(x, y) = k\sqrt{x^2 + y^2}$$

где k – коэффициент пропорциональности. Воспользуемся полярными координатами и запишем уравнение окружности в полярных координатах:




Рис. 9.12.

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 = 2x, \quad r^2 = 2r \cos \varphi, \quad r = 2 \cos \varphi$$

$$\varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$$

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} kr \cdot r dr =$$

$$= k \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left. \frac{r^3}{3} \right|_0^{2 \cos \varphi} d\varphi = \frac{k}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 8 \cos^3 \varphi d\varphi = \frac{8k}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \varphi) d(\sin \varphi) =$$

$$= \frac{8k}{3} \left(\sin \varphi - \frac{\sin^3 \varphi}{3} \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{32k}{9}$$


Центр масс пластины принадлежит оси Ox , т.к. область симметрична относительно этой оси и функция $\rho(x, y)$ является четной относительно переменной y ($y_c = 0$).

$$m_y = \iint_D x \rho(x, y) dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} r \cos \varphi \cdot kr \cdot r dr =$$

$$\begin{aligned}
&= k \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \left(\frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^{2 \cos \varphi} d\varphi = 4k \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \varphi d\varphi = 4k \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \varphi)^2 d(\sin \varphi) \\
&= [t = \sin \varphi] = 4k \int_{-1}^1 (1 - 2t^2 + t^4) dt = 4k \left(t - \frac{2t^3}{3} + \frac{t^5}{5} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{64k}{15} \\
&x_c = \frac{m_y}{m} = \frac{64k}{15} : \frac{32k}{9} = \frac{6}{5}, \quad C \left(\frac{6}{5}, 0 \right)
\end{aligned}$$

Геометрические приложения тройного интеграла.

Объем тела V равен тройному интегралу по области V (рис. 9.13)



$$V = \iiint_V dx dy dz$$

При вычислении объемов круглых тел применяют цилиндрические или сферические координаты. Рассмотрим примеры.

Рис. 9.13.

Пример 1. Вычислить объем тетраэдра, ограниченного плоскостью $3x + y + 2z = 6$ и координатными плоскостями $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ (рис. 9.14).




Рис. 9.14.

$$\begin{aligned}
V &= \iiint_V dx dy dz = \\
&= \int_0^2 dx \int_0^{6-3x} dy \int_0^{\frac{6-3x-y}{2}} dz = \\
&= \int_0^2 dx \int_0^{6-3x} \frac{6-3x-y}{2} dy =
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^2 dx \int_0^{6-3x} ((6-3x) - y) dy = \frac{1}{2} \int_0^2 \left((6-3x)y - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{6-3x} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{(6-3x)^2}{2} dx = \frac{9}{4} \int_0^2 (x-2)^2 dx = 6$$

Проверьте результат, пользуясь формулой для вычисления объема тетраэдра:

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

Пример 2. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностью $2z = x^2 + y^2$ и плоскостью $z = 2$ (рис. 9.15).




Рис. 9.15.

Воспользуемся цилиндрическими координатами и перепишем уравнение поверхности: $2z = r^2$, $z = \frac{r^2}{2}$.

$$\begin{aligned} V &= \iiint_V dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 dr \int_{\frac{r^2}{2}}^2 r dz = \\ &= 2\pi \int_0^2 r z \Big|_{r^2/2}^2 dr = 2\pi \int_0^2 r \left(2 - \frac{r^2}{2} \right) dr = \\ &= 2\pi \left(r^2 - \frac{r^4}{8} \right) \Big|_0^2 = 4\pi \end{aligned}$$

Пример 3. Вычислить объем полушара $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, $z \geq 0$ (рис. 9.16)

Воспользуемся сферическими координатами r, φ, θ :




Рис. 9.16.

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

$$0 \leq r \leq 1, \quad I = r^2 \cos \theta$$

$$V = \iiint_V dx dy dz =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \cos \theta dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^1 r^2 dr =$$

$$= 2\pi \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

Механические приложения тройного интеграла.

Тройной интеграл применяется для вычисления массы и координат центра масс трехмерного тела, а также для вычисления моментов инерции и других физических величин. Если $\rho(x, y, z)$ – плотность тела, заполняющего область V трехмерного пространства, то масса тела m равна:

$$m = \iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz$$

Статические моменты тела относительно координатных плоскостей yOz , xOz и xOy вычисляются соответственно по формулам:

$$m_{yz} = \iiint_V x \rho(x, y, z) dx dy dz$$

$$m_{xz} = \iiint_V y \rho(x, y, z) dx dy dz$$

$$m_{xy} = \iiint_V z \rho(x, y, z) dx dy dz$$

а координаты центра масс тела равны:

$$x_c = \frac{m_{yz}}{m}, \quad y_c = \frac{m_{xz}}{m}, \quad z_c = \frac{m_{xy}}{m}$$

Рассмотрим примеры.

Пример 1. Вычислить координаты центра масс однородного тетраэдра, ограниченного плоскостями $3x + y + 2z = 6, x = 0, y = 0, z = 0$ (рис. 9.14).

Значение постоянной плотности ρ не влияет на положение центра масс тела, поэтому будем считать $\rho = 1$. Тогда $m = V = 6$. Вычислим m_{yz} :

$$m_{yz} = \iiint_V x dx dy dz = \int_0^2 dx \int_0^{6-3x} dy \int_0^{\frac{6-3x-y}{2}} x dz = \frac{9}{4} \int_0^2 x(x-2)^2 dx =$$

$$= \frac{9}{4} \left(\frac{x^4}{4} - \frac{4x^3}{3} + 2x^2 \right) \Big|_0^2 = 3$$

$$x_c = \frac{m_{yz}}{m} = \frac{1}{2}$$

Проверьте самостоятельно:

$$m_{xz} = 9, m_{xy} = \frac{9}{2}, y_c = \frac{m_{xz}}{m} = \frac{3}{2}, z_c = \frac{m_{xy}}{m} = \frac{3}{4}, \quad C\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; \frac{3}{4}\right)$$

Как известно, центр масс однородного тетраэдра совпадает с серединой отрезка, соединяющего середины противоположных ребер тетраэдра.

Пусть M – середина ребра AO , N – середина ребра BD . $M(1; 0; 0), N\left(0, 3, \frac{3}{2}\right), C\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; \frac{3}{4}\right)$. Результат, полученный интегрированием, совпадает с результатом, полученным геометрическим способом.

Пример 2. Вычислить координаты центра масс однородного тела ($\rho = 1$), ограниченного поверхностью $2z = x^2 + y^2$ и плоскостью $z = 2$ (рис. 9.15). Вычислить также момент инерции тела относительно оси Oz .

$$m = V = 4\pi$$

$$\begin{aligned} m_{xy} &= \iiint_V z \rho(x, y, z) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 dr \int_{\frac{r^2}{2}}^2 z r dz = \\ &= 2\pi \int_0^2 r \left(\frac{z^2}{2} \right) \Big|_{\frac{r^2}{2}}^2 dr = 2\pi \int_0^2 \left(2r - \frac{r^5}{8} \right) dr = 2\pi \left(r^2 - \frac{r^6}{48} \right) \Big|_0^2 = \frac{16\pi}{3} \\ z_c &= \frac{m_{xy}}{m} = \frac{16\pi}{3} : 4\pi = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

В силу однородности тела и его симметрии относительно оси Oz , центр масс C лежит на оси Oz .

$$C\left(0; 0; \frac{4}{3}\right)$$

Момент инерции тела, относительно оси Oz вычисляется по формуле:

$$I_z = \iiint_V (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

Применим эту формулу:

$$\begin{aligned}
I_z &= \iiint_V (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 dr \int_{\frac{r^2}{2}}^2 r^2 \cdot r dz = \\
&= 2\pi \int_0^2 r^3 z \Big|_{\frac{r^2}{2}}^2 dr = 2\pi \int_0^2 r^3 \left(2 - \frac{r^2}{2}\right) dr = 2\pi \left(\frac{r^4}{2} - \frac{r^6}{12}\right) \Big|_0^2 = \frac{16\pi}{3}
\end{aligned}$$

Пример 3. Вычислить координаты центра масс однородного полушара:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 1, \rho = 1 \text{ (рис. 9.16).}$$

Вычислить также момент инерции полушара относительно оси Oz .

Воспользуемся сферическими координатами:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \cos \theta, \\ z = r \sin \theta \end{cases} \quad I = r^2 \cos \theta,$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1$$

Т.к. в силу симметрии и однородности тела центр масс лежит на оси Oz ,
ВЫЧИСЛИМ

$$\begin{aligned}
m_{xy} &= \iiint_V z \rho(x, y, z) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r \sin \theta r^2 \cos \theta dr = \\
&= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4} \\
z_c &= \frac{m_{xy}}{m} = \frac{\pi}{4} : \frac{2\pi}{3} = \frac{3}{8}, \quad C\left(0, 0, \frac{3}{8}\right)
\end{aligned}$$

$$I_z = \iiint_V (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

Выразим подынтегральную функцию через сферические координаты:

$$\begin{aligned}
x^2 + y^2 &= (r \cos \varphi \cos \theta)^2 + (r \sin \varphi \cos \theta)^2 = r^2 \cos^2 \theta \\
I_z &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \cos^2 \theta \cdot r^2 \cos \theta dr = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \int_0^1 r^4 dr =
\end{aligned}$$

$$= \frac{2\pi}{5} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \theta) d(\sin \theta) = \frac{2\pi}{5} \left(\sin \theta - \frac{\sin^3 \theta}{3} \right) \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4\pi}{15}$$