

12 ТОНБАНХАНЬАМСО: АНТИРАК

Цена: 115 000 тенге

АнтиРак – это единственный в мире препарат на растительной основе, способный с высокой эффективностью лечить раковые заболевания. За годы клинических испытаний и применения препарата для лечения больных раком на Востоке, были выявлены его следующие характеристики:

95%-ный эффект в поддержании иммунологических показателей во время лечения онкологических заболеваний химическими и радиационными методами;

90%-ный эффект в предотвращении рецидива и метастаза у больных раком раннего и промежуточного периода после операции;

Эффект в лечении больных раком промежуточного периода при сочетании с радиационным облучением и химическими противораковыми средствами;

Эффект в улучшении состояния здоровья и продлении жизни больных раком последнего периода.



Сегодня АнтиРак, как биологически активная добавка, признан лучшим противораковым средством в мире.

Состав препарата и форма выпуска

АнтиРак состоит из полезных компонентов и биологически активных добавок, выделенных из корейского женьшеня, аралии и других лекарственных растений.

Один пакетик данного противоракового средства содержит:
Три вида полисахаридов, возобновляющих систему иммунитета организма (0,5 г);
Три вида противораковых экстрактов растительного происхождения (1,0 г);
Два вида растительных экстрактов, возобновляющих нервы, клетки и ткани (0,5 г);
Экстракты трёх целебных растений, способствующих успокоению, антиспазматическому процессу и обезболиванию (1,0 г.) и др.

Также в состав препарата входят дополнительные противораковые вещества, а именно: пять видов редких лекарственных растений и их экстракты, повышающие противораковый эффект препарата.

Форма выпуска:

АнтиРак выпускается в пакетиках. В пакетике содержаться растворимые гранулы. В каждом пакетике 4,5 грамм препарата. В одной упаковке АнтиРак 30 пакетиков, так как одна упаковка рассчитана на один месяц лечения.

Такая форма выпуска максимально удобна для применения и максимально выгодна в плане быстрого усвоения препарата.

Общее описание

Клинические и фармакологические преимущества препарата АнтиРак над другими противораковыми средствами

В современной медицине существует всего два подхода к лечению онкологических заболеваний:

Первый – основан на методах устранения признаков и результатов деятельности раковых заболеваний;

второй – направлен на усиление внутренних способностей организма, чтобы бороться с первопричиной болезни самостоятельно.

АнтиРак действует по второму принципу, но в результате его действия постепенно устраняются и симптомы, и последствия. При индивидуальном применении препарата АнтиРак на протяжении 2-3 месяцев избирательно инактивирует (уничтожает) опухолевые клетки в организме, повышает аппетит и увеличивает общий вес тела. Все это происходит *путем активирования внутренних резервов организма* через клетки и органы тела.

Если говорить проще, **АнтиРак** представляет собой **оригинальное комплексное онкологическое средство**, имеющее сильную противораковую эффективность и лекарственные способности, а именно:

способность повышения общего иммунитета (увеличение аппетита, веса тела); способность защищать организм от радиации и химических средств; *болеутоляющую*, спазмолитическую и успокаивающую способность.

Лечение с помощью препарата АнтиРак осуществляется на трёх стадиях.

Первая стадия: Стадия уменьшения размера опухоли и ослабления активности рака.

На первой стадии лечения, главной задачей ставится поддержания нормальных показателей крови путём применения препарата АнтиРак в сочетании с радиационным методом лечения.

Применение АнтиРака следует начинать за 5-10 дней до первого радиационного облучения и продолжать во время всего периода радиационного лечения.

После нескольких радиотерапий с применением АнтиРака можно переходить ко второй стадии лечения - химическими противораковыми средствами.

Курс лечения проводится именно в такой последовательности не случайно, ведь этим способом успешно лечат рак уже много лет. Химические и радиоактивные методы лечения одновременно применять не рекомендуется. Об этом знает любой опытный врач.

Вторая стадия: Стадия устранения остатков опухоли от радиационного лечения и сохранения состояния здоровья путём сочетания с химическими противораковыми средствами.

После первой стадии (радиационного облучения) организм отдыхает 10 дней, после чего и начинают вторую стадию лечения. Применяют химические противораковые средства в сочетании с 1-1,5 коробками АнтиРака для устранения остатков опухолей после радиационной терапии. Также с целью поддержания показателей крови на нормальном уровне и восстановления жизнедеятельности больного.



Именно на этой стадии большинство раковых клеток раннего и промежуточного периода уничтожаются. В некоторых случаях на второй стадии лечения можно применять только один АнтиРак без дополнительных химических препаратов, при этом эффект от лечения практически одинаковый.

Третья стадия: Стадия предотвращения рецидива и метастаза путем уничтожения (инактивации) опухолевых клеток в крови и лимфе с помощью одного только препарата АнтиРак. С этой целью препарат применяют продолжительно, 2-3 месяца (всего курс лечения может длиться от 3-х до 6 месяцев).

Такой метод лечения (в три стадии) можно применять для лечения всех больных раком, имеющих возможность получать радиационное облучение.

Для больных раком печени, желудка, прямой кишки, которые не могут получать радиационное облучение, применение препарата АнтиРак продлевает жизнь.

Для больных первого и второго периода, которые имеют возможность оперироваться, следует обязательно делать операцию, применяя при этом АнтиРак.

Дозирование:

2-3 упаковки для больных первого и второго периода без метастаза на лимфатические узлы
3-4 коробки для больных конца второго и раннего третьего периода с метастазом на лимфатические узлы.

При этом, в результате применения препарата АнтиРак, уничтожение опухолевых клеток в крови и лимфе предотвращают рецидив и метастаз в 90% случаев.

Применение АнтиРака на протяжении 2-3 месяцев у **больных раком третьего периода с метастазом на лимфатические узлы** приводит к инактивации раковых клеток и устранению метастаза. Вследствие этого болезнь перестает прогрессировать и возвращается ко второму периоду, что уже позволяет делать операцию.

Для больных, которые прошли радиационное облучение без операции, и лишены возможности применения химических противораковых средств, из-за снижения показателей крови, применение препарата АнтиРак также рекомендовано.

АнтиРак приводит к повышению уровня лейкоцитов и уничтожению раковых клеток в крови и лимфе (применять по одному пакетику в сутки в течение 1-3 месяцев после радиационного облучения).

При сочетании АнтиРака с другими противораковыми средствами эффективность лечения только повышается.

Для больных раком последнего периода, которые лишены возможности лечения радиационным облучением и химическими противораковыми средствами, тоже применяют АнтиРак. Сначала по одному пакетику (4,5г) в сутки в течение 2-3 месяцев. При этом, на первом месяце приема препарата наблюдается изменение размера опухоли в пределах на 10 % (увеличение или уменьшение), со второго месяца — уменьшение на 40%, улучшение состояния здоровья больного (повышение аппетита, увеличение веса тела и восстановление подвижности) и уничтожение раковых клеток в крови и лимфе.

Показания к применению



АнтиРак применяется как средство борьбы с онкологическими заболеваниями. Применяют как средство, защищающее организм от негативных последствий радиационной терапии и химических противораковых лекарств. И как вспомогательное средство, повышающее эффективность их действия.

Применяется для профилактики рецидива и метастаза, и для повышения аппетита и увеличения веса тела у больных после операции. Применение 1-2 упаковки АнтиРака до операции приводит к исчезновению метастаза на лимфатические узлы вокруг опухолей и приостановке изменения размера опухолей. Это способствует уменьшению участка операции и лучшему восстановлению. Применяют для лечения больных раком промежуточного периода, которые могут проходить радиационную терапию.

Применяется для лечения больных раком последнего периода, лишенных возможности операции или радиационного метода лечения, для восстановления активной жизнедеятельности и продления жизни.

Способ применения

АнтиРак применяют внутрь 1 пакетик (4,5г) в сутки, разделяя его на два раза – утром и вечером до еды с небольшим количеством воды, в зависимости от индивидуального состояния и степени лекарственной реакции на организм. В случае сильной лекарственной реакции, можно разделить суточную дозу (1 пакетик) на три раза – утром, днем, вечером. Или принимать два пакетика в три дня, а по мере снижения лекарственной реакции снова увеличивают суточную дозу до одного пакетика в сутки. АнтиРак рекомендуется принимать каждый день.

В случае появлении тошноты, лучше перенести время приема на 1,5-2 часа после еды.

Дополнительные противораковые вещества можно принимать с целью повышения эффективности препарата АнтиРак по уменьшению размера опухоли. При необходимости, принимают болеутоляющие и успокаивающие средства.

В результате лекарственной реакции, в первые 2-7 суток у больных после радиационного лечения могут наблюдаться такие симптомы: тошнота, головная боль, боль в области позвоночника, тяжесть в нижней части живота при раках прямой кишки и шейки матки, отёк (отёк наблюдается в случае дисфункции кровеносной системы, и устраняется постепенно с ходом лечения). Понос, который очень редко наблюдается в начале лечения, проходит в течение 5-7 дней.

С целью предотвращения рецидива и метастаза после выздоровления принимают одну упаковку АнтиРака в год, именно в то время, когда возник рак.

Применение АнтиРака 5 дней в месяц в течение полугода после третьей стадии лечения дает хороший профилактический эффект.

Также данный препарат можно использовать для внешнего воздействия на болезнь. После тщательной смеси с любым косметическим кремом, его прикладывают к месту возникновения опухоли. Это в значительной мере устраняет боль.

Примечания

Во время применения препарата АнтиРак не рекомендуется одновременно принимать дополнительные средства повышающие общий иммунитет, потому что такие средства



способствуют не только оживлению ткани и органов организма, но и увеличению и устойчивости рака. Это мешает выздоровлению.

Во время лечения, в рацион питания больного следует включить: морскую капусту, ламинарию, бобы, рыбу и овощи. И наоборот, исключить: курицу, яйца, свинину, баранину и другие мясные продукты.

Только через 2-3 месяца после выздоровления можно питаться любыми видами мяса и другими тонизирующими средствами.

Нужно всегда поддерживать хорошее настроение и веру на положительный исход лечения. При острой гипертонии, гипотонии и сердечных болезнях одновременное применение препарата АнтиРак и химических противораковых средств, желательно проводить под наблюдением врача.

Тонбанханьамсо выпускается в пакетиках. В пакетики содержатся растворимые гранулы. В каждом пакетики 4,5 грамма препарата. В одной упаковке - 30 пакетиков, так как одна упаковка рассчитана на один месяц лечения. Применять по 12; содержимого пакета утром и 12; пакета; вечером, либо по назначению врача.

Лечение пациентов осуществляется на всех стадиях заболевания.

Первая стадия: при применении только данного препарата достигается уменьшение размера опухоли, предотвращается развитие метастазов, улучшается общее состояние, нормализуются показатели крови.

При сочетании с химио или радиотерапией можно ожидать уменьшения опухоли, уменьшения побочных эффектов от химио или радиотерапии.

Применение данного препарата следует начинать за 5-10 дней до первой процедуры химио или радио облучения и продолжать во время всего периода лечения. Длительность приёма от 3 до 6 месяцев в зависимости от расположения, характера течения, размера опухоли и сопутствующих заболеваний.

Вторая стадия: уменьшение размера или полное рассасывание опухоли, поддержание в норме показателей крови, восстановление функций внутренних органов.

В этот период уничтожаются оставшиеся атипичные клетки. Как правило на второй стадии лечения можно применять только Тонбанханьамсо без дополнительных химических препаратов, при этом эффект от лечения одинаково высок.

Третья стадия: предотвращение рецидива и метастазов за счёт гармоничной работы всех органов и систем, в том числе адекватная реакция иммунной системы.

С этой целью препарат применяют 1-3 месяца (всего курс лечения может длиться от 3 х до 6 месяцев).

Для профилактики онкологических заболеваний можно применять 1 коробку (30 пакетиков) один раз в 5 лет.

Такой метод лечения (в три стадии) можно применять для лечения всех онкольных, даже не имеющих возможности получать химио или радиотерапию.

Применение Тонбанханьамсо на протяжении 2-3 месяцев у онкольных в третьем периоде с метастазами в лимфатические узлы восстановление происходит дольше.

