

4 ГИНКОБОНИН

Цена: 17 000 тенге

Раствор для внутримышечного введения

Состав:

Активное вещество. Экстракт Гинкго двулопастного листьев (флавонолгликозидов и гинкголидов-билобалидов)

Вспомогательное вещество: новокаин, спирт Вода для инъекции: до 2мл

Фармакотерапевтическая группа:

Ангиопротекторное средство растительного происхождения

Показания к применению:

Ишемия миокарда от дисфункции коронального кровотока в сердце, инфаркт миокарда

Атеросклероз и Гиперлипидемия

Тромбоз мозга от атеросклероза, нарушения зрения сосудистого генеза, снижение его остроты

Головокружение, нарушение слуха, шум в ушах, расстройства координации движений преимущественно сосудистого генеза, амнезия, когнитивный и нейросенсорный дефицит различного генеза (за исключением болезни Альцгеймера и деменции различной этиологии)

Онемение конечности от периферической дисфункции кровообращения, перемежающаяся хромота при хронических облитерирующих артериопатиях нижних конечностей (2 степени по Фонтэйну)

болезнь и синдром Рейно.

Фармакотерапевтическая группа:

Ангио протекторное средство растительного происхождения

Фармакологические свойства:

Экстракт Гинкго влияет на вазомоторные реакции кровеносных сосудов, ускоряет течение кровяных клеток и процессу обмена веществ в клетках.

Улучшает снабжение мозга кислородом и глюкозой и оказывает тормозящее влияние на фактор активации тромбоцитов.

Нормализует тонус артерий и вен, улучшает микроциркуляцию и способствует улучшению кровотока, препятствует агрегации эритроцитов.



Улучшает метаболические процессы, оказывает антигипоксическое действие на ткани и препятствует образованию свободных радикалов и перекисному окислению липидов клеточных мембран.

Воздействует на высвобождение, обратный захват и катаболизм нейромедиаторов (норадреналина, ацетилхолина, дофамина, серотонина) и на их способность к связыванию с мембранными рецепторами.

Фармакокинетика:

Гинкголиды А и В и билобалиды имеют биодоступность от 85% до 95% при внутримышечном приёме. Максимальная концентрация достигается через 15 мин. Период полувыведения составляет от 4 часов (гинкголид А и билобалид) до 10 часов (гинкголид В). Основной путь выведения — почки.

Противопоказания

Возраст до 18 лет. Повышенная чувствительность к любому из компонентов инъекции, эрозивный гастрит в стадии обострения, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, острые нарушения мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, пониженная свертываемость крови.

Способ применения и дозы

Внутримышечно по 2 Ампул в сутки или в 2 дня. Курс лечения составляет не менее 20 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

