

13 ТЕТРОДОКАИН / TETRODOKAIN

Цена: 22 500 тенге

Он изготавливается всего лишь несколькими странами в связи с ограниченной средой обитания рыбы, а также со сложностями выработки и очистки яда. В настоящее время растущий спрос на тетродокаин определен его лечебными свойствами, подтвержденными клиническими испытаниями при широком спектре заболеваний в течение нескольких десятилетий.

Состав: тетродотоксин - 120 международных единиц биологической активности на 1 ампулу, в одной упаковке 8 ампул по 2 мл.

Результаты клинических испытаний: доказан эффект подавления распространения злокачественной опухоли в 30% из 180 случаев заболевания саркомой, свыше 37,6% при раке печени; средство апробировано и показало хороший терапевтический результат при лечении нескольких видов раковых опухолей, в том числе носоглотки и горла. Тетродокаин используется также как обезболивающее средство в поздних стадиях рака, и имеет более продолжительный анестезирующий эффект по сравнению с такими анестетиками, как прокаин, дикаин, лидокаин, и т.п. Помимо этого, позитивный эффект достигнут при лечении кашля, коклюша, импотенции,

ночного энуреза, проказы, гипертонии, судорог, невралгии, контузий. Следует отметить, что замечательный терапевтический эффект получен при лечении туберкулеза, *используя только Тетродокаин*. Ожидается, что он будет признан лучшим противотуберкулезным средством 21 века.

Назначение:

1. Предупреждение и лечение рака.
2. Грипп, легочный туберкулез, бронхиальная астма, острый и хронический бронхит, катар верхних дыхательных путей, респираторные заболевания.
3. Послеоперационные боли, контузии, невралгия, артриты.
4. Импотенция.
5. Вирусные заболевания (включая СПИД).
6. Наркотическая зависимость.
7. Острые инфекционные заболевания.

Дозировка: впрыснуть 1 ампулу внутримышечно или в акупунктурную точку, 1 раз в день, в течение 5-8 дней. Дальнейший лечебный цикл может быть продолжен после 2-3 дней перерыва в случае отсутствия побочных симптомов. Для детей и людей пожилого возраста дозировка корректируется лечащим врачом.

Предупреждение: возможны симптомы типа липкого языка и губ, раздражения кончиков пальцев рук и ног, чувства сонливости. Эти симптомы считаются нормальной реакцией организма.

Хранение: в темном и прохладном месте в течение 3-х лет.

Производитель: KOREA JANGSAENG J.V. Co., г.Пхеньян, КНДР

