

В одной упаковке содержится 6 флакончиков по 2 г препарата (1 упаковка= 12 г).

АНГУНСАХЬЯНГ эффективно применяется в качестве «карманной» реанимации, а также рекомендуется на всех этапах восстановительного лечения.

Состав:

Специфические фракции из экстракта природного мускуса.

Фармакологическое действие:

Влияет на регенерацию нервных волокон, способствует их прорастанию в ткани, восстанавливает миелиновую оболочку. Регулирует мозговое кровообращение, улучшает взаимодействие между структурами головного мозга. Оказывает мягкое спазмолитическое и успокаивающее действие.

Показания к применению:

ишемический и геморрагический инсульт (3—5 курсов);

гипертоническая болезнь (1—3 курса);

нарушения речи различной этиологии (1—3 курса);

параличи и парезы (3—5 курсов);

мигрень и др. головная боль любой локализации (1—3 курса);

атеросклероз сосудов головного мозга (2—5 курсов);

заболевания сердца (ИБС, стенокардия, аритмия и др. 1—3 курса);

церебральный тромбоз (3—6 курсов);

черепно—мозговая травма, сотрясение головного мозга (1—4 курса);

переутомление после работы за компьютером (1 флакончик однократно);

быстрое восстановление после перенесённых инфекций (1 курс);

в качестве дополнительного средства при лечении тяжёлых инфекций (1—2 курса);

неотложная помощь в первые минуты инфаркта любой локализации (1 флакончик однократно);

как препарат скорой помощи при сильных алкогольных опьянениях (1 флакончик однократно, действие проявится через 30 мин.);

немедленный эффект у спортсменов при усталости, полное восстановление сил через 20—30 минут, продолжать соревнования можно через 10—15 минут (1 флакончик однократно, не является допингом). Рекомендуется применять за 10—15 минут до начала соревнований.



Способ применения:

1 флакончик (2г) делится при курсовом лечении на 4—10 частей. По назначению специалиста рекомендуется применять 2—4 раза в день, т.е. на 1 приём 0,2 г — 0,5 г, положить в рот и запить водой или растворить нужное количество лекарства в 1/3 столовой ложки тёплой воды. Желательно выпить до еды. После приёма препарата объём съедаемой пищи значительно уменьшить.

Обморок, шок – растворите 0,5 г в 1/3 столовой ложки теплой воды, приподнимите голову, раскройте пациенту рот и влейте лекарство. При необходимости повторите через 15—30 мин.

Гипертонический криз или сильная боль в сердце – рекомендуется иметь флакончик при себе, чтобы в случае необходимости принять лекарство до приезда доктора.

Если имеется большое количество хронических заболеваний, то в первое время самочувствие может немного ухудшиться, как при обострении, но быстро всё пройдёт. Приём препарата необходимо обязательно продолжить.

Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре соблюдая герметичность упаковки.

