

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Расчётно-графическая работа №2

(по дисциплине «Дополнительные главы
математического анализа»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
ДГМА 28.3, Р3231, 466449.

Проверил:

Богачёв Владимир Александрович



г. Санкт-Петербург, Россия
2025

1 Список задач

В рамках выполнения расчётно-графической работы по варианту №10 необходимо предоставить решения следующих задач:

1. Плоская область D ограничена заданными линиями:

$$y = \sqrt[3]{x}, \quad x = -\sqrt{y+2}, \quad y = 3x - 2$$

- (a) Сделайте схематический рисунок области D .
- (b) С помощью двойного интеграла найдите площадь области D .

2. Тело T ограничено заданными поверхностями:

$$z = 4 - x^2 - y^2, \quad 9z = -5(x^2 + y^2), \quad y = 0 \quad \text{при } y \leq 0$$

- (a) Сделайте схематический рисунок тела T .
- (b) С помощью тройного интеграла найдите объём тела T , перейдя к цилиндрическим или сферическим координатам.

3. С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги плоской материальной кривой, заданной уравнениями:

(a) $y = \frac{1}{x}, \quad \sqrt[4]{3} \leq x \leq \sqrt[4]{8}, \quad \rho(x, y) = \frac{6x^3}{y^2}$

(b) $\begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq \pi, \quad \rho(x, y) = 1$

4. С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги пространственной материальной кривой, заданной уравнениями:

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = 2t + 1 \end{cases}, \quad 6 \leq t \leq 20, \quad \rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{z^2 - x^2}}$$

5. Дано векторное поле \vec{a} и плоскость σ , пересекающая координатные плоскости по замкнутой ломаной $KLMK$, где K, L, M — точки пересечения плоскости σ координатными осями Ox, Oy, Oz соответственно:

$$\vec{a} = (3z - x)\vec{i} + (z - y)\vec{j}, \quad \sigma: x - 2y - z = -4$$

- (a) Найдите поток Q векторного поля \vec{a} через часть S плоскости σ , вырезанной координатными плоскостями, в сторону нормали \vec{n} , направленной от начала координат $O(0, 0, 0)$.
- (b) С помощью теоремы Остроградского-Гаусса найдите поток Q векторного поля \vec{a} через полную поверхность тетраэдра $OLMK$ в сторону внешней нормали.
- (c) Найдите циркуляцию C векторного поля \vec{a} по контуру $KLMK$, образованному пересечением плоскости σ с координатными плоскостями.

6. Дано векторное поле $\vec{a}(M)$:

$$\vec{a} = (1 + e^y)\vec{i} + (xe^y - e^z - 1)\vec{j} + (2 - ye^z)\vec{k}$$

- (a) Проверьте, является ли векторное поле соленоидальным или потенциальным.
- (b) Если поле потенциально, найдите его потенциал.

2 Решения задач

Задача 1. Плоская область D ограничена заданными линиями:

$$y = \sqrt[3]{x}, \quad x = -\sqrt{y+2}, \quad y = 3x - 2$$

(a) Сделайте схематический рисунок области D .


(b) С помощью двойного интеграла найдите площадь области D .

Решение. График кривой $y = \sqrt[3]{x}$ — кубическая парабола с инверсией относительно прямой $y = x$.

График кривой $x = -\sqrt{y+2}$ — левая ветвь параболы с центром в $(0, 2)$.

График кривой $y = 3x - 2$ — прямая, проходящая через т. $(0, -2)$ и $(1, 1)$.

Имеем рисунок области D , ограниченной заданными графиками:



Найдём площадь области D с помощью двойного интеграла по теореме Фубини:

$$\begin{aligned} S_D &= \iint_D d\Omega = \int_{-1}^0 dx \int_{x^2-2}^{\sqrt[3]{x}} dy + \int_0^1 dx \int_{3x-2}^{\sqrt[3]{x}} dy = \\ &= \int_{-1}^0 (\sqrt[3]{x} - x^2 + 2) dx + \int_0^1 (\sqrt[3]{x} - 3x + 2) dx = \\ &= \left(\frac{3}{4}(\sqrt[3]{x})^4 - \frac{x^3}{3} + 2x \right) \Big|_{-1}^0 + \left(\frac{3}{4}(\sqrt[3]{x})^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x \right) \Big|_0^1 = \\ &= -\frac{3}{4} - \frac{1}{3} + 2 + \frac{3}{4} - \frac{3}{2} + 2 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

Ответ:

$$S_D = \frac{13}{6}$$

Задача 2. Тело T ограничено заданными поверхностями:

$$z = 4 - x^2 - y^2, \quad 9z = -5(x^2 + y^2), \quad y = 0 \quad \text{при } y \leq 0$$

(a) Сделайте схематический рисунок тела T .


(b) С помощью тройного интеграла найдите объём тела T , перейдя к цилиндрическим или сферическим координатам.

Решение. График поверхности $z = 4 - x^2 - y^2$ — эллиптический параболоид с вершиной в точке $(0, 0, 4)$, направленный вниз.

График поверхности $9z = -5(x^2 + y^2)$ — эллиптический параболоид с вершиной в точке $(0, 0, 0)$, направленный вниз с сжатием в $\frac{9}{5}$ раз.

График поверхности $y = 0$ — плоскость xOz .

Имеем рисунок тела T , ограниченного заданными плоскостями (тело показано с дополнительными сечениями для лучшего понимания его формы):



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}: \begin{cases} x(r, \varphi, z) = r \cos \varphi \\ y(r, \varphi, z) = r \sin \varphi \\ z(r, \varphi, z) = z \end{cases} &\implies |J_{\mathcal{A}}| = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= r \cos \varphi \cos \varphi + r \sin \varphi \sin \varphi = r \end{aligned}$$

Найдём объём тела T с помощью тройного интеграла по теореме Фубини:

$$\begin{aligned} V_T &= \iiint_T dV = \int_{-5}^0 dz \int_{\sqrt{-\frac{9}{5}z}}^{\sqrt{4-z}} r dr \int_0^\pi d\varphi + \int_0^4 dz \int_0^{\sqrt{4-z}} r dr \int_0^\pi d\varphi = \\ &= \frac{\pi}{2} \left(\int_{-5}^0 r^2 \Big|_{\sqrt{-\frac{9}{5}z}}^{\sqrt{4-z}} dz + \int_0^4 r^2 \Big|_0^{\sqrt{4-z}} dz \right) = \frac{\pi}{2} \left(\int_{-5}^0 \left(4 + \frac{4}{5}z \right) dz + \int_0^4 (4 - z) dz \right) = \\ &= \frac{\pi}{2} \left(\left(4z + \frac{2}{5}z^2 \right) \Big|_{-5}^0 + \left(4z - \frac{z^2}{2} \right) \Big|_0^4 \right) = \frac{\pi}{2} (10 + 8) = 9\pi \end{aligned}$$

Итого:

$$\boxed{V_T = 9\pi}$$

Задача 3. С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги плоской материальной кривой, заданной уравнениями:

$$(a) \quad y = \frac{1}{x}, \quad \sqrt[4]{3} \leq x \leq \sqrt[4]{8}, \quad \rho(x, y) = \frac{6x^3}{y^2}$$

$$(b) \quad \begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq \pi, \quad \rho(x, y) = 1$$

Решение. ...

Задача 4. С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги пространственной материальной кривой, заданной уравнениями:

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = 2t + 1 \end{cases}, \quad 6 \leq t \leq 20, \quad \rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{z^2 - x^2}}$$

Решение. ...

Задача 5. Дано векторное поле \vec{a} и плоскость σ , пересекающая координатные плоскости по замкнутой ломаной $KLMK$, где K, L, M — точки пересечения плоскости σ координатными осями Ox, Oy, Oz соответственно:

$$\vec{a} = (3z - x)\vec{i} + (z - y)\vec{j}, \quad \sigma: x - 2y - z = -4$$

(a) Найдите поток Q векторного поля \vec{a} через часть S плоскости σ , вырезанной координатными плоскостями, в сторону нормали \vec{n} , направленной от начала координат $O(0, 0, 0)$.

(b) С помощью теоремы Остроградского-Гаусса найдите поток Q векторного поля \vec{a} через полную поверхность тетраэдра $OLMK$ в сторону внешней нормали.

(c) Найдите циркуляцию S векторного поля \vec{a} по контуру $KLMK$, образованному пересечением плоскости σ с координатными плоскостями.

Решение. ...

Задача 6. Дано векторное поле $\vec{a}(M)$:

$$\vec{a} = (1 + e^y)\vec{i} + (xe^y - e^z - 1)\vec{j} + (2 - ye^z)\vec{k}$$

(a) Проверьте, является ли векторное поле соленоидальным или потенциальным.

(b) Если поле потенциально, найдите его потенциал.

Решение. ...