

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Учебно-исследовательская работа №1

(по дисциплине «Моделирование»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
Моделирование 1.21, Р3331, 466449.

Проверил:

Бессмертный Игорь Александрович,
профессор, доктор технических наук



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Задание	1
2	Выполнение работы	3
2.1	Данная выборка	3
2.1.1	Выборочные моменты	3
2.1.2	Характер выборки	4
2.1.3	Автокорреляционный анализ	5
2.1.4	Гистограмма выборки	6
2.1.5	Аппроксимация закона распределения	7
2.2	Сгенерированная выборка	10
2.2.1	Генератор случайных величин	10
2.2.2	Выборочные моменты	12
2.2.3	Автокорреляционный анализ	12
2.2.4	Корреляционная зависимость	13
3	Заключение	15
4	Источники литературы	16

1 Задание

По варианту 108 дана последовательность вещественных чисел $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $n = 301$.

1. Вычислить следующее:

- математическое ожидание $M(a)$;
- дисперсию $D(a)$;
- среднее квадратическое отклонение $\sigma(a)$;
- коэффициент вариации $V(a)$;
- доверительный интервал для математического ожидания $M(a)$ с уровнем доверия $\alpha \in \{0.9, 0.95, 0.99\}$;
- относительные отклонения (в процентах) полученных значений от наилучших значений, полагая, что наилучшими являются значения, которые рассчитаны для наиболее представительной выборки случайных величин.

2. Построить график значений для заданной числовой последовательности и определить ее характер, а именно:

- монотонность — возрастающая/убывающая;
- периодичность — оценить по графику длину периода (при наличии периодичности);
- является ли эта последовательность периодичной (при наличии периодичности оценить по графику длину периода);

3. Выполнить автокорреляционный анализ и определить, можно ли считать эту последовательность случайной.

4. Построить гистограмму распределения частот для заданной числовой последовательности.

5. Выполнить аппроксимацию закона распределения заданной случайной последовательности по двум начальным моментам, используя одно из следующих распределений:

- равномерный;
- экспоненциальный;
- нормированный Эрланга k -го порядка или гипоекспоненциальный с заданным коэффициентом вариации;
- гиперэкспоненциальный с заданным коэффициентом вариации.

6. Реализовать генератор случайных величин в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения и проиллюстрировать на защите его работу.

7. Сгенерировать последовательность случайных величин в соответствии с полученным законом распределения и рассчитать значения числовых моментов по аналогии с заданной числовой последовательностью.
8. Выполнить автокорреляционный анализ сгенерированной последовательности случайных величин.
9. Выполнить сравнительный анализ сгенерированной последовательности случайных величин с заданной последовательностью, построив соответствующие зависимости на графике значений и гистограмме распределения частот.
10. Оценить корреляционную зависимость сгенерированной и заданной последовательностей случайных величин.

2 Выполнение работы

2.1 Данная выборка

2.1.1 Выборочные моменты

Для описания характеристик заданной числовой последовательности вспомним некоторые формулы из курса математической статистики.

Из определения математического ожидания выборки:

$$\mu(A) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n A_i$$

Для оценки дисперсии применим следующие формулы:

$$D(A) \approx \begin{cases} S_0^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (A_i - \bar{A})^2, & n < 100 \\ S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (A_i - \bar{A})^2, & n \geq 100 \end{cases},$$

где S^2 — смещённая выборочная дисперсия, а S_0^2 — несмещённая выборочная дисперсия.

Для оценки среднеквадратического отклонения σ имеем:

$$D(A) = \sigma^2 \implies \sigma(A) = \sqrt{D(A)}$$

Для оценки коэффициента вариации V используем формулу:

$$V(A) = \frac{\sigma(A)}{\mu(A)} \times 100\%$$

Пусть $A \sim \mathcal{F}_\mu$, тогда найдём доверительный интервал уровня доверия $\alpha \equiv 1 - \varepsilon$ для параметра μ . Из центральной предельной теоремы получаем:

$$G_\mu(A) = \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow[n \rightarrow 0]{} \mathcal{N}(0, 1) \quad (1)$$

По определению доверительного интервала:

$$P(|G_\mu| < c) = \alpha, \quad c — \text{квантиль } \mathcal{N}(0, 1) \quad (2)$$

Квантили для указанного распределения известны:

Уровень доверия	0,9	0,95	0,99
Квантиль	1,645	1,960	2,576

Таблица 1: Квантили стандартного нормального распределения

Из (1) и (2) следует, что:

$$\Delta\mu(A) = |\bar{X} - \mu| = c \cdot \frac{\sigma(A)}{\sqrt{n}}$$

Рассчитанные значения характеристик заданной числовой последовательности представлены в таблице 2.

Момент		Размер выборки					
		10	20	50	100	200	300
$\mu(A)$	1	330.7301	306.7455	277.9684	275.8250	262.3694	276.4051
	%	19.65	10.98	0.57	-0.21	-5.08	
$\Delta\mu$ ($\alpha = 0,9$)	1	98.5726	62.9029	34.7364	25.3243	17.9524	16.2028
	%	508.37	288.22	114.39	56.30	10.80	
$\Delta\mu$ ($\alpha = 0,95$)	1	117.4482	74.9481	41.3880	30.1736	21.3901	19.3055
	%	508.37	288.22	114.39	56.30	10.80	
$\Delta\mu$ ($\alpha = 0,99$)	1	154.3605	98.5033	54.3957	39.6567	28.1127	25.3729
	%	508.37	288.22	114.39	56.30	10.80	
$D(A)$	1	35907.1058	29244.1849	22295.0023	23699.6810	23820.1522	29202.1236
	%	22.96	0.14	-23.65	-18.84	-18.43	
$\sigma(A)$	1	189.4917	171.0093	149.3151	153.9470	154.3378	170.8863
	%	10.89	0.07	-12.62	-9.91	-9.68	
$V(A)$	1	57.29	55.75	53.72	55.81	58.82	61.82
	%	-7.33	-9.83	-13.11	-9.72	-4.85	

Таблица 2: Характеристики заданной последовательности (вариант 108)

Здесь процентами обозначены относительные отклонения рассчитанных значений от значений, полученных для выборки из трехсот величин.

Выводы:

- Выборка демонстрирует высокий уровень вариативности, что подтверждается значением коэффициента вариации $V(A) \approx 61.82$.
- На отрезке $[a_{200}, a_{300}]$ наблюдается значительное относительное изменение значений, что может говорить о наличии выбросов в выборке.

2.1.2 Характер выборки

Построим график заданной выборки, чтобы визуальнo оценить её характер:




Рис. 1: График заданной числовой последовательности (вариант 108)

Вывод:

1. **Анализ монотонности:** На исследуемой области определения выборки наблюдается чередование участков возрастания и убывания. Следовательно, выборка не является монотонной на всём рассматриваемом интервале.
2. **Анализ периодичности:** Ярко выраженная периодичность на рассматриваемом промежутке отсутствует, в ходе графического анализа не удалось выявить колебания.

2.1.3 Автокорреляционный анализ

Для проведения автокорреляционного анализа последовательности необходимо вычислить коэффициенты автокорреляции ρ_k , $k = \overline{1, 10}$. Для этого воспользуемся следующей формулой:

$$\rho_k = \frac{\text{cov}(A, A_k)}{\sigma_A \cdot \sigma_{A_k}},$$

где A_k — выборка, которая получена из исходной A путём сдвига всех элементов на k назад.

В результате вычислений получим следующие данные в табличной форме:

k	1	2	3	4	5
ρ_k	-0.0269	-0.0426	-0.0118	-0.0222	0.0205
%	2.69%	4.26%	1.18%	2.22%	2.05%
k	6	7	8	9	10
ρ_k	0.0657	0.0457	0.0604	0.0582	-0.0771
%	6.57%	4.57%	6.04%	5.82%	7.71%

Таблица 3: Числовые результаты автокорреляционного анализа (вариант 108)

Для наглядности представим те же данные в графической форме:




Рис. 2: Графические результаты автокорреляционного анализа (вариант 108)

Выводы:

- Между соседними элементами выборки отсутствует статистическая линейная зависимость, то есть выборка не обладает свойством периодичности с точки зрения статистики.
- Результат подтверждает гипотезу о том, что выборка была сгенерирована из независимых друг от друга случайных величин, то есть её можно считать *случайной*.

2.1.4 Гистограмма выборки

Введём следующее разбиение для данной выборки:

$$\tau = \{20.67; 136.13; 251.59; 367.05; 482.5; 597.96; 713.42; 828.88; 944.34; 1059.8; 1175.26\}$$

Обозначим полуинтервалы разбиения следующим образом:

$$\Delta_i = [\tau_i, \tau_{i+1}), \quad i = \overline{0, 9}$$

$$l_i = |\tau_{i+1} - \tau_i|, \quad i = \overline{0, 9}$$

Определим частоты ν_i попадания элементов выборки в каждый полуинтервал Δ_i разбиения:

i	Δ_i	ν_i	i	Δ_i	ν_i
0	[20.67; 136.13)	73	5	[597.96; 713.42)	7
1	[136.13; 251.59)	87	6	[713.42; 828.88)	4
2	[251.59; 367.05)	64	7	[828.88; 944.34)	2
3	[367.05; 482.50)	44	8	[944.34; 1059.80)	0
4	[482.50; 597.96)	19	9	[1059.80; 1175.26)	1

Таблица 4: Частотное распределение по интервалам Δ_i

Высота столбцов гистограммы находится по формуле:

$$h_i = \frac{\nu_i}{n \cdot l_i}, \quad i = \overline{0, 9}$$

Итого имеем следующую таблицу для построения гистограммы:

i	Δ_i	h_i	i	Δ_i	h_i
0	[20.67; 136.13)	0.0021	5	[597.96; 713.42)	0.0002
1	[136.13; 251.59)	0.0025	6	[713.42; 828.88)	0.0001
2	[251.59; 367.05)	0.0018	7	[828.88; 944.34)	0.0001
3	[367.05; 482.50)	0.0013	8	[944.34; 1059.80)	0.0000
4	[482.50; 597.96)	0.0005	9	[1059.80; 1175.26)	0.0000

Таблица 5: Гистограмма распределения по интервалам Δ_i

Построим гистограмму по полученным данным:




Рис. 3: Гистограмма данной выборки (вариант 108)

Выводы:

- Гистограмма демонстрирует, что распределение значений выборки не является равномерным, а имеет выраженную асимметрию: на это указывает наличие тяжёлого хвоста в правой части гистограммы.
- Наличие тяжёлого правого хвоста влечёт за собой смещение среднего значения вправо, что подтверждается значением математического ожидания $\mu(A) \approx 276.4051$.

2.1.5 Аппроксимация закона распределения

По условию учебно-исследовательской работы необходимо аппроксимировать закон распределения заданной выборки в зависимости от значения коэффициента вариации $V(A)$.

С целью восполнения теоретических пробелов касательно показательных распределений было решено обратиться к литературному источнику [1]:

$V(A)$	Распределение	Пояснение
$1/\sqrt{3}$	Равномерное	—
1	Показательное	—
< 1	Показательное k -го порядка	Соответствует меньшему диапазону возможных отклонений
< 1	Нормированное Эрланга	При $\mu(A) = 1$
> 1	Гиперпоказательное	Соответствует большему диапазону возможных отклонений

Таблица 6: Рекомендации по аппроксимации закона распределения

Поскольку $V(A) < 1$, аппроксимация осуществляется с использованием *показательного распределения k -го порядка* (распределения Эрланга E_k), плотность вероятности которого определяется выражением:

$$f(x) = \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}, \quad x \geq 0$$

где $k \in \mathbb{N}$ — порядок распределения (число фаз), а $\lambda > 0$ — параметр интенсивности каждой фазы.

По определению математического ожидания:

$$\mu_{E_k}(A) = \int_0^{+\infty} x f(x) dx = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \int_0^{+\infty} x^k e^{-\lambda x} dx$$

Используем свойство гамма-функции:

$$\int_0^{+\infty} x^k e^{-\lambda x} dx = \frac{k!}{\lambda^{k+1}} \quad (3)$$

Итого имеем математическое ожидание:

$$\mu_{E_k}(A) = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \cdot \frac{k!}{\lambda^{k+1}} = \frac{k}{\lambda}$$

По определению второго начального момента:

$$\mu_{E_k}^{(2)}(A) = \int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \int_0^{+\infty} x^{k+1} e^{-\lambda x} dx$$

Применяя формулу (3) для степени $k+1$:

$$\int_0^{+\infty} x^{k+1} e^{-\lambda x} dx = \frac{(k+1)!}{\lambda^{k+2}}$$

Итого имеем второй начальный момент:

$$\mu_{E_k}^{(2)}(A) = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \cdot \frac{(k+1)!}{\lambda^{k+2}} = \frac{k(k+1)}{\lambda^2}$$

Дисперсия распределения E_k выражается как:

$$D(A) = \mu_{E_k}^{(2)}(A) - \mu_{E_k}^2(A) = \frac{k(k+1)}{\lambda^2} - \frac{k^2}{\lambda^2} = \frac{k}{\lambda^2}$$

Откуда квадрат коэффициента вариации равен:

$$V^2(A) = \frac{D(A)}{\mu_{E_k}^2(A)} = \frac{k/\lambda^2}{k^2/\lambda^2} = \frac{1}{k}$$

Решая полученную систему уравнений методом моментов относительно искомых параметров, получаем:

$$k = \text{round} \left(\frac{1}{V^2(A)} \right)$$

$$\lambda = \frac{k}{\mu(A)}$$

Рассчитаем значения параметров распределения, воспользовавшись *методом моментов*:

Параметр	Значение	Параметр	Значение
k	3	λ	0.0114

Таблица 7: Параметры распределения E_k (вариант 108)

Убедимся в корректности полученных параметров, построив график показательного распределения k -го порядка:




Рис. 4: График показательного распределения k -го порядка (вариант 108)

Вывод:

- Теоретическая плотность вероятности распределения E_k довольно точно повторяет форму гистограммы, что подтверждает корректность выбранного закона распределения для аппроксимации.

2.2 Сгенерированная выборка

2.2.1 Генератор случайных величин

Воспользуемся методом Монте-Карло для генерации случайных величин, распределённых по закону Эрланга.

Для этого сгенерируем случайные величины $x \sim U[0, \infty)$, $y \sim U[0, 1]$. Если точка (x, y) оказалась на графике показательного распределения k -го порядка ниже, чем функция плотности $f(x)$, то число x будет воспринято как значение случайной величины $x \sim E_k$. В противном случае повторяем выборку (x, y) .

Для моделирования равномерного распределения воспользуемся генератором случайных чисел, который реализован в стандартной библиотеке языка Python. Из-за ограничения на абсолютную величину генерируемых чисел, в качестве бесконечности предлагается взять некоторое большое число M .

Описанные выше действия повторяются до тех пор, пока не будет сгенерировано необходимое количество случайных величин ($n = 300$).

Для генерации случайных величин, распределённых по закону Эрланга, был использован следующий код на языке Python:

```

1 @staticmethod
2 def compute_erlang_sequence(context: Dict[str, Any], N: int =
    300, big_number: float = 1000.0) -> Dict[str, Any]:
3     k = int(context["hyperparameters"]["k"])
4     lambda_val = float(context["hyperparameters"]["lambda"])
5
6     if k < 1 or lambda_val <= 0:
7         raise ValueError("Invalid hyperparameters for Erlang
            distribution.")
8
9     def erlang(x: float) -> float:
10         if x < 0:
11             return 0.0
12         return (lambda_val**k) * (x ** (k - 1)) * np.exp(-
            lambda_val * x) / math.factorial(k - 1)
13
14     erlang_sequence: List[float] = list()
15     while len(erlang_sequence) < N:
16         x, y = np.random.uniform(0, big_number), np.random.
            uniform(0, 1)
17         if y < erlang(x):
18             erlang_sequence.append(x)
19
20     context["erlang_sequence"] = erlang_sequence
21     return context

```

Листинг 1: Генерация случайных величин, распределённых по закону Эрланга




Рис. 5: График сгенерированной числовой последовательности

Для наглядности, по аналогии с 2.1.4 и используя то же разбиение, построим гистограмму сгенерированной выборки:




Рис. 6: Гистограмма сгенерированной выборки

2.2.2 Выборочные моменты

Момент		Размер выборки					
		10	20	50	100	200	300
$\mu(A)$	1	241.8758	253.1946	243.9769	268.4698	258.8308	264.0804
	%	-26.87	-17.46	-12.23	-2.67	-1.35	-4.46
$\Delta\mu$ ($\alpha = 0,9$)	1	60.8151	49.1872	31.8797	23.8136	17.3010	14.0919
	%	-38.30	-21.80	-8.22	-5.97	-3.63	-13.03
$\Delta\mu$ ($\alpha = 0,95$)	1	72.4605	58.6060	37.9843	28.3736	20.6140	16.7904
	%	-38.30	-21.80	-8.22	-5.97	-3.63	-13.03
$\Delta\mu$ ($\alpha = 0,99$)	1	95.2338	77.0251	49.9222	37.2911	27.0926	22.0674
	%	-38.30	-21.80	-8.22	-5.97	-3.63	-13.03
$D(A)$	1	13667.5546	17881.4355	18778.7382	20956.4522	22122.8510	22015.6070
	%	-61.94	-38.85	-15.77	-11.57	-7.13	-24.61
$\sigma(A)$	1	116.9083	133.7215	137.0355	144.7634	148.7375	148.3766
	%	-38.30	-21.80	-8.22	-5.97	-3.63	-13.17
$V(A)$	1	48.33	52.81	56.17	53.92	57.47	56.19
	%	-15.63	-5.27	4.56	-3.38	-2.30	-9.11

Таблица 8: Характеристики сгенерированной последовательности

Здесь процентами обозначены относительные отклонения характеристик сгенерированной случайной последовательности от одноименных значений заданной числовой последовательности

Выводы:

- Выборочные моменты сгенерированной выборки в большей степени соответствуют выборочным моментам исходной выборки, что позволяет сделать вывод о хорошем качестве аппроксимации выборки использованным законом распределения.
- По этим результатам нельзя однозначно утверждать, что сгенерированная выборка была получена из того же закона распределения, что и исходная выборка. Для этого необходимо использовать другие методы.

2.2.3 Автокорреляционный анализ

Воспользуемся тем же подходом, как и в 2.1.3, применяя его к сгенерированной выборке.

Результаты расчётов приведены в табличной форме ниже:

k	1	2	3	4	5
ρ_k	0.0156	-0.0347	-0.0714	0.0326	0.1422
%	1.56%	3.47%	7.14%	3.26%	14.22%
k	6	7	8	9	10
ρ_k	-0.0181	0.0837	-0.0799	-0.1049	0.0597
%	1.81%	8.37%	7.99%	10.49%	5.97%

Таблица 9: Числовые результаты автокорреляционного анализа сгенерированной последовательности

Для наглядности те же результаты приведены в графической форме:




Рис. 7: Графические результаты автокорреляционного анализа

Выводы:

- Как и ранее отмечалось, между соседними элементами выборки отсутствует статистическая линейная зависимость, то есть выборка не обладает свойством периодичности с точки зрения статистики.
- Также результат подтверждает гипотезу о том, что выборка была сгенерирована из независимых друг от друга случайных величин.

2.2.4 Корреляционная зависимость

Для проведения корреляционного анализа заданной выборки A и сгенерированной выборки B необходимо вычислить коэффициент корреляции r_{AB} . Для этого воспользуемся следующей формулой:

$$\rho_{AB} = \frac{\text{cov}(A, B)}{\sigma(A) \cdot \sigma(B)}$$

В результате расчётов получаем:

$$\rho_{AB} \approx 0.0518$$

Выводы:

- Случайные величины A и B не связаны друг с другом линейно с точки зрения статистики, то есть являются *статистически независимыми величинами*.
- Гипотеза о связи A и B с одинаковым законом распределения ни подтверждается, ни опровергается: для этого необходимо использовать другие методы.

3 Заключение

В результате выполнения учебно-исследовательской работы было выполнено следующее:

- Повторён курс математической статистики в части анализа выборки, автокорреляционного анализа и построения связанных графиков.
- Дополнительно изучены некоторые законы распределения при помощи книг, указанных в списке литературы.
- Написан комплекс скриптов на языке Python, который позволяет генерировать выборку в соответствии с заданным законом распределения, рассчитывать статистические величины и создавать связанные таблицы с графиками.

После выполнения описанных действий были сделаны следующие выводы:

- Исследованную выборку можно считать *случайной*: она не является монотонной, не наблюдается свойство периодичности, а автокорреляционный анализ не выявил статистическую периодичность.
- Аппроксимация при помощи закона распределения Эрланга оказалась *точной*: относительная погрешность статистических моментов не превышает 10%, а аналитическая плотность закона повторяет форму гистограммы для заданной выборки.

Открытый исходный код отчёта можно изучить по ссылке ниже:

- <https://github.com/MrDvD/itmo-labs-3/modelling/1>

4 Источники литературы

1. *Клейнрок Л.* Теория массового обслуживания / под ред. В. И. Нейман ; пер. И. И. Грушко. — М. : Машиностроение, 1979. — С. 432.