ВМК МГУ & ФУПМ МФТИ

Теория вероятности. Математическая статистика

Игорь Тао, Дима Сотников, Дима Гущин



Содержание

Ча	сть I	Теория вероятности	
1	Вероятностное пространство		
	1.1	Стохастические ситуации	
	1.2	Измеримое пространство	
	1.3	Вероятность. Вероятностное пространство	
2	Пон	ятие меры и интеграла Лебега 1	
	2.1	Мера Лебега	
	2.2	Интеграл Лебега	
3	Свя	зь между событиями 1	
	3.1	Условная вероятность	
	3.2	Независимость событий. Независимость в совокупности	
	3.3	Формула полной вероятности. Формула Байеса	
4	Слу	чайные величины 1	
	4.1	Случайные величины: определение	
	4.2	Функция распределения	
	4.3	Виды распределений	
	4.4	Векторные случайные величины	
	4.5	Условное математическое ожидание	
		4.5.1 Конструктивные определения	
		4.5.2 Аксиоматическое определение	
		4.5.3 Свойства и красивые картинки	
5	Xap	актеристики случайных величин 2	
	5.1	Математическое ожидание	
	5.2	Моменты, дисперсия, ковариация и прочее	
	5.3	Независимость случайных величин	
	5.4	Неравенство Маркова, неравенство Чебышева	
6	Paci	пределения и предельные теоремы 3	
	6.1	Распределение Бернулли	
	6.2	Многочлен Бернштейна	
	6.3	Распределение Пуассона. Теорема Муавра-Лапласа	
	6.4	Характеристические функции	
	6.5	Распределение функций от случайных величин	
7	Cxo	димость случайных величин 4	
	7.1	Виды сходимости	
	7.2	Закон больших чисел	
	7.3	Центральная предельная теорема	

Предисловие

Здорово! Раз вы читаете эти строки, значит вы желаете обновить или заложить свои знания в области Теории вероятности и Математической статистике.

Мы придерживались следующего порядка изложения: сначала дали неформальное объяснение всего материала, который дается в книге, затем рассказываем поверхностно о мере Лебега и переходим к теоретико-вероятностным выкладкам, которые являются инструментом в прикладных аспектах этого направления.



Часть № І. Теория вероятности

Ты спросишь меня, кого я люблю больше: тебя или теорию вероятности. Я отвечу, что почти наверное я больше люблю тебя, и ты уйдешь, так и не узнав, что почти наверное значит с вероятностью 1.

Игорян

§1. Вероятностное пространство

1.1. Стохастические ситуации

Часть информации, изложенной дальше, взято из книги [1] В. Ю. Королева, так что любознательный читатель может ознакомиться с первоисточником при особом желании. Когда можно применять теорию вероятности — поговорим об этом.

Следуя В. Ю. Королеву, будем говорить о *случайности* как о принципиально неустранимой неопределенности; это как девушку ждать на свидании: точное время, когда она придет, — это неустранимая неопределенность. Чтобы понять, как с ней же работать, необходимо выделить те случаи, когда мы можем сказать: «А здесь нам поможет теория вероятностей», — и не облажаться.

Методы теории вероятности работают в ситуациях, называемых *стохастическими*. Для них характерны три свойства:

- ❖ 1: Непредсказуемость: исход ситуации нельзя предсказать абсолютно, то есть без какой-либо погрешности. В ином случае использовать теорию вероятностей что по воробьям из пушки палить!
- **2:** Воспроизводимость: у испытателей есть возможность (хотя бы теоретическая) повторить ситуацию сколь угодно много раз при неизменных условиях.
- З: Устойчивость частот: при многократном повторении ситуации частота исхода, то есть отношение числа опытов, в которых мы получили этот исход, к их общему числу, должна колебаться около некоторого значения, приближаясь к нему все ближе и ближе. Другими словами, частота исхода должна иметь предел при стремлении числа опытов к ∞.

А где мы можем встретить такие ситуации, а? Правильно! В казино! Исторически теория вероятности создавалась, чтобы играть в азартные игры с опорой на науку, отсюда и типичные задачи: бросаем кости, гоняем шары в лототроне, делим ставку и т. д.

Чтобы превратить бытовую ситуацию в математическую науку, необходимо внести некий математический эквивалент словам «а ему чаще везет». И таким математическим объектом будет функция вероятности. Её область определения называется множеством событий, то есть это некое математическое описание результатов, которые вы можете получить. В свою очередь, событие (такое как, например, выпадание чётного числа на кубике) может являться совокупностью неких более простых событий, описывающих стохастическую ситуацию (число, выпавшее на кубике). Последнее множество называется множеством элементарных исходов и обозначается Ω .

Есть разные теории описывающие вероятностные пространства, но самой используемой является теория, созданная Колмогоровым в начале прошлого века. Перейдем к ее описанию, то есть к нестрогой формализации понятий: множество событий, множество элементарных исходов.

1.2. Измеримое пространство

Здесь только суть. Быстрым темпом! Спринт по началам теории меры, которые и приведут нас к определению вероятностного пространства. Строго излагать их мы,

конечно, не будем. Поэтому любители обмазываться формальностями могут пройти сюда — [2].

Вероятностное пространство, которое мы дальше определим, должно содержать в себе описание трех позиций, важных в эксперименте: во-первых, оно должно содержать множество элементарных исходов Ω , чтобы было предельно понятно, что является исходом; во-вторых, на этом множестве мы будем рассматривать некоторую структуру подмножеств, которая и будет множеством событий, которые имеют для нас смысл (т.е. если мы бросаем кубик и нам важна четность выпавшего числа, то не имеет смысл рассматривать исход «выпало 1 очко» в отдельности от исходов «выпало 3 очка» и «выпало 5 очков»); в-третьих, на этом множестве мы зададим функцию, которая и будет вероятностью, то есть некоторой характеристикой, описывающей частоту того или иного исхода.

Множество событий, обозначаемое \mathcal{A} (используют наравне с этим еще обозначение \mathscr{A}), должно обладать следующими интуитивными свойствами:

- 1. Отрицание события есть событие (если «пойдет дождь» событие, то «не пойдет дождь» также событие).
- 2. Объединение событий есть событие («пойдет дождь» или «пойдет снег»).
- 3. Все множество элементарных исходов является событием («что-нибудь да произойдет»).

Если мы посадим эти три свойства в одну лодку с Математикой, то получим следующее

Определение 1.1. Семейство $\mathcal A$ подмножеств множества Ω называется *алгеброй*, если верны три аксиомы:

- (i) $\forall A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}$ (если объединить два множества из семейства, то обязательно получим множество из семейства),
- (ii) $\forall A \in \mathcal{A} \Rightarrow \overline{A} \in \mathcal{A}$ (множество и его дополнение одновременно: либо лежат в нашем семействе, либо нет),
- (iii) $\Omega \in \mathcal{A}$ (все множество точно лежит в \mathcal{A}).

 \downarrow Из аксиом алгебры и формулы $A\cap B=\overline{A}\cup\overline{B}$ следует, что пересечение событий является событием. Подобным образом можно показать, что и разность, и симметрическая разность двух множеств из семейства $\mathcal A$ тоже дадут множество из $\mathcal A$.

Пример. Наименьшей алгеброй является $\{\Omega, \emptyset\}$.

Косяк определения, которое мы только что дали, в том, что часто встречаются бесконечные множества элементарных исходов, поэтому полезно, чтобы множество событий было замкнуто не только относительно объединения, но и относительно счетного объединения.

Определение 1.2. Семейство $\mathcal A$ подмножеств множества Ω называется σ -алгеброй (читается как сигма-алгебра), если

(i)
$$\forall A_1, \ldots, A_n, \ldots \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$$
,

- (ii) $\forall A \in \mathcal{A} \Rightarrow \overline{A} \in \mathcal{A}$,
- (iii) $\Omega \in \mathcal{A}$.

Не всегда по задаче понятно, какую сигма-алгебру надо выбрать, однако большой бонус ее аксиом заключается в том, что мы можем пересекать различные сигма-алгебры и получать снова сигма-алгебру. Из-за этого, если нам известно неполное множество событий \mathcal{K} , т.е. $\mathcal{K}\subseteq\mathcal{A}$, то мы можем восстановить сигма-алгебру с точностью до тех событий, которых нет в \mathcal{K} . Иными словами, мы можем найти такую минимальную сигма-алгебру, которая содержит в себе \mathcal{K} как подмножество.

Определение 1.3. Пусть \mathcal{K} — класс подмножеств Ω . σ -алгебра $\sigma(\mathcal{K})$, порожденная классом \mathcal{K} — наименьшая σ -алгебра, содержащая \mathcal{K} , то есть любая σ -алгебра, содержащая \mathcal{K} , содержит и $\sigma(\mathcal{K})$.

Пример. σ -алгеброй, порожденной $\mathcal{K}=A$ (класс состоит из одного элементарного события), будет являться $\sigma(A)=\left\{\varnothing,A,\overline{A},\Omega\right\}$.

Сигма-алгебра является более узким понятием, нежели алгебра, то есть любая σ -алгебра является алгеброй, а обратное, вообще говоря, неверно. То есть это такая «элитка» среди всевозможных алгебр: не всем алгебрам дано быть «элиткой».

Пример. Пусть $\Omega=\mathbb{R},\ \mathcal{A}$ содержит конечные подмножества Ω и их дополнения. Для такого множества выполнены все аксиомы алгебры: $\Omega=\overline{\varnothing}\in\mathcal{A}$, объединение конечных множеств есть конечное множество, объединение конечного множества с дополнением к конечному множеству так же является дополнением к некоторому множеству. То же можно сказать и об объединении двух дополнений. Таким образом, \mathcal{A} является алгеброй. Все элементы \mathcal{A} либо конечны, либо континуальны, поэтому \mathcal{A} не содержит \mathbb{N} . Но $\mathbb{N}=\bigcup_{i=1}^{\infty}\{i\}$, то есть не выполнено свойство счетной аддитивности из определения σ -алгебры. Вот видите: это не достойное нашего внимания семейство, оно не настолько элитное, чтобы называться сигма-алгеброй.

Вот мы и подошли к первому основополагающему определению.

Определение 1.4. Пара (Ω, \mathcal{A}) называется измеримым пространством, если \mathcal{A} является σ -алгеброй. Если же \mathcal{A} — алгебра, то (Ω, \mathcal{A}) — измеримое пространство в широком смысле.

По сути измеримое пространство нам говорит о том, какие у нас есть элементарные исходы и что мы считаем за событие. Но если при бросании кости ты будешь использовать кость со смещенным центром тяжести, то игроки что-то заподозрят и

популярно пояснят тебе, что ты неправ (поверь, тебе это не понравится), так что имеет смысл определить не только множество событий, но и вероятность того или иного события. Мы этим и займемся дальше.

1.3. Вероятность. Вероятностное пространство

Ну чё, народ, погнали на!... На новые баррикады! Они не такие высокие, как те, которые мы уже перепрыгнули, так что следующие пару страниц вам покажутся легкой прогулкой теплым осенним вечером по желтеющему бульвару, залитому солнечными лучами заходящего солнца... Кхм-Кхм... Это из другой пьесы. Так о чем это мы? Да, теперь пора определить вероятность.

Определение 1.5. Пусть (Ω, \mathcal{A}) — измеримое пространство $(\mathcal{A} - \sigma$ -алгебра). *Вероятностью* называется функция $\mathbb{P} \colon \mathcal{A} \to \mathbb{R}$, удовлетворяющая свойствам

1.
$$\forall A \in \mathcal{A} \mapsto \mathbb{P}(A) \geqslant 0$$
,

2.
$$\forall A_1, \ldots, A_n, \ldots \in \mathcal{A}, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j) \Rightarrow \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i),$$

3.
$$\mathbb{P}(\Omega) = 1$$
.

Второй пункт в определении вероятностной меры нельзя заменить аналогичным с конечными объединением и суммой. Однако если добавить к данному требованию так называемое свойство непрерывности вероятностной меры, т.е.

$$\forall B_1, B_2, \ldots \in \mathcal{A}, \quad B_{n+1} \subseteq B_n \Rightarrow \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}(B), B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$$

то они вместе будут эквивалентны 2 из определения вероятности. Покажем это.

Утверждение 1.6.

$$\begin{bmatrix} \forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{A}, & A_i \cap A_j = \varnothing \ (i \neq j) \Rightarrow \mathbb{P} \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} A_i \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A} & A_i \cap A_j = \varnothing \ (i \neq j) \Rightarrow \mathbb{P} \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \right) = \sum_{i=1}^{n} A_i \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} \forall B_1, B_2, \dots \in \mathcal{A}, & B_{n+1} \subseteq B_n \Rightarrow \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}(B), B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \end{bmatrix}.$$

Доказательство.

 \Rightarrow

Обозначим
$$C_n=B_n\setminus B_{n+1}$$
. Множества B,C_1,C_2,\ldots не имеют общих точек. $\forall n\ B_n=\left(igcup_{k=n}^\infty C_k\right)\cup B.$ Тогда $\mathbb{P}(B_1)=\mathbb{P}(B)+\sum\limits_{k=1}^\infty \mathbb{P}(C_k)$. Отсюда следует, что ряд в

правой части сходится, так как имеет конечную сумму. $\mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}(B) + \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(C_k)$.

При $n \to \infty$ сумма ряда стремится к нулю как остаточный член ряда из предыдущего выражения. В предельном переходе получаем свойство непрерывности.

 \Leftarrow

Рассмотрим произвольный набор
$$A_1,A_2,\ldots\in\mathcal{A}$$
 $A_i\cap A_j=\varnothing$.
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^\infty A_i\right)=\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)+\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=n+1}^\infty A_i\right)=\sum_{i=1}^n\mathbb{P}(A_i)+\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=n+1}^\infty A_i\right).$$
 Обозначим $B_n=\bigcup_{i=n+1}^\infty A_i,\quad B_{n+1}\subseteq B_n\quad \forall n,\quad \bigcap_{n=1}^\infty B_n=\varnothing$

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) = \lim_{n \to \infty} \left(\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) - \mathbb{P}(B_n) \right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) - \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right). \blacksquare$$

Определение 1.7. *Вероятностным пространством* $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ называется измеримое пространство (Ω, \mathcal{A}) , с заданной на нём вероятностью \mathbb{P} .

Ничего сложного, если знать определения и уметь вертеть математическими понятиями и логикой. Главное не перепутайте: вертеть, а не класть.

ЧО?! ЧЁ ЭТО ТАКОЕ?! Кому вообще нужна σ -алгебра событий и зачем весь этот огород и маленькая тележка, если можно рассматривать множество всех подмножеств множества событий Ω ? Когда-то давно кто-то доказал, что в случае очень большого множества элементарных исходов, например, континуального (это много, поверьте наслово), множество 2^{Ω} будет иметь такую крокодильски, или алигаторски, большую мощность, что вся теория сломается. Таким образом, алгебры нужны для того, чтобы вероятность имела хорошую область определения.

Перечислим свойства вероятности. Доказательства их можно найти в любом из классических учебников по теории вероятностей или можно их придумать самому: большинство из них тривиальны. Да, реально тривиальны, а не как на матеше в школе.

Свойства вероятности:

1.
$$\mathbb{P}(\varnothing) = 0$$
,

$$2. \ \mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A),$$

3.
$$A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leqslant \mathbb{P}(B)$$
,

4.
$$\mathbb{P}(A) \leqslant 1$$
,

5.
$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB)$$
,

6.
$$\mathbb{P}(A \cup B) \leqslant \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$
,

7.
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_{i}\right) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i_{1} < \dots < i_{k}} (-1)^{k+1} \mathbb{P}(A_{i_{1}} A_{i_{2}} \dots A_{i_{k}}),$$

8.
$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}A_{i}\right)\geqslant1-\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}\left(\overline{A_{i}}\right)$$
 — неравенство Бонферрони.

Примите к факту, что в силу простоты этих определений, математики используют их на уровне интуиции, то есть вы можете не заметить, а при этом в паре строк уже будет использовано несколько этих свойств. В некотором роде это и достоинство теории вероятности, так как происходит подобное из-за ясной бытовой аналогии, навязанной всем распространенностью азартных игр. С другой стороны, есть отличный способ избежать возможности быть посаженным на что-нибудь за отсутствие формализма: для этого стоит каждый раз, как перед тобой будут выписаны математические выкладки, пробовать осмыслить каждый переход, который в них сделан. Если это не получается сделать, то не стремись хвататься за голову: возможно, причина в том, что используются какие-то свойства, которые автор посчитал очевидными. Тогда стоит поискать в других источниках доказательства этого факта. Вполне вероятно, что это поможет найти такое доказательство, в котором будет все предельно понятно или в тяжелых моментах будет указано, что стоит перечитать и повторить.

В заключение вырежем клинышком в этой глиняной массе

Теорема 1.8 (Каратеодори). Пусть (Ω, \mathcal{A}) — измеримое пространство в широком смысле, а некоторая функция $\mathbb P$ обладает свойствами вероятностной меры. Тогда на измеримом пространстве $(\Omega, \sigma(\mathcal{A}))$

$$\exists ! \mathbb{P}' : \forall A \in \mathcal{A} \mapsto \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}'(A).$$

Доказательство. Ушло и не вернулось. Последний раз его видели здесь [2].

Зочем? Теорема Каратеодори говорит о том, что любую вероятностную меру, заданную на алгебре, можно однозначно продолжить на σ —алгебру, то есть расширить область ее определения. При этом значения функции на алгебре не изменятся. Теорема будет использоваться при определении интеграла Лебега.

§2. Понятие меры и интеграла Лебега

2.1. Мера Лебега

Не пугайтесь. Сейчас мы введем меру Лебега, но не так быстро, как вводили вероятностное пространство. Представьте, что задание меры Лебега — это как надуть несколько воздушных шариков внутри друг друга. Самый маленький шарик — это полуинтервалы. Средний — борелевские множества (о них будет дальше). Большой — измеримые множества на прямой. На каждом из этих множеств вводится своя мера, а потом продолжается на большие множества.

Дадим определение семейства, которое нас будет сильно интересовать дальше.

Определение 2.1. *Борелевской* σ *-алгеброй* называется минимальная σ *-алгебра*, содержащая все открытые подмножества топологического пространства. Элементы борелевской σ *-алгебры* называются *борелевскими множествами*.

ЧО?! ЧЁ **ЭТО ТАКОЕ?!** Мы будем рассматривать только топологическое пространство \mathbb{R} , так что это стремное словосочетание можно прямо сейчас забыть и понимать открытое множество как открытое множество из матана (все точки внутренние).

Пример. Покажем, что все «хорошие» множества являются Борелевскими.

- 1. Все открытые интревалы входят по определению.
- 2. Отрезок вида [a,b] входит как $\overline{(-\infty,a)\cup(b,+\infty)}$.
- 3. Точка ходит как вырожденный отрезок [a, a].
- 4. Счетное объединение таких множеств входит по определению.

Определение 2.2. Теперь вспомним сначала аксиомы *счетно-аддитивной меры* μ из функана (злодейский смех): это функция на множестве $B, \mu \colon B \to \mathbb{R}$, со свойствами

- 1. $\forall A \in B \mapsto \mu(A) \geqslant 0$ (неотрицательность),
- 2. $\forall A_1, A_2, \ldots \in B \colon A_i \cap A_j = \varnothing \quad (i \neq j) \Rightarrow \mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$ (σ-аддитивность).

Начнем использовать это определение в самом простом случае. Введем сначала меру на борелевских множествах полуинтервала [0,1), то есть на $\mathscr{B}_{[0,1)}$. Итак,

- На интервалах (a,b) введем меру как $\mu_{[0,1)}((a,b))=b-a$, то есть примерно если бы ваш сосед пришел бы с рулеткой к прямой и, померив, грубым голос добавил: «Здесь на вскидку b-a получается.»
- Мера одной точки равна нулю, и мы можем не обращать внимание на концы множеств. Это так пусть будет по определению.

• На любых множествах, которые можно представить как конечное объединение интервалов и какого-то числа точек, мы зададим меру как сумму мер каждого из составляющих. Это как если бы вам надо было добраться по проспекту от точки A до точки B: прошли до остановки метров 100, сели в автобус, проехали пару километров, вышли, пересели в другой автобус, проехали на нем, вышли, и прошли до места назначения метров 200. Тогда множество точек проспекта (прямой), где вы шли или ждали автобус, будет иметь меру (длину) равную 300 метрам:

$$300 = 100 + 0 + 200.$$

• Теперь осталось определить меру на бесконечных объединениях/пересечениях. Для этого воспользуемся теоремой Каратеодори (1.8), согласно которой можно продолжить меру на σ -алгебру.

Аналогичным образом определим меру $\mu_{[k,k+1)}$ на всех полуинтервалах с целыми концами $[k,k+1), (k\in\mathbb{Z}).$ Осталось доопределить меру на всей $\mathscr{B}.$

$$\forall A \in \mathcal{B} \quad \mu(A) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \mu_{[i,i+1)}(A \cap [i,i+1)).$$

2.2. Интеграл Лебега

Теперь введем интеграл Лебега (интеграл по мере Лебега). В отличие от интеграла Римана, где происходит разбиение области определения и выбирается значение функции из образа элемента разбиения, в интеграле Лебега разбивается область значений (то есть Oy), и некоторое значение из элемента разбиения умножается на меру прообраза этого элемента, затем все благополучно складывается. Введем теперь это формально.

Будем рассматривать функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такие, что $\forall c \in \mathbb{R}$ множество $A_c\{x\colon f(x) < c\}$ борелевское, то есть прообразы полупрямых являются борелевскими множествами.

Введем сначала понятие *индикатора*. Индикатор события A — это случайная величина, принимающая значение 1, если событие произошло, и 0 в противном случае. Таким образом

$$\mathbb{1}(x) = \begin{cases} 1, x \in A, \\ 0, x \notin A. \end{cases}$$

Определим интеграл Лебега на полуинтервале [0,1)

• Пусть функция имеет вид $f(x) = \sum_{i=1}^k y_i \mathbbm{1}(A_i)$, где A_i не пересекаются и покрывают весь полуинтервал [0,1). Функции такого вида называются ϕ инитными. В этом случае

$$\int_{0}^{1} f(x)\mu(dx) = \sum_{i=1}^{k} y_{i}\mu(A_{i}).$$

То есть берется мера кусочка, на котором функция принимает значение y_i , и умножается на это значение. Получается нечто, напоминающее площадь под графиком.

• Пусть теперь $f(x)\geqslant 0$ на [0,1). Будем приближать функцию финитной. Возьмем отрезок области значений $[0,n], n\in\mathbb{N}$. Разобьем этот отрезок на $n2^n$ кусочков $[\frac{k-1}{2^n},\frac{k}{2^n}), k=1,2,\ldots,n2^n$. На каждом кусочке скажем, что значение функции равно $\frac{k-1}{2^n}$. Осталось приблизить $[n,+\infty)$. Будем считать это одной частью, на которой функция принимает значение n. Устремим n к бесконечности: тогда, так как размер каждого кусочка первой части равен $\frac{1}{2^n}$, их длина станет бесконечно малой, а та часть, которую мы «обрубили» сверху (то есть $[n,+\infty)$), уйдет в бесконечность. Итак,

$$\int_{0}^{1} f(x)\mu(dx) = \lim_{n \to \infty} \left[\sum_{k=1}^{n2^{n}} \frac{k-1}{2^{n}} \mu\left(\left\{x \colon \frac{k-1}{2^{n}} \leqslant f(x) < \frac{k}{2^{n}}\right\}\right) + n\mu(\left\{x \colon f(x) \geqslant n\right\}) \right].$$

• Остался случай произвольной функции f(x). Разобьем ее на две: одна функция совпадает с f(x) там, где та положительна, и равняется 0 в остальных случаях, другая равна |f(x)| там, где f(x) отрицательна, и 0 иначе.

$$f^+(x) = \max\{0, f(x)\}, \quad f^-(x) = -\min\{0, f(x)\}.$$

Для каждой из этих функций интеграл определен по предыдущему пункту. Пользуясь тем, что $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$, определим интеграл так:

$$\int_{0}^{1} f(x)\mu(dx) = \int_{0}^{1} f^{+}(x)\mu(dx) - \int_{0}^{1} f^{-}(x)\mu(dx).$$

В случае, если оба интеграла в правой части расходятся, интеграл от f(x) не определен. Так как $|f(x)|=f^+(x)+f^-(x)$, сходимость интеграла Лебега от модуля функции (абсолютная сходимость) эквивалента сходимости интеграла от самой функции (то есть обычной сходимости). Это следует из того, что интеграл сходится только в случае конечности обоих интегралов правой части (иначе он не определен), откуда следует конечность их суммы и разности. Таким образом, для интеграла Лебега не существует условно сходящихся функций.

Аналогично вводим интеграл на каждом полуинтервале $[i,i+1), i\in\mathbb{Z}$. Тогда на всей прямой интеграл по множеству $A\subset\mathbb{R}$ будет определяться так:

$$\int_{A} f(x)\mu(dx) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \int_{A \cap [i,i+1)} f(x)\mu(dx).$$

Пример. С помощью интеграла Лебега можно считать интегралы от функций, об интегрировании которых раньше было страшно даже подумать. Например, от функции Дирихле:

$$D_{[0,1)}(x) = \begin{cases} 1, x \in [0,1) \setminus \mathbb{Q}, \\ 0, x \in \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Данная функция является финитной, а именно $D_{[0,1)}(x)=\mathbbm{1}([0,1)\setminus\mathbb{Q}).$ Поэтому по первому пункту

$$\int_{0}^{1} D_{[0,1)}(x)\mu(dx) = 1.$$

В дальнейшем $\mu(dx)$ будет опускаться обозначаться просто как dx или dy чтобы подчеркнуть, что считается именно интеграл Лебега.

Все. На этом введение в теорию меры заканчивается. Перейдем к более интересным разделам: связанным уже с вероятностями.

§3. Связь между событиями

3.1. Условная вероятность

Условно мы будем тут работать с вероятностью нескольких событий. Ведь бывают разные игры: и в карты, и в кости. Есть и такие, в которых придется не единожды просить судьбу «выдать козырь», поэтому выгодно понимать, сколько в действительности у тебя шансов дёрнуть судьбу так, как тебя тогда на рынке дёрнули.

Рассмотрим произвольное событие $B \in \mathcal{A}$: $\mathbb{P}(B) > 0$.

Определение 3.1. Условной вероятностью события $A \in \mathcal{A}$ при условии B называется

$$\frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}_B(A).$$

ЧО?! ЧЁ ЭТО ТАКОЕ?! Зачем нужно требование $\mathbb{P}(B) > 0$, если можно в случае $\mathbb{P}(B) = 0$ доопределить условную вероятность нулем как вероятность при условии невозможного события? При таком доопределении нарушится аксиома 3. Вероятности \mathbb{P}_B , поскольку $\mathbb{P}_B(B)$ по доопределению будет равно 0.

Что это означает на пальцах? Спокойно, сейчас поясним. Условная вероятность $\mathbb{P}(A|B)$ — это вероятность того, что произойдет событие A, если мы точно знаем, что произошло событие B.

Пример. Представь, что ты бросаешь 2 кубика. Событие A- у тебя выпало суммарно меньше 5 очков. А B, например, означает, что у тебя выпало 6 очков на первом кубике. Очевидно, что если на одном выпало 6, то суммарно у тебя меньше 6 быть не может, так что вероятность тоже должна быть равна нулю, что согласуется с определением:


$$P_B(A) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0}{P(B)} = 0.$$

Допустим теперь, что B- у тебя выпало на первом кубике 1 очко. Тогда понятно, что вероятность события A- будет равна 1/2, так как при выпадении 1,2,3 на втором кубике событие произойдет, а при выпадении других чисел — нет. Вычислим теперь по определению.

Вероятность выпадения 1 на первом кубике, притом чтобы сумма была меньше пяти, равна 1/12, так как всего 36 комбинаций на кубиках, а подходит только 3: (1,1),(1,2),(1,3). Вероятность выпадения любого из чисел на кубике -1/6, так что

$$P_B(A) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1/12}{1/6} = \frac{1}{2}.$$

Опа! Америка-Европа! Все сошлось с интуитивными предположениями.



Графически это означает, что, когда произошло событие B, мы оказались в круге B. Тогда формула

$$\frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}$$

есть просто вероятность попасть в $A\cap B$. - 14 -

Из определения следует так называемый «Закон умножения вероятностей»:

$$\mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(AB).$$

Легко проверяется, что $(B, \mathcal{A}_B, \mathbb{P}_B)$, где $\mathcal{A}_B = \{A \cap B \colon A \in \mathcal{A}\}$, так же является вероятностным пространством.

3.2. Независимость событий. Независимость в совокупности

Да, и в теории вероятности есть независимость! Но это уже другая независимость, а не та, про которую так много новостей нынче.

Определение 3.2. События $A, B \in \mathcal{A}$ называются *независимыми*, если

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Для независимых событий

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A).$$

Пример. Являются ли несовместные события $(A \cap B = \emptyset)$ независимыми? Ответ: нет, пусть $A, B \in \mathcal{A} \colon \mathbb{P}(A) > 0$, $\mathbb{P}(B) > 0$. Тогда $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = 0$, что является противоречием. По-простому, если произошло одно из несовместных событий, то второе уже не может произойти, и его условная вероятность равна 0, а не вероятности самого события, что требуется для независимости.

Обобщим понятие независимости на произвольное количество событий.

Определение 3.3. События A_1, A_2, \dots, A_n называются независимыми в совокупности, если

$$\forall m = 2, \dots, n \quad \forall 1 \leqslant j_1 < \dots < j_m \leqslant n \mapsto \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^m A_{j_k}\right) = \prod_{k=1}^m \mathbb{P}\left(A_{j_k}\right).$$

Пример. На примере тетраэдра Бернштейна можно убедиться в том, что попарной независимости событий недостаточно для независимости в совокупности. Рассмотрим тетраэдр, у которого три стороны покрашены в красный, синий и зеленый, а четвертая содержит все три цвета. События «выпадет красный» = $\{K\}$, «выпадет синий» = $\{C\}$, «выпадет зеленый» = $\{3\}$ попарно независимы (например, вероятность события $\{C\} \cap \{K\}$ равна вероятности выпадения четвертой грани, т. е. 1/4, в то время как вероятность выпадения каждого цвета равна 1/2). Однако

$$\mathbb{P}(\{C\}\cap \{K\}\cap \{3\})=\frac{1}{4}\neq \left(\frac{1}{2}\right)^3.$$

3.3. Формула полной вероятности. Формула Байеса

Чуть выше мы рассмотрели условную вероятность, то есть поговорили о том, что некоторые события могут пересекаться и когда в таких случаях можно сказать, что они независимы. Часто встречается следующая группа событий.

Определение 3.4. B_1, \ldots, B_n образуют *полную группу*, если выполнены следующие условия:

- 1. $\mathbb{P}(B_i) > 0 \quad \forall i = 1, ..., n,$
- 2. $B_i B_j = \emptyset \quad (i \neq j),$
- 3. $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega.$

Теорема 3.5. Пусть B_1, \ldots, B_n образуют полную группу. Вероятность события $A \in \mathcal{A}$ можно вычислить по формуле полной вероятности:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)$$

Доказательство.

$$A = \bigcup_{i=1}^{n} AB_i, \quad AB_i \cap AB_j = \emptyset \quad (i \neq j),$$

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(AB_i) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i).$$

Последний переход следует из закона умножения вероятностей.

Первое требование определения полной группы необходимо для возможности определить условную вероятность, второе позволяет разбить множество A на непересекающиеся части. Третье требование, вообще говоря, можно ослабить, потребовав, чтобы $A\subseteq\bigcup_{i=1}^n B_i$. Доказательство при этом не изменится.

Пример. Проиллюстрировать формулу полной вероятности можно обычным экзаменом: $A - \{$ студент сдал экзамен $\}$, $B_i - \{$ студент попал к преподавателю $i \}$. Как и в любой другой лотерее, можно оценить вероятность попадания к преподавателю i, то есть $\mathbb{P}(B_i)$, а трезво оценивая свои силы можно прикинуть и вероятность сдать тому или иному преподавателю $\mathbb{P}(A|B_i)$. Зная все вышеперечисленное, несложно по формуле вычислить вероятность успешной сдачи.

Формула полной вероятности используется для вычисления априорной вероятности, т.е. вероятности события, которое еще не произошло. Пусть теперь $\mathbb{P}(A)>0$. Тогда

 $\mathbb{P}(B_i|A)=\mathbb{P}(AB_i)/\mathbb{P}(A)$. Используя формулу полной вероятности, получаем формулу Байеса:

$$\mathbb{P}(B_i|A) = \frac{\mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(A|B_j)\mathbb{P}(B_j)}$$

Формула Байеса используется для вычисления апостериорной вероятности. То есть уже известно, что произошло некоторое событие A, и нужно вычислить вероятность того, что произошло некоторое B_i . В примере с экзаменом, например, может быть известно, что студент не сдал экзамен, и хочется вычислить вероятность того, что он сдавал преподавателю «P».

§4. Случайные величины

4.1. Случайные величины: определение

Случайные события — это хорошо, но события типа «на монетке выпал герб» плохо формализуемы, а мы хотим формальности и математичности. Поэтому вместо всяких событий хочется работать с числами. Вот этим и займемся. При рассмотрении случайных событий мы ввели вероятностное пространство, которое выглядит так:

$$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}),$$

где Ω — множество элементарных событий, $\mathcal{A}-\sigma$ -алгебра подмножеств множества элементарных событий, а \mathbb{P} — вероятность. Мы же будем рассматривать теперь тройку

$$(\mathbb{R}, \mathscr{B}, \mathbb{P}),$$

где \mathbb{R} — действительная прямая, \mathscr{B} — борелевская σ -алгебра, а \mathbb{P} — вероятность. Теперь формально введем понятие случайной величины (может использоваться сокращение с.в.).

Определение 4.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Тогда *случайной величиной* ξ называется функция $\xi:\Omega\to\mathbb{R}$, измеримая относительно \mathcal{A} и \mathscr{B} . По-другому, ξ — случайная величина, если

$$\forall B \in \mathscr{B} \quad \xi^{-1}(B) = \{\omega : \xi(\omega) \in B\} \in \mathcal{A}.$$

ЧО?! ЧЁ **ЭТО ТАКОЕ?!** Таким финтом ушами мы по сути сопоставили каждому событию какое-то «хорошее» множество на числовой прямой, и можем рассматривать не вероятности событий, а вероятности попадания в эти «хорошие» подмножества числовой прямой.

4.2. Функция распределения

Введем еще несколько «полезных» определений.

Определение 4.2. С каждой случайной величиной свяжем два вероятностных пространства: первое $-(\Omega, \mathcal{A}_{\xi}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство, порожденное ξ . Здесь \mathcal{A}_{ξ} - наименьшая σ -алгебра, для которой выполняется свойство измеримости. Второе $-(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mathbb{P}_{\xi})$, где $\mathbb{P}_{\xi}(B) = \mathbb{P}(\xi^{-1}(B)) \ \forall B \in \mathcal{B}$ и называется распределением вероятностей ξ .

Идем дальше в сторону упрощения работы со случайностями. Вместо того чтобы рассматривать произвольные борелевские множества, мы будем рассматривать только множества вида $(-\infty,x)$. Действительно, интервал (a,b) получается из полупрямых так: $(a,b)=(-\infty,b)\setminus (-\infty,a]$. Таким образом, мы можем рассматривать случайные величины только на таких множествах. Здесь имеется в виду, что для удовлетворения определению случайной величины достаточно измеримости только на полупрямых, что следует из следующих свойств полного прообраза: прообраз объединения есть объединение прообразов, прообраз пересечения есть пересечение прообразов, прообраз

отрицания есть отрицание прообраза. Выше показано, что из полупрямых с помощью этих операций можно получить интервалы, а из интервалов и все \mathscr{B} .

Теперь несколько полезных утверждений. Пусть ξ — случайная величина. Тогда $-\xi$ также случайная величина, так как её прообраз от любой полупрямой является прообразом ξ от симметричной полупрямой, то есть лежит в \mathcal{A} . Величина $\xi+c$ также будет случайной величиной, поскольку ее прообразом для любой полупрямой будет прообраз ξ для полупрямой, сдвинутой на c, то есть будет лежать в \mathcal{A} .

Утверждение 4.3. Пусть ξ, η — случайные величины. Тогда множество $\{\omega \colon \xi(\omega) < \eta(\omega)\}$ является событием.

Доказательство. $\{\omega\colon \xi(\omega)<\eta(\omega)\}=\bigcup_{r\in\mathbb{Q}}\{\omega\colon \xi(\omega)< r,\eta(\omega)>r\}$. Заметим, что $\{\omega\colon \xi(\omega)< r\}$ является событием. Аналогично для η . Выражение, написанное выше, является счетным объединением пересечений двух событий, то есть событием.

Похожими махинациями, а также с использованием этого утверждения, доказывается, что $\xi^2, \xi+\eta, \xi\eta$ являются случайными величинами. Более того, если ξ_1,\dots,ξ_n- случайные величины, а функция $\varphi(x_1,\dots,x_n)$ является непрерывной на множестве их значений, то $\varphi(\xi_1,\dots,\xi_n)$ будет случайной величиной.

Определение 4.4. Рассмотрим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ и определенную на нем случайную величину ξ . Тогда её функцией распределения $F_{\xi}(x)$ называется функция $F_{\xi}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$F_{\xi}(x) = \mathbb{P}(\omega : \xi(\omega) < x) = \mathbb{P}(\xi < x)$$

Запись $\mathbb{P}(\xi < x)$ является в некотором смысле жаргонной, так как аргументов вероятности должно быть событие из \mathcal{A} . Но $\xi < x$ мы в дальнейшем будем отождествлять с объединением элементарных событий, образ которых меньше x. Из определения случайной величины получаем, что это объединение является событием, поэтому применение к нему функции вероятности корректно.

Функция распределения (сокращение ф.р.) является очень полезной штукой, поскольку имеет достаточно простой вид и несет в себе всю информацию о распределении, то есть однозначно определяет \mathbb{P}_{ξ} .

Рассмотрим основные свойства функции распределения:

- 1. $F_{\xi}(x) \in [0,1]$
- $2. \lim_{x \to -\infty} F_{\xi}(x) = 0$
- 3. $\lim_{x \to +\infty} F_{\xi}(x) = 1$
- 4. $F_{\xi}(x)$ монотонно не убывает.
- 5. $F_{\xi}(x)$ непрерывна слева.

Вероятность попадания с.в. в полуинтервал $\mathbb{P}_{\xi}[a,b)=F_{\xi}(b)-F_{\xi}(a)$. При стремлении $b\to a$ получим $\mathbb{P}(\xi=a)=F_{\xi}(a+0)-F_{\xi}(a)$, то есть вероятность попадания в точку равна скачку функции распределения в этой точке.

Определение 4.5. Точка x_0 называется точкой роста $F_\xi(x)$, если $\forall \varepsilon>0$ $\mathbb{P}(x_0-\ \varepsilon\leqslant \xi< x_0+\varepsilon)>0$

Пример. Это очень полезный пример, который будет использоваться в матстате и который очень любят спрашивать. Пусть ξ — случайная величина. $\eta = F_{\xi}(\xi)$. Чему равна $F_{\eta}(x)$? По определению

$$F_{\eta}(x) = \mathbb{P}(\eta < x) = \mathbb{P}(F_{\xi}(\xi) < x) = \mathbb{P}(\xi < F_{\xi}^{-1}(x)) = F_{\xi}(F_{\xi}^{-1}(x)) = x \tag{4.1}$$

Вообще, тут было бы неплохо сказать, что F_ξ непрерывна и строго монотонна, что-бы со спокойной совестью использовать обратную функцию. Таким образом η имеет равномерное распределение.

4.3. Виды распределений

Распределения случайных величин можно разделить на 3 типа: непрерывные, дискретные и сингулярные.

Определение 4.6. Случайная величина ξ называется абсолютно непрерывной, если существует интегрируемая функция $p_{\xi}(x)\geqslant 0,\ x\in\mathbb{R}$ такая, что функция распределения ξ является почти всюду (за исключением не более, чем счетного числа точек) дифференцируемой функцией и представима в виде

$$F_{\xi}(x) = \int_{0}^{x} p_{\xi}(y) dy$$

Отсюда следует, что функция распределения непрерывна на \mathbb{R} . $p_{\xi}(x)$ называется плотностью распределения, и почти всюду выполнено $p_{\xi}(x) = F'_{\xi}(x)$. Плотность, вообще говоря, определена не однозначно.

Определение 4.7. Случайная величина ξ называется <u>дискретной</u>, если множество точек роста не более, чем счетно, но распределение не является сингулярным, или, другими словами $\exists B = \{x_1, x_2, \ldots\} \colon \mathbb{P}(\xi \in B) = 1.$

Определение 4.8. Случайная величина ξ называется *сингулярной*, если F_{ξ} непрерывна, и $\exists B \in \mathscr{B} \colon \mu(B) = 0, \ \mathbb{P}(\xi \in B) = 1$, то есть множество значений случайной величины имеет меру 0, но вероятность попасть в каждую точку этого множества так же нулевая.


Пара слов о жизненном смысле определений: непрерывная случайная величина имеет областью значений континуальное множество, при этом вероятность попасть в отдельно взятую точку нулевая. Пример: равномерное распределение по отрезку.

Плотность же отражает вероятность попасть в ту или иную область: интеграл по области равен этой вероятности. Дискретная случайная величина принимает конечное или счетное множество значений, вследствие этого имеет ступенчатую функцию распределения, например, бросок монетки имеет дискретное распределение. Сингулярное распределение — это крокодил, который не встречается в жизни и будет рассмотрен отдельно.

Утверждение 4.9. Дискретная случайная величина имеет не более, чем счетное число скачков.

Доказательство. Из свойств функции распределения следует, что дискретная величина имеет не больше двух скачков величины больше $\frac{1}{2}$. Аналогично, скачков величины больше $\frac{1}{3}$ не больше 3. То есть скачков величины больше $\frac{1}{n}$ не более n. Для любого скачка можно указать $n \in \mathbb{N}$ такое, что величина, этого скачка больше $\frac{1}{n}$. Значит, каждому скачку можно поставить в соответствие n, множество которых счетно. При этом для каждого n существует не более чем счетное число скачков, ему соответствующих (величины $> \frac{1}{n}$). А так как объединение не более, чем счетного числа не более, чем счетных множеств, не более, чем счетно, получаем требуемое.

Пример. Для полного счастья приведем пример сингулярной случайной величины. Пусть функция распределения — так называемая лестница Кантора (см. рисунок).



Посчитаем меру множества, на котором функция константа, то есть точки этого множества не будут точками роста: сначала это одна ступенька длины 1/3, потом две длины 1/9, и т. д.

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} (\frac{2}{3})^{k-1} = 1.$$

Тогда множество точек роста имеет меру 0 в силу свойства аддитивности меры.

Вообще говоря, существуют менее изысканные примеры сингулярных распределений. Например, при стрельбе из лука в круглую мишень распределение будет сингулярным, если стрелок попадает только в точки одной прямой. В самом деле, двумерная мера прямой равна 0, как и вероятность попасть в каждую отдельную точку.

Теорема 4.10 (Лебега). Любую случайную величину можно представить в виде суммы дискретной, абсолютно непрерывной и сингулярной случайной величины. То есть

$$F(x) = \alpha_d F_d(x) + \alpha_c F_c(x) + \alpha_s F_s(x), \quad \alpha_d + \alpha_c + \alpha_s = 1.$$

Доказательство. Не вошло в содержание и не вышло с публикацией. Ищите в других учебниках.

4.4. Векторные случайные величины

Векторную случайную величину можно определить двумя способами:

- 1. Сказать, что $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ является векторной случайной величиной, если ее координаты являются случайными величинами.
- 2. Дать определение аналогично определению одномерной случайной величины, то есть рассмотреть $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_n)$, где $\mathcal{B}_n n$ -мерная борелевская σ -алгебра, то есть минимальная σ -алгебра, содержащая все параллелепипеды (аналогично интервалам в одномерном случае). Тогда ξ случайная величина, если

$$\forall B \in \mathscr{B}_n \colon \xi^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

Определение 4.11. Функция распределения векторной случайной величины

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{P}(\xi_1 < x_1, \dots, \xi_n < x_n).$$

Свойства функции распределения:

- 1. Пусть $x,y \in \mathbb{R}^n$ такие, что $x_i < y_i \quad i=1,\ldots,n$. Тогда $F_\xi(x) \leqslant F_\xi(y)$.
- 2. $0 \leqslant F_{\xi}(x) \leqslant 1$.
- 3. $\lim_{x_i \to -\infty} F_\xi(x) = 0$. То есть при стремлении одной координаты к $-\infty$ функция распределения стремится к 0, поскольку вероятность для соответствующей координаты стремится к 0.
- 4. Если же какую-то из координат устремить к бесконечности, то она не будет учитываться в вероятности, поэтому

$$\lim_{x_i \to +\infty} F_{\xi}(x) = F_{(\xi_1, \dots, \xi_{i-1}, \xi_{i+1}, \dots, \xi_n)}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

5. Непрерывна слева по каждому аргументу.

Определение 4.12. *Абсолютно непрерывная* случайная величина ξ — такая случайная величина, что

$$\forall B \in \mathscr{B}_n \quad \mathbb{P}(\xi \in \mathscr{B}_n) = \int_B p_{\xi}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

 ξ_1,\dots,ξ_n независимы в совокупности \Leftrightarrow функцию распределения векторной случайной величины $\xi=(\xi_1,\dots,\xi_n)$ можно представить произведением функций распределений координат, то есть

$$F_{\xi}(x) = F_{\xi_1}(x_1) \dots F_{\xi_n}(x_n).$$

В случае абсолютно непрерывной векторной случайной величины это эквивалентно аналогичному выражению для плотностей:

$$p_{\xi}(x) = p_{\xi_1}(x_1) \dots p_{\xi_n}(x_n).$$

4.5. Условное математическое ожидание

4.5.1. Конструктивные определения

Зочем? Уберите от экрана детей, беременных женщин и людей со слабой нервной системой. Сейчас будем вводить условное математическое ожидание. Для начала надо понять, а где тут вообще проблема и почему нельзя ввести условную плотность как отношение плотностей и тупо брать по ней интеграл. Во-первых, что такое матожидание? Матожидание — это простое обычное число. А теперь рассмотрим две случайные величины: ξ и η и условное матожидание $\mathbb{E}(\xi|\eta)$. Пусть для наглядности ξ — число, выпавшее на игральной кости, а η — остаток от деления на 2 выпавшего числа. Тогда матожидание выпавшего числа будет равно 4, если известно, что выпало четное число, и 3 – в противном случае. То есть матожидание зависит от условия, которое является случайной величиной, а значит и само матожидание является случайной величиной. Таким образом, условное математическое ожидание мы не можем тупо определить как интеграл от условной плотности, так как интеграл — это число. Поэтому мы введем условное матожидание (УМО) отдельно для дискретных и непрерывных случайных величин, и в каждый раз будем вводить этого крокодила в 2 этапа. Сначала введем $\mathbb{E}(\xi|\eta=y)$ — матожидание относительно конкретной реализации случайной величины. Это будет какая-то функция от y. Потом скажем, что если в эту функцию подставить случайную величину η , то мы получим $\mathbb{E}(\xi|\eta)$ – УМО относительно случайной величины. А потом еще для расширения сознания введем УМО относительно сигма-алгебры и введем все то же, но по-другому, аксиоматически, а не конструктивно.

Пусть ξ принимает значения $\{x_i\}$, а $\eta - \{y_i\}$, тогда

Определение 4.13.
$$\mathbb{E}(\xi|\eta=y_j):=\sum_i x_i \mathbb{P}(\xi=x_i|\eta=y_j)=\sum_i x_i \frac{\mathbb{P}(\xi=x_i,\eta=y_j)}{\mathbb{P}(\eta=y_j)}=f(y),$$
 где $y=y_j.$

Определение 4.14. $\mathbb{E}(\xi|\eta)=f(\eta)$, где f — функция, полученная с помощью предыдущего определения.

Так как УМО — случайная величина, то мы можем взять матожидание этой случайной величины и посмотреть, а что будет.

$$\forall B \in \mathcal{B} \quad \mathbb{E}\big[\mathbb{E}(\xi|\eta)\mathbb{1}(\eta \in B)\big] = \sum_{j: y_j \in B} f(y_j)\mathbb{P}\left(\eta = y_j\right) =$$

$$= \sum_{j: y_j \in B} \left[\sum_k x_k \frac{\mathbb{P}\big(\xi = x_k, \eta = y_j\big)}{\mathbb{P}(\eta = y_j)}\right] \mathbb{P}(\eta = y_j) =$$

$$= \sum_{j: y_j \in B} \sum_k \mathbb{P}\big(\xi = x_k, \eta = y_j\big) = \mathbb{E}\big[\xi\mathbb{1}(\eta \in B)\big]. \quad (4.2)$$

И в частности, если в качестве B выбрать \mathbb{R} , то индикатор всегда будет равен 1 и тогда $\mathbb{E}\big[\mathbb{E}(\xi|\eta)\big]=\mathbb{E}\xi$.

Теперь рассмотрим абсолютно непрерывные случайные величины $\xi, \eta \sim p_{\xi,\eta}(x,y)$. Попробуем подступиться так же, как и в дискретном случае, через условную вероятность.

$$\mathbb{P}(\xi < x | \eta = y) = \frac{\mathbb{P}(\xi < x, \eta = y)}{\mathbb{P}(\eta = y)} = \frac{0}{0}.$$
(4.3)

Проблемка. Попробуем тогда у условии сказать, что $\eta \in [y,y+\varepsilon)$, и устремить ε к нулю.

$$\mathbb{P}(\xi < x | y \leqslant \eta < y + \varepsilon) = \frac{\mathbb{P}(\xi < x | y \leqslant \eta < y + \varepsilon)}{\mathbb{P}(y \leqslant \eta < y + \varepsilon)} =$$

$$= \frac{\int\limits_{-\infty}^{x} \int\limits_{y}^{y+\varepsilon} p_{\xi,\eta}(x,y) dy dx}{\int\limits_{y+\varepsilon}^{y+\varepsilon} p_{\eta}(y) dy} = \begin{cases} \text{считаем, uto} \\ \text{можно приме-} \\ \text{нить т. о среднем} \end{cases} = \frac{\int\limits_{-\infty}^{x} p_{\xi,\eta}(x,y') dx}{\int\limits_{y}^{x} p_{\eta}(y'')} =$$

$$= \int\limits_{-\infty}^{x} \frac{p_{\xi,\eta}(x,y') dx}{p_{\eta}(y'')} \xrightarrow[\varepsilon \to 0]{} \int\limits_{-\infty}^{x} \frac{p_{\xi,\eta}(x,y)}{p_{\eta}(y)} dx. \quad (4.4)$$

Теперь можем вводить определение условной плотности:

Определение 4.15.
$$p_{\xi|\eta=y}(x) = \frac{p_{\xi,\eta}(x,y)}{p_{\eta}(y)}$$
.

ЧО?! ЧЁ **ЭТО ТАКОЕ?!** Условная плотность — функция от x, но параметризованная y.

Определение 4.16.
$$\mathbb{E}(\xi|\eta=y) := \int x p_{\xi|\eta=y}(x) dx = f(y).$$

Теперь, как и в дискретном случае, конструктивно введем определение УМО относительно случайной величины.

Определение 4.17.
$$\mathbb{E}(\xi|\eta):=f(\eta).$$

И снова посчитаем МО УМО:

$$\forall B \in \mathscr{B} \quad \mathbb{E}\big[\mathbb{E}(\xi|\eta)\mathbb{1}(\eta \in B)\big] = \mathbb{E}\big[f(\eta)\mathbb{1}(\eta \in B)\big] = \int_{B} f(y)p_{\eta}(y)dy =$$

$$= \int_{B} \int x \frac{p_{\xi,\eta}(x,y)}{p_{\eta}(y)} dx \ p_{\eta}(y)dy = \int_{B} \int x p_{\xi,\eta}(x,y) dxdy = \mathbb{E}\big[\xi\mathbb{1}(\eta \in B)\big]. \quad (4.5)$$

4.5.2. Аксиоматическое определение

Теперь потихоньку будем вводить УМО через всякие там приколы с мерой. Вспомним наше любимое вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ и рассмотрим некоторую под— σ —алгебру $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}$.

Определение 4.18. Случайная величина η называется \mathcal{F} —измеримой, если

$$\forall B \in \mathscr{B} \quad \eta^{-1}(B) = \{\omega \colon \eta(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

ЧО?! ЧЁ ЭТО ТАКОЕ?! Поясним: рассмотрим игральную кость. Тогда $\Omega = \{1, \dots, 6\}$, $\mathcal{A} = \{2^{\Omega}\}$. Теперь положим $\mathcal{F} = \{\varnothing, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \Omega\}$.

Теперь рассмотрим случайную величину η , которая равна чётности выпавшего числа. По определению легко проверяется, что η является $\mathcal{F}-$ измеримой.

Определение 4.19. Условным математическим ожиданием случайной величины ξ относительно σ —алгебры $\mathcal F$ называется случайная величина $\mathbb E(\xi|\mathcal F)$, обладающая следующими свойствами:

- 1. $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{F})$ \mathcal{F} —измерима.
- 2. $\forall A \in \mathcal{F} \quad \mathbb{E}\big[\mathbb{E}(\xi|\mathcal{F})\mathbb{1}(A)\big] = \mathbb{E}\big[\xi\mathbb{1}(A)\big]$

Введем теперь определение порожденной σ —алгебры.

Определение 4.20.
$$\sigma(\eta) := \bigcup_{\forall B \in \mathscr{B}} \{\omega \colon \eta(\omega) \in B\}.$$

ЧО?! ЧЁ **ЭТО ТАКОЕ?!** Это объединение всех множеств, которые мы получили следующим образом: берем борелевское множество, смотрим, какие события туда «попадают», если перегнать из событий в \mathbb{R} .

И теперь, когда мы определили порожденную $\sigma-$ алгебру, можно вводить аксиоматические определения для УМО относительно случайных величин.

Определение 4.21.
$$\mathbb{E}(\xi|\eta) := \mathbb{E}(\xi|\sigma(\eta)).$$

Вообще по понятиям, если вводится такого рода определения, то надо доказывать корректность таких определений. То есть мы определили какой-то новый объект, но еще не факт, что такие крокодилы водятся в природе. Мы тут этим заниматься не будем, чтобы не опухнуть от функана. Ключевые слова, чтобы казаться умным: мера, абсолютно непрерывная относительно другой меры, теорема Радона—Нико́дима, заряд.

4.5.3. Свойства и красивые картинки

Для начала запишем несколько свойств УМО (доказывать их я, конечно, не буду):

- 1. $\forall B \in \mathscr{B} \quad \mathbb{P}(\xi \in B|\mathcal{F}) = \mathbb{E}[\mathbb{1}(\xi \in B)|\mathcal{F}].$
- 2. $\mathbb{E}(a\xi_1 + b\xi_2|\mathcal{F}) \stackrel{\text{п.н.}}{=} a\mathbb{E}(\xi_1|\mathcal{F}) + b\mathbb{E}(\xi_2|\mathcal{F}).$
- 3. Если η \mathcal{F} —измерима, то $\mathbb{E}(\xi\eta|\mathcal{F})\stackrel{\text{п.н.}}{=} \eta\mathbb{E}(\xi|\mathcal{F})$.




Рис. 1: Совместная плотность (4.6).

Рис. 2: Сечения графика на рис. 1 при различных реализациях η .

- 4. Если ξ и η независимы, то $\mathbb{E}(\xi|\eta) \stackrel{\text{п.н.}}{=} \mathbb{E}(\xi)$.
- 5. $\mathbb{E}[\mathbb{E}(\xi|\mathcal{F})] = \mathbb{E}\xi$.

Теперь картинки. Мы придумаем какую-нибудь плотность $p_{\xi,\eta}(x,y)$, а потом построим график плотности условного матожидания и попытаемся понять его жизненный смысл.

Чтобы было легко и просто мы представим плотность в таком виде:

$$p_{\xi,\eta}(x,y) = p_{\xi|\eta}(x)p_{\eta}(y). \tag{4.6}$$

Затем положим:

$$p_{\xi|\eta}(x) = \mathcal{N}(\eta, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left\{-\frac{(x-\eta)^2}{2}\right\},$$
 (4.7)

$$p_{\eta}(y) = exp(1) = e^{-y} \mathbb{1}(y \geqslant 0).$$
 (4.8)

Теперь по понятиям. Что значит математическое ожидание ξ при условии η ? Это МО, если считать, что η уже свалилось к нам с неба и не меняется. В силу построения условной плотности $\mathbb{E}(\xi|\eta)=\eta$ просто из свойства нормального распределения. И полученная случайная величина, утверждается, что распределена экспоненциально. Попробуем увидеть это на графиках.

Теперь если мы будем рассматривать сечения этого графика плоскостями $y=t,t\geqslant 0$, то будем получать каждый раз почти графики плотности нормального распределения с матожиданием t. Почему почти? Потому что если проинтегрировать такой график, то получится число, меньшее 1, а именно равное вероятности (плотность имеет смысл вероятности) того, что матожидание будет именно таким. Так что в данном конкретном случае УМО можно увидеть на графике, рассматривая сечения при различных y. А вероятность попасть в то или иное УМО— это значение функции в максимуме при конкретном значении y с поправкой на множитель $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. Если приглядеться, то можно увидеть, что вероятность попасть в матожидание убывает экспоненциально с

ростом y, и так оно и должно быть в силу выбора $p_{\eta}(y)$. Конечно, не всегда все так красиво, это просто жалкая попытка показать на картинке жизненный смысл всего этого безобразия.

§5. Характеристики случайных величин

5.1. Математическое ожидание

Математическое ожидание (обозначается \mathbb{E}) обобщает понятие среднего арифметического для произвольной случайной величины и показывает, какие значения в среднем принимает случайная величина. Оно, как и интеграл Лебега, вводится в несколько этапов. В этом определении вероятность \mathbb{P} играет роль Лебеговой меры μ .

• Если
$$\xi(\omega) = \sum_{i=1}^k x_i \mathbbm{1}(A_i) \quad (i \neq j \Rightarrow A_i A_j = \varnothing, \ \bigcup_{i=1}^k A_i = \Omega).$$

$$\mathbb{E}\xi = \int\limits_{\Omega} \xi(\omega) \mathbb{P}(d\omega) \equiv \sum_{i=1}^k x_i \mathbb{P}(\{\omega \colon \xi(\omega) = x_i\}) = \sum_{i=1}^k x_i \mathbb{P}(A_i).$$

• $\xi(\omega)\geqslant 0$. В этом случае аналогично интегралу Лебега

$$\mathbb{E}\xi = \int\limits_{\Omega} \xi d\mathbb{P} = \lim_{n \to \infty} \left[\sum_{k=1}^{n2^n} \frac{k-1}{2^n} \mathbb{P}\left(\left\{ \omega \colon \frac{k-1}{2^n} \leqslant \xi(\omega) < \frac{k}{2^n} \right\} \right) + n \mathbb{P}(\left\{ \omega \colon \xi(\omega) \geqslant n \right\}) \right].$$

• Для произвольной $\xi(\omega)$ вводятся

$$\xi^+(\omega) = \max\{0, \xi(\omega)\}, \quad \xi^-(\omega) = -\min\{0, \xi(\omega)\},$$

$$\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}\xi^+ - \mathbb{E}\xi^-.$$

Вспомним, что любая случайная величина ξ индуцирует вероятностное пространство $(\mathbb{R},\mathscr{B}_\xi,\mathbb{P}_\xi)$. Тогда, поскольку $\mathbb{P}_\xi(dx)$ есть вероятность попасть в dx, выразим ее через функцию распределения $\mathbb{P}_\xi(dx) = F_\xi(x+dx) - F_\xi(x) = dF_\xi(x)$ Тогда перепишем матожидание в более привычной форме

$$\mathbb{E}\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega) \mathbb{P}(d\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \mathbb{P}_{\xi}(dx) = \int_{-\infty}^{+\infty} x dF_{\xi}(x).$$

Перечислим некоторые свойства математического ожидания:

- 1. $\mathbb{E}(\xi + a) = \mathbb{E}\xi + a \quad \forall a \in \mathbb{R},$
- 2. $\mathbb{E}(a\xi) = a\mathbb{E}\xi \quad \forall a \in \mathbb{R}.$
- 3. $\mathbb{E}(\xi + \eta) = \mathbb{E}\xi + \mathbb{E}\eta$ (здесь подразумевается, что существуют два из трех математических ожидания, из чего следует существование третьего).

Пример. Рассмотрим дискретную случайную величину ξ , которая принимает значения n с вероятностью $\frac{c}{n^2}$ ($c=\frac{6}{\pi^2}$). По определению

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{c}{n^2}.$$

Данный ряд, очевидно, расходится. Ситуацию не спасет даже рассмотрение случайной величины η , принимающей значения $\pm n$ с вероятностью $\frac{c}{2n^2}$, которая имеет среднее значение 0, поскольку $\mathbb{E}\eta = \sum_{n=1}^\infty \frac{c}{2n} - \sum_{n=1}^\infty \frac{c}{2n}$, что не определено, поскольку интегралы Лебега от η^+ и η^- расходятся.

Пример. Другим примером является распределение Коши с плотностью $p_{\xi}(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$. График этой функции симметричен относительно 0 и похож на горку, из чего методом пристального взгляда можно сделать вывод, что средним значением должно быть 0. Однако $\int\limits_{-\infty}^{+\infty}xdF_{\xi}(x)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}xp_{\xi}(x)dx$ расходится, поэтому математического ожидания не существует.

5.2. Моменты, дисперсия, ковариация и прочее

Определение 5.1. Моментом порядка k случайной величины ξ называется $\mathbb{E}\xi^k$. Абсолютным моментом порядка k случайной величины ξ называется $\mathbb{E}|\xi|^k$. Центральным моментом порядка k случайной величины ξ называется $\mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^k$.

Определение 5.2. *Квантилью* случайной величины ξ порядка q называется величина $l_{\xi}(q)$:

$$l_{\xi}(q) \colon \begin{cases} \mathbb{P}(\xi \leqslant l_{\xi}(q)) \geqslant q \\ \mathbb{P}(\xi \geqslant l_{\xi}(q) \geqslant 1 - q) \end{cases}$$

В случае $q=\frac{1}{2}$ квантиль называется медианой и обозначается $\det \xi$. Если $q=\frac{1}{4}$, то l_ξ называется квартилью, если $q=\frac{1}{10}$, децилью, а если $q=\frac{1}{100}$ — перцентилью.

Жизненный смысл медианы заключается в том, что она является точкой, вероятность попасть левее которой равна вероятности попасть правее нее. Аналогично можно сказать про квантиль любого порядка. Квантиль определена не единственным образом: пусть ξ принимает значения $\{0,1\}$ с вероятностями $\frac{1}{2}$. Тогда медианой ξ может быть любая точка из отрезка [0,1].

Определение 5.3. Интерквантильный размах — величина $R_{\xi} = l_{\xi}(\frac{3}{4}) - l_{\xi}(\frac{1}{4})$ — длина отрезка, вероятность попасть в который равна $\frac{1}{2}$.

С матожиданием и медианой связана задача о «деловых людях». (здесь будет ссылка)

Определение 5.4. Moda случайной величины ξ — это наиболее вероятное значение случайной величины. Обозначается $mod \xi$.

При наблюдении случайной величины важно знать не только её среднее значение (матожидание), но и то, как сильно она от него отклоняется (например, измерение линейкой в среднем дает правильный результат, однако необходимо знать погрешность измерения). В связи с этим вводится понятие дисперсии.

Определение 5.5. Пусть для случайной величины ξ существуют конечный $\mathbb{E}\xi$ и $\mathbb{E}\xi^2$. Дисперсией назывется величина, равная

$$\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2.$$

Эту формулу можно привести к более простому для вычисления виду:

$$\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}(\xi^2 - 2\xi\mathbb{E}\xi + (\mathbb{E}\xi)^2) = \mathbb{E}\xi^2 - 2\mathbb{E}\xi\mathbb{E}\xi - (\mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2.$$

Перечислим некоторые свойства дисперсии. ξ,η - случайные величины, $c\in\mathbb{R}.$

- 1. $\mathbb{D}\xi \geqslant 0$ как матожидание от неотрицательной функции;
- 2. $\mathbb{D} c \xi = c^2 \mathbb{D} \xi$ следует из определения и линейности матожидания;
- 3. $\mathbb{D}(\xi+c) = \mathbb{E}(\xi+c-\mathbb{E}(\xi+c))^2 = \mathbb{E}(\xi-\mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{D}\xi;$
- 4. $\mathbb{P}(\xi = c) = 1 \Leftrightarrow \mathbb{D}\xi = 0$ отклонение равно нулю для константы;
- 5. $\mathbb{D}(\xi + \eta) = \mathbb{E}(\xi + \eta)^2 (\mathbb{E}(\xi + \eta))^2 = \mathbb{E}(\xi^2 + 2\xi\eta + \eta^2) (\mathbb{E}\xi)^2 2\mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta (\mathbb{E}\eta)^2 = \mathbb{D}\xi + \mathbb{D}\eta + 2(\mathbb{E}\xi\eta \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta).$

Определение 5.6. Ковариация двух случайных величин — это величина, равная

$$cov(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)(\eta - \mathbb{E}\eta).$$

Ковариация положительна, если случайные величины одновременно отклоняются в одну сторону и отрицательная, если в разные. Формулу ковариации так же можно упростить, раскрыв скобки в определении:

$$cov(\xi, \eta) = \mathbb{E}\xi\eta - \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta.$$

Таким образом пятое свойство дисперсии можно переписать так:

5.
$$\mathbb{D}(\xi \pm \eta) = \mathbb{D}\xi + \mathbb{D}\eta \pm 2\mathrm{cov}(\xi, \eta)$$
.

Определение 5.7. Среднеквадратическое отклонение — величина $\sigma = \sqrt{\mathbb{D}\xi}$.

5.3. Независимость случайных величин

Определение 5.8. Случайные величины ξ, η называются *независимыми*, если

$$\forall B_1, B_2 \in \mathscr{B} \quad \mathbb{P}(\xi \in B_1, \eta \in B_2) = \mathbb{P}(\xi \in B_1) \mathbb{P}(\eta \in B_2).$$

Утверждение 5.9. Для независимых случайных величин ξ, η выполнено

$$\mathbb{E}\xi\eta = \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta.$$

Доказательство. Проведем только для случая дискретных случайных величин. Пусть

$$\xi = \begin{cases} x_1, x_2, \dots, \\ p_1, p_2, \dots, \end{cases}$$

то есть ξ приминмает значение x_i с вероятностью p_i .

$$\eta = \begin{cases} y_1, y_2, \dots, \\ q_1, q_2, \dots \end{cases}$$

$$\begin{split} \mathbb{E}\xi\eta &= \sum_{i,j} x_i y_j \mathbb{P}(\xi = x_i, \eta = y_j) = \sum_{i,j} x_i y_j \mathbb{P}(\xi = x_i) \mathbb{P}(\eta = y_j) = \\ &\qquad \qquad \sum_i x_i \mathbb{P}(\xi = x_i) \sum_j y_j \mathbb{P}(\eta = y_j) = \mathbb{E}\xi \mathbb{E}\eta. \end{split}$$

Для независимых случайных величин

$$cov(\xi, \eta) = \mathbb{E}\xi\eta - \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta = 0.$$

Обратное, вообще говоря, неверно: пусть мы равновероятно выбираем одну из точек (-1,0),(0,1),(1,0),(0,-1). Каждая координата принимает значения -1,0,1, но координаты зависимы, так как $\mathbb{P}(x=0,y=0)=0$ (никогда не выбираем (0,0)), а $\mathbb{P}(x=0)\mathbb{P}(y=0)=\frac{1}{2}\frac{1}{2}\neq 0$. Однако

$$\mathbb{E}x = \mathbb{E}y = \mathbb{E}xy = 0$$

в силу симметрии задачи. Отсюда cov(x, y) = 0.

Таким образом, ковариация показывает зависимость величин, однако не дает представления, насколько они зависимы. Для это вводится понятие коэффициента корреляции — нормированная ковариация.

Определение 5.10. *Коэффициент корреляции* — величина, описываемая формулой

$$\rho(\xi, \eta) = \frac{\operatorname{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{\mathbb{D}\xi\mathbb{D}\eta}}.$$

Коэффициент корреляции является псевдоскалярным произведением, то есть выполнены все аксиомы скалярного произведения, кроме половины четвертой. Поэтому для нее выполнено неравенство Коши-Буняковского.

Некоторые свойства коэффициента корреляции:

- 1. $|\rho(\xi,\eta)| \le 1$ неравенство Коши-Буняковского.
- 2. $|\rho(\xi,\eta)|=1 \Leftrightarrow \exists a,b$: $\mathbb{P}(\xi=a\eta+b)=1$ равенство достигается, если случайные величины линейно зависимы.
- 3. Для независимых случайных величин $\rho(\xi, \eta) = 0$.

Неравенство Маркова, неравенство Чебышева

Лемма 5.11. Для любой неотрицательной неубывающей функции g(x) выполнено неравенство

$$\mathbb{P}(|\xi| > x) \leqslant \frac{\mathbb{E}g(|\xi|)}{g(x)}$$

Доказательство.

$$\begin{split} \mathbb{E}g(|\xi|) &= \mathbb{E}g(|\xi|)\mathbb{1}(|\xi| \geqslant x) + \mathbb{E}g(|\xi|)\mathbb{1}(|\xi| < x) \geqslant \\ & \mathbb{E}g(|\xi|)\mathbb{1}(|\xi| \geqslant x) \geqslant g(x)\mathbb{E}\mathbb{1}(|\xi| \geqslant x) = g(x)\mathbb{P}(|\xi| > x) \end{split}$$

Здесь мы воспользовались представлением $1 = \mathbb{1}(A) + \mathbb{1}(\overline{A})$, затем неотрицательностью функции и, следовательно, ее матожидания. Далее использовалась монотонность функции, и в последнем переходе тождество $\mathbb{E}\mathbb{1}(A)=\mathbb{1P}(A)+\mathbb{0P}(\overline{A})=$ $\mathbb{P}(A)$.

Из этой леммы следуют два полезных неравенства.

Теорема 5.12 (неравенство Маркова). Для любой случайной величины ξ , имееющей конечное $\mathbb{E}|\xi|$, выполнено

$$\mathbb{P}(|\xi| > \varepsilon) \leqslant \frac{\mathbb{E}|\xi|}{\varepsilon}$$

Доказательство.

В неравенстве леммы возьмем g(x) = x.

Теорема 5.13 (неравенство Чебышева). Для любой случайной величины ξ , имееющей конечный первый и второй момент, выполнено

$$\mathbb{P}(|\xi - \mathbb{E}\xi| > \varepsilon) \leqslant \frac{\mathbb{D}\xi}{\varepsilon^2}$$

Доказательство. В неравенстве леммы возьмем $g(x) = x^2$.



§6. Распределения и предельные теоремы

6.1. Распределение Бернулли

Определение 6.1. Дискретная случайная величина ξ имеет *распределение Бернулли*, если

$$\mathbb{P}(\xi = x_1) = p, \ \mathbb{P}(\xi = x_2) = q = 1 - p, \quad x_1 \neq x_2.$$

Определение 6.2. *Схема Бернулли* — последовательность испытаний, удовлетворяющих следующим условиям:

- 1. Дихотомичность у каждого испытания два исхода, называемые «успехом» и «неудачей» или, сокращенно У/Н.
- 2. Независимость результаты испытаний являются независимыми событиями.
- 3. Однородность вероятности успеха в каждом испытании равны.

Из определения следует, что одно испытание имеет распределение Бернулли. Элементарным исходом в схеме Бернулли из n испытаний будет являться

$$\omega = (x_1, x_2, \dots, x_n),$$

где x_i — результат испытания i. Пусть в элементарном исходе k успехов. Тогда

$$\mathbb{P}(\omega) = p^k q^{n-k}.$$

Покажем, что вероятность, введенная таким образом, удовлетворяет всем аксиомам вероятностной меры. Не очевидной здесь является только проверка нормировки, то есть надо доказать, что

$$\sum_{\omega} \mathbb{P}(\omega) = 1.$$

Для этого просуммируем все исходы по числу успехов (обозначим μ_n)

$$\sum_{\omega} \mathbb{P}(\omega) = \sum_{k=0}^{n} \sum_{\omega: \, \mu_n = k} \mathbb{P}(\omega) = \sum_{k=0}^{n} \sum_{\omega: \, \mu_n = k} p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k q^{n-k} = (p+q)^n = 1.$$

Рассмотрим теперь некоторые важные распределения, связанные со схемой Бернулли.

Уже рассмотренная величина μ_n , равная числу успехов в n испытаниях Бернулли, является случайной величиной с распределением

$$\forall k = 0, 1, \dots, n \quad \mathbb{P}(\mu_n = k) = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Это следует из того, что исходов с k успехами ровно C_n^k , а вероятность каждого равна p^kq^{n-k} . Такое распределение называется биномиальным и обозначается Bi(n,p).

Рассмотрим случайные величины $X_i=\mathbbm{1}(A_i)$ $i=1,\dots,n$, где A_i — успех в i-м испытании. Каждая такая величина имеет распределение Бернулли. Тогда число успехов можно представить так:

$$\mu_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Найдем матожидание и дисперсию μ_n

$$\mathbb{E}\mu_n = \mathbb{E}\sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i = \sum_{i=1}^n (1p + 0q) = np,$$

$$\mathbb{E}X_i^2 = 1p + 0q = p,$$

$$\mathbb{D}X_i = \mathbb{E}X_i^2 - (\mathbb{E}X_i)^2 = p - p^2 = pq.$$

В силу независимости испытаний дисперсия линейна относительно сложения

$$\mathbb{D}\mu_n = \mathbb{D}\sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n \mathbb{D}X_i = \sum_{i=1}^n pq = npq.$$

Теорема 6.3 (Бернулли). Для случайной величины с распределением Bi(n,p)

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{npq}{n^2 \varepsilon^2}.$$

Доказательство. Домножим обе части неравенства на n и воспользуемся неравенством Чебышева:

$$\mathbb{P}(|\mu_n - pn| \geqslant n\varepsilon) \leqslant \frac{\mathbb{D}(\mu_n)}{(n\varepsilon)^2} = \frac{npq}{n^2\varepsilon^2}.$$

6.2. Многочлен Бернштейна

Пусть $f(x) \in C[0,1]$.

Определение 6.4. Многочленом Бернштейна называется функция

$$B_n(x,f) = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right), \quad x \in [0,1].$$

Заметим, что $B_n(x,f)=\mathbb{E}f(\frac{\mu_n}{n}),\quad \mu_n\sim Bi(n,x).$ (запись $\xi\sim$ *destrname* означает, что случайная величина ξ имеет распределение *destrname*).

Утверждение 6.5.

$$B_n(x, f) \Longrightarrow f(x), \quad x \in [0, 1].$$

Доказательство. Пользуясь тем, что $\sum\limits_{k=0}^{n} C_{n}^{k} x^{k} (1-x)^{n-k} = 1$ получим

$$|B_n(x,f) - f(x)| = \left| \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) - \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} f(x) \right| \le \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right|.$$

Разобьем данную сумму на две:

$$\sum_{k=0}^{n} = \sum_{|\frac{k}{n} - x| < \delta} + \sum_{|\frac{k}{n} - x| \ge \delta}.$$

Выберем δ так, чтобы первая сумма была меньше $\frac{\varepsilon}{2}$. Это всегда можно сделать, так как функция f(x) непрерывна, а $\sum\limits_{|\frac{k}{n}-x|<\delta} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leqslant 1$. Во второй сумме ограничим модуль числом $M=2\sup\limits_{[0,1]} f(x)$ (1-я теорема Вейерштрасса), а к оставшейся сумме применим неравенство Чебышева, поскольку она равна вероятности $\mathbb{P}(|\mu_n-nx|\geqslant n\delta)$.

$$\sum_{|\frac{k}{n}-x|\geqslant\delta}\ldots\leqslant 2M\sum_{|\frac{k}{n}-x|\geqslant\delta}C_n^kx^k(1-x)^{n-k}\leqslant 2M\frac{1}{n\delta^2}.$$

Выбором n сделаем вторую сумму меньше $\frac{\varepsilon}{2}$, доказав, тем самым, равномерную сходимость.

Пусть в схеме Бернулли с вероятностью успеха $0 величина <math>\eta$ равна номеру первого успеха. η является случайной величиной, принимающей натуральные значения. Найдем распределение η : серия, в которой первый успех появляется в k-м испытании выглядит так: НН...НУ. Отсюда

$$\forall k\in\mathbb{N}\quad\mathbb{P}(\eta=k)=(1-p)^{k-1}p=q^{k-1}p.$$
 Так как $\Omega=\left\{\omega_k=\underbrace{0\ldots 0}_k1\colon k\in\mathbb{N}\right\}$, то
$$\sum_{k=1}^n\mathbb{P}(\omega_k)=\sum_{k=1}^np(1-p)^{k-1}=1.$$

Такое распределение называется *геометрическим с параметром* p. Пусть ξ имеет геометрическое распределение с параметром p. Тогда

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1} = -p\sum_{k=1}^{\infty} \frac{d}{dp}(1-p)^k = -p\frac{d}{dp}(\frac{1-p}{p}) = \frac{1}{p}.$$

Аналогично, дифференцируя степенные ряды, получим дисперсию

$$\mathbb{D}\xi = \frac{q}{p^2}.$$

Пусть теперь θ — число неудач до r-го успеха. Тогда

$$\forall k \in \mathbb{Z}_0 \quad \mathbb{P}(\theta = k) = p^r q^k C_{k+r-1}^k.$$

Это следует из того, что всего испытаний было r+k, на последнем месте успех, а до него как-то располагаются k неудач и r-1 успех. Такое распределение называется отрицательным биномиальным с параметрами r,p.

6.3. Распределение Пуассона. Теорема Муавра-Лапласа

Теорема 6.6 (Пуассон). Пусть $\lambda = np$. Тогда при малых p и больших n можно использовать приближение

$$\mathbb{P}(\mu_n = k) = C_n^k p^k q^{n-k} \approx \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}.$$

Доказательство. Докажем индукцией по k. При k=0

$$\mathbb{P}(\mu_n = 0) = (1 - p)^n = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \longrightarrow e^{-\lambda} \quad (n \to \infty).$$

$$\frac{\mathbb{P}(\mu_n = k)}{\mathbb{P}(\mu_n = k - 1)} = \frac{n!}{k!(n - k)!} p^k q^{n - k} \frac{(k - 1)!(n - k + 1)!}{n!} \frac{1}{p^{k - 1} q^{n - k + 1}} = \frac{(n - k + 1)p}{kq}.$$

$$\mathbb{P}(\mu_n = k) = \frac{(n - k + 1)p}{kq} \mathbb{P}(\mu_n = k - 1) = \frac{(n - k + 1)\frac{\lambda}{n}}{k(1 - \frac{\lambda}{n})} \mathbb{P}(\mu_n = k - 1).$$

Воспользуемся предположением индукции для k-1.

$$\mathbb{P}(\mu_n = k) \to \frac{(n-k+1)\frac{\lambda}{n}}{k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)} \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \longrightarrow \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} (n \to \infty).$$

Следующая оценка формализует «малость» p и «величину» n:

$$\sup_{k} \left| \mathbb{P}(\mu_n = k) - \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \right| \leqslant 2np^2.$$

Таким образом, зная n,p всегда можно оценить сверху погрешность аппроксимации.

Зочем? При очень большом числе испытаний ни один нормальный компьютер не способен вычислить $C_n^k p^k q^{n-k}$, а уж тем более сложить их. Данная теорема позволяет сводить вычисление таких сложных вещей к вычислению экспонент.

Определение 6.7. Распределение величины ξ такое, что $\forall k \in \mathbb{Z}_+$ $\mathbb{P}(\xi = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$, называется распределением Пуассона и обозначается $\mathrm{Pois}\,(\lambda)$.

Одно из приложений распределения Пуассона — это пуассоновские потоки. Пусть во времени происходят некоторые события, которые мы фиксируем. λ — интенсивность потока — показывает среднее число событий за единицу времени. Тогда число произошедших событий на отрезке [0,t] равно $\xi_t\colon \mathbb{P}(\xi_t=k)=\frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^k}{k!}$.

Свойства пуассоновского распределения ($\xi \sim \text{Pois}(\lambda)$).

- 1. $\mathbb{E}\xi = \lambda$.
- 2. $\mathbb{D}\xi = \lambda$.

3.
$$\xi_i \sim \text{Pois}(\lambda_i)$$
 $i = 1, ..., n \Rightarrow \sum_{i=1}^n \xi_i \sim \text{Pois}(\sum_{i=1}^n \lambda_i)$.

Утверждение 6.8. Пусть независимые случайные величины $\xi_i \sim {\rm Pois}\,(\lambda_i), \quad i=1,2.$ Тогда условное распределение ξ_1 при условии $\xi_1+\xi_2=n$ имеет биномиальное распределение с параметрами $n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2},$ то есть

$$\mathbb{P}(\xi_1 = k | \xi_1 + \xi_2 = n) = C_n^k p^k (1 - p)^{n - k}, \quad p = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

Доказательство.

$$\mathbb{P}(\xi_1 = k | \xi_1 + \xi_2 = n) = \frac{\mathbb{P}(\xi_1 = k, \xi_1 + \xi_2 = n)}{\mathbb{P}(\xi_1 + \xi_2 = n)} = \frac{\mathbb{P}(\xi_1 = k, \xi_2 = n - k)}{\mathbb{P}(\xi_1 + \xi_2 = n)} = \dots$$

В числителе воспользуемся независимостью ξ_1, ξ_2 , а в знаменателе свойством 3 пуассоновского распределения:

$$\dots = \frac{e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}}{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!}} = C_n^k \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{n-k}.$$

Теорема 6.9 (Муавра-Лапласа). Пусть \sqrt{npq} велико. Тогда

$$\mathbb{P}(\mu_n = k) = \mathbb{P}\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}} + o(1), \quad x \equiv \frac{k - np}{\sqrt{npq}}.$$

Доказательство. Не было и не должно быть.

Рассмотрим функции

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \int_{-\infty}^{x} \varphi(u) du.$$

Заметим, что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(u)du = 1.$$

Это верно, так как данный интеграл сводится заменой $t=\frac{x}{\sqrt{2}}$ к известному интегралу Пуассона.

Так как $\varphi(x)$ неотрицательна, и интеграл от нее по всей прямой равен 1, она является плотностью некоторого абсолютно непрерывного распределения, которое называется *стандартным нормальным распределением* и обозначается $\mathcal{N}(0,1)$.

Пусть $\xi \sim \mathcal{N}(0,1)$.

$$\mathbb{E}\xi^{k} = \int_{-\infty}^{+\infty} x^{k} \varphi(x) dx.$$

$$e^{h\xi} = 1 + h\xi + \frac{(h\xi)^{2}}{2!} + \dots$$

$$\mathbb{E}e^{h\xi} = 1 + h\mathbb{E}\xi + \frac{h^{2}}{2!}\mathbb{E}\xi^{2} + \dots \equiv \psi(h).$$

Определение 6.10. Функция $\psi(h)$ называется производящей функцией моментов.

Производящая функция моментов позволяет легко найти любой момент, просто взяв производную от функции в нуле.

$$\psi(h) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{hx} \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{hx - \frac{x^2}{2}} dx = \frac{e^{\frac{h^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-h)^2}{2}} dx = e^{\frac{h^2}{2}}.$$

$$e^{\frac{h^2}{2}} = 1 + \frac{h^2}{2} + \frac{1}{2!} \left(\frac{h^2}{2}\right)^2 + \dots$$

Приравнивая это равенство к предыдущему разложению, получим, что все нечетные центральные моменты равны 0.

$$\mathbb{E}\xi^{2n-1} = 0.$$

$$\frac{1}{n!2^n} = \frac{\mathbb{E}\xi^{2n}}{(2n)!} \Rightarrow \mathbb{E}\xi^{2n} = \frac{(2n)!}{n!2^n} = \frac{2n(2n-1)\dots n \dots 1}{n!2^n} = (2n-1)!!$$

Последняя формула позволяет очень быстро получить нужный момент, не считая интеграл по частям много раз.

Теорема 6.11 (Интегральная теорема Муавра-Лапласа). Пусть \sqrt{npq} велико. Тогда

$$\mathbb{P}(m_1 \leqslant \mu_n \leqslant m_2) = \mathbb{P}\left(\frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}} \leqslant \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \leqslant \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx,$$
$$x1 \equiv \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}, \quad x2 \equiv \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}.$$

С данной теоремой связана «Задача о докторе Споке». (Добавить ссылку)

Рассмотрим теперь случайную величину ξ с геометрическим распределением. Поскольку $\mathbb{E}\xi=\frac{1}{n}$,

$$p\xi = \frac{\xi}{\mathbb{E}\xi}.$$

При стремлении вероятности успеха к нулю, номер первого успеха будет стремиться к бесконечности, как и матожидание ξ . Однако их отношение будет иметь конечный предел:

$$\forall x > 0 \quad \mathbb{P}(p\xi > x) = \mathbb{P}\left(\xi > \frac{x}{p}\right) = \sum_{k = \left[\frac{x}{p}\right] + 1}^{\infty} p(1 - p)^{k - 1} = \frac{p(1 - p)^{\left[\frac{x}{p}\right]}}{p} = (1 - p)^{\left[\frac{x}{p}\right]}.$$

$$\lim_{p \to 0} \mathbb{P}(p\xi > x) = \lim_{p \to 0} (1 - p)^{\left[\frac{x}{p}\right]} = e^{-x}.$$

В последнем переходе от дробной части можно избавиться, так как она не вносит никакого вклада в предел. Итак, получили, что

$$\lim_{p \to 0} \mathbb{P}(p\xi < x) = 1 - e^{-x}.$$

Это частный случай *показательного* (экспоненциального) распределения. В общем случае оно выглядит так:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x},$$

$$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}.$$

Матожидание случайной величины, распределенной показательно, имеет вид

$$\int_{0}^{\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$

Показательно распределение обладает интересным свойством: свойством отсутствия последействия (или отсутствия памяти). Предположим, что вы ждете автобус на остановке, а время между автобусами ξ имеет показательное распределение. Тогда вероятность того, что вы прождете автобус еще t никак не зависит от того, как долго (τ) вы уже ждете. Формализуем это:

$$\mathbb{P}(\xi > t + \tau | \xi > \tau) = \mathbb{P}(\xi > t).$$

По определению условной вероятности

$$\mathbb{P}(\xi > t + \tau | \xi > \tau) = \frac{\mathbb{P}(\xi > t + \tau, \xi > \tau)}{\mathbb{P}(\xi > \tau)} = \frac{\mathbb{P}(\xi > t + \tau)}{\mathbb{P}(\xi > \tau)} = \frac{e^{-\lambda(t + \tau)}}{e^{-\lambda\tau}} = e^{-\lambda t}.$$

Показательное распределение является единственным обладающим таким свойством в классе абсолютно непрерывных распределений. В классе дискретных распределений таким свойством обладает только геометрическое распределение (введенное как число неудач до первого успеха).

6.4. Характеристические функции

Введем еще какие-нибудь понятия, которые что-то там нам облегчат (наверное).

Определение 6.12. Пусть ξ — случайная величина. Тогда будем говорить, что $f_{\xi}(x)$ — характеристическая функция ξ , если:

$$f_{\varepsilon}(t) = \mathbb{E}e^{it\xi}.$$

Поясним раз. $\mathbb{E}e^{it\xi}$, чтобы не сломать мозг раньше времени, понимаем в смысле $\mathbb{E}e^{it\xi}=\mathbb{E}\cos t\xi+i\mathbb{E}\sin t\xi.$

Поясним два. Если ξ — дискретная случайная величина, то она задается рядом распределения $\mathbb{P}(\xi=x_k)$, тогда $f_\xi(t)=\sum_k e^{itx_k}\mathbb{P}(\xi=x_k)$. Если же ξ — абсолютно непрерывная случайная величина, то $f_\xi(t)=\int e^{itx}dF_\xi(x)$, где $F_\xi(x)$ — функция распределения ξ , а интеграл как всегда берется по всему пространству, да еще и Лебегов.

Прежде чем мы немного поковыряем свойства харфункции и посмотрим примерчики, введем еще пару определений, ведь без определений так скучно жить!

Определение 6.13. Функция f(x) называется <u>неотрицательно определенной</u>, если:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall t_1, \dots t_n \in \mathbb{R} \quad \forall z_1, \dots z_n \in \mathbb{C} \quad \sum_{i,j=1}^n f(t_i - t_j) z_i \overline{z_j} \geqslant 0.$$

Определение 6.14. Случайная величина ξ имеет решетчатое распределение, если $\exists a,b \colon \sum_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{P} \left(\xi = a + bk \right) = 1$. Тогда число b называется шагом распределени я.

Свойства (под f(t) подразумевается $f_{\xi}(t)$ для какой-то случайной величины ξ):

- 1. $|f(t)| \leq 1$.
- 2. f(0) = 1.
- 3. $f(-t) = \overline{f(t)}$
- 4. $\forall t \in \mathbb{R} \quad f_{\xi}(t) \in \mathbb{R} \iff \xi$ распределена симметрично (тривиальное следствие из предыдущего).

5. f(t) равномерно непрерывна на \mathbb{R} .

6. Если
$$\eta=a\xi+b$$
, то $f_{\eta}(t)=e^{itb}f_{\xi}(at).$

- 7. Если ξ_1, \dots, ξ_n независимые случайные величины, и $\eta = \xi_1 + \dots + \xi_n$, то $f_{\eta}(x) = \prod_{k=1}^n f_{\xi_k}(x)$.
- 8. Если $\mathbb{E}\left|\xi^{k}\right|<\infty$, то $\mathbb{E}\xi^{k}=i^{k}f_{\xi}^{(k)}(0)$. Если k четно, то верно и обратное утверждение.
- 9. Верна

Теорема 6.15 (Бохнера-Хинчина). f(t) является характеристической функцией $\iff f(0) = 1$ и f(t) обладает свойством неотрицательной определенности.

10.
$$|f_{\xi}(t)|$$
 интегрируема $\implies p_{\xi}(x) \xrightarrow[|x| \to \infty]{} 0$, где $p_{\xi}(x)$ — плотность распределения.

11. Случайная величина ξ имеет решетчатое распределение с шагом $b\iff \left|f_{\xi}\left(\frac{2\pi}{b}\right)\right|=1.$

Не расслабляться! Сейчас докажем некоторые утверждения.

Доказательство. (5)

$$\left| f(t+h) - f(t) \right| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(t+h)x} dF(x) + \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF(x) \right| \leqslant \int_{-\infty}^{\infty} \left| e^{itx} \left(e^{ith} + 1 \right) \right| dF(x) \leqslant \left| \int_{-\infty}^{\infty} \left| e^{ihx} - 1 \right| dF(x) \right| = \int_{\left| x \right| \leqslant M} \left| e^{ith} - 1 \right| dF(x) + \int_{\left| x \right| > M} \left| e^{ith} - 1 \right| dF(x).$$

Оценим теперь интегралы I_1 и I_2 . Функция, непрерывная на компакте равномерно непрерывна на нем, а значит $\forall \varepsilon>0 \quad \exists h$, такой что $I_1<\frac{\varepsilon}{2}$. Для второго интеграла имеем: $\left|e^{ith}-1\right|\leqslant 2 \implies I_2\leqslant 2\mathbb{P}\left(|\xi|>M\right)<\frac{\varepsilon}{2}$ за счет выбора M.

Доказательство. (7)

Воспользуемся независимостью случайных величин, чтобы разбить одно большое матожидание на много маленьких.

$$f_{\xi_1+\ldots+\xi_n} = \mathbb{E}e^{it(\xi_1+\ldots+\xi_n)} = \mathbb{E}\left(e^{it\xi_1}\ldots e^{it\xi_n}\right) = \mathbb{E}e^{it\xi_1}\ldots \mathbb{E}e^{it\xi_n} = \prod_{k=1}^n f_{\xi_k}(x).$$

Доказательство. (8)

Первую производную посчитаем по определению:

$$f'_{\xi}(t) = \lim_{h \to 0} \frac{f_{\xi}(t+h) - f_{\xi}(t)}{h} = \lim_{h \to 0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixt} \frac{e^{ixh} - 1}{h} dF_{\xi}(x) = \dots$$

Тут у нас $\frac{e^{\imath xh}-1}{h}\leqslant |x|$, поэтому интеграл сходится равномерно (признак Вейерштрасса), и мы можем поменять местами предел и интеграл и ничего нам за это не будет:

$$\dots = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixt} \lim_{h \to 0} \frac{e^{ixh} - 1}{h} dF_{\xi}(x) = \dots$$

Теперь надо пристально посмотреть на последнее подынтегральное выражение и заметить там 3-ий замечательный предел:

$$\frac{e^{ixh} - 1}{h} \xrightarrow[h \to 0]{} ix.$$

Тогда продолжаем:

$$\dots = i \int_{-\infty}^{\infty} x e^{itx} dF_{\xi}(x).$$

При $t = 0 e^{itx} = 1$, поэтому

$$f'_{\xi}(0) = i \int_{-\infty}^{\infty} x dF(x) = i \mathbb{E} \xi.$$

По индукции показываем справедливость для производных старших порядков. Обратное утверждение для четных k доказывать не будем. Но там немного полопиталить и доказать это все безобразие по индукции. Можно залезть в Ширяева и удовлетворить свое любопытство.

Зочем? Мяу. Если $\mathbb{E}\left|\xi\right|^n<\infty$, то мы можем записать харфункцию в виде суммы:

$$f_{\xi}(t) = \sum_{k=0}^{n} \frac{t^{k}}{k!} f_{\xi}^{(k)}(0) + \overline{o}(t^{k}) = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{(it)^{k}}{k!} \mathbb{E}\xi^{k} + \overline{o}(t^{k}).$$

Довольно удобно считать моменты, если мы уверены в их существовании. Теперь рассмотрим некоторые примеры:

Пример. Найдем характеристическую функцию для стандартного нормального рас-

пределения $\mathcal{N}(0,1)$ с плотностью $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-x^2}{2}}$.

$$f(t) = \mathbb{E}e^{it\xi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} e^{\frac{-x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2} e^{-\frac{t^2}{2}} dx =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2} d(x-it) = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

Пример. Вот представь ситуацию: входишь ты в хату, а тебе пахан кидает под ноги кидает $\cos t^2$ и говорит: «а найди-ка нам случайную величину, для которой это выражение будет харфункцией». Тут главное — не зашквариться и по понятиям пояснить, что если бы $\cos t^2$ была бы харфункцией, то по свойству (5) она была бы равномерно непрерывной на \mathbb{R} , а это не так: если $t_1^2=2\pi k-\frac{\pi}{2}$, а $t_2^2=2\pi k$, то $\cos t_2^2-\cos t_1^2=1$, а

$$t_2 - t_1 = \sqrt{2\pi k} - \sqrt{2\pi k - \frac{\pi}{2}} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{2\pi k} + \sqrt{2\pi k - \frac{\pi}{2}}} \xrightarrow[k \to \infty]{} 0.$$

То есть для любого наперед заданного $\delta>0$ мы можем найти k достаточно большое, чтобы разность между t_1 и t_2 была меньше δ , а $\cos t_2^2-\cos t_1^2=1$, что противоречит условию равномерной непрерывности.

Пример. А теперь найдем случайную величину ξ , такую что $\mathbb{E}e^{it\xi}=\cos t$. Для этого вспомним, что если ξ — дискретная случайная величина, то $\mathbb{E}g(\xi)=\sum_k g(k)\mathbb{P}\left(\xi=k\right)$

$$\cos t = \frac{1}{2} \left(e^{it} + e^{-it} \right) \implies \xi = \begin{cases} -1, & \mathbb{P} \left(\xi = -1 \right) = \frac{1}{2} \\ 1, & \mathbb{P} \left(\xi = 1 \right) = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

6.5. Распределение функций от случайных величин

Рассмотрим отображение $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ с якобианом $J_f = \frac{D(f_1(x),\dots,f_n(x))}{D(x_1,\dots,x_n)}$. Если он отличен от 0, то существует обратная функция, и выполнено соотношение

$$J_f J_{f^{-1}} = 1.$$

Теорема 6.16. Пусть $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ — достаточно гладкая функция с ненулевым якобианом. $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \sim p_{\xi}(x)$. Рассмотрим случайную величину $\eta = f(\xi)$. Тогда

$$p_{\eta}(x) = p_{\xi}(f^{-1}(x))|J_{f^{-1}}(x)|.$$

Доказательство. Вспомним формулу замены переменных в интеграле:

$$\int_{B} \varphi(x)dx = \int_{f^{-1}(B)} \varphi(f(y))|J_{f}(y)|dy$$

Тогда $\forall B \in \mathscr{B}_n$

$$\int_{B} p_{\xi}(f^{-1}(x))|J_{f^{-1}(x)}|dx = \int_{f^{-1}(B)} p_{\xi}(f(f^{-1}(B)))|J_{f^{-1}(x)}||J_{f(x)}|dx = .$$

$$\int_{f^{-1}(B)} p_{\xi}(x) dx = \mathbb{P}(\xi \in f^{-1}(B)) = \mathbb{P}(f(\xi) \in B) = \mathbb{P}(\eta \in B).$$

Теперь найдем формулу для плотности суммы случайных величин. Пусть $\xi = (\xi_1, \xi_2) \sim p_{\xi}(x)$. Рассмотрим $f: (x_1, x_2) \mapsto (x_1 + x_2, x_2)$. Тогда

$$f^{-1}: (x_1, x_2) \mapsto (x_1 - x_2, x_2), \quad J_{f^{-1}} = 1.$$

Обозначим $\eta=f(\xi)$. Тогда по только что доказанной теореме $p_{\eta}(x_1,x_2)=p_{\xi}(x_1-x_2,x_2)$. Тогда по свойству 4 функции распределения векторной случайной величины

$$p_{\xi_1+\xi_2}(x) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(x-x_2,x_2) dx_2 = \{\text{независимость} \xi_1,\xi_2\} = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi_1}(x-x_2) p_{\xi_2}(x_2) dx_2.$$

В силу симметрии

$$p_{\xi_1+\xi_2}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi_1}(x_1) p_{\xi_2}(x-x_2) dx_1.$$

Эти формулы называются формулами свертки. Существует аналогичная формула для функция распределения, но мы ее не доказываем, потому что это какой-то функан:

$$F_{\xi_1+\xi_2}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} F_{\xi_1}(x-y)dF_{\xi_2}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} F_{\xi_2}(x-y)dF_{\xi_1}(y).$$

§7. Сходимость случайных величин

7.1. Виды сходимости

В этом разделе мы введем вагон непонятных определений, а потом постараемся запутаться еще больше, доказывая, какая сходимость круче, и ковыряясь в контрпримерах. Но для начала вспомним наших старых знакомых: измеримое пространство (Ω, \mathcal{A}) , вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ и случайную величину $\xi \colon \Omega \to \mathbb{R}$, которая обладает свойством

$$\forall B \in \mathscr{B} \quad \xi^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \colon \xi(\omega) \in B\} \in \mathcal{A}.$$

Пусть теперь $\xi, \xi_1, \xi_2, \ldots$ — случайные величины на (Ω, A) .

Определение 7.1. Последовательность случайных величин $\{\xi_n\}$ *сходится* к случайной величине ξ *почти наверное (с вероятностью 1)*, если вероятность множества тех элементарных событий, где она не сходится, равно нулю.

$$\{\xi_n\} \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi$$
, если $\mathbb{P}(\{\omega \colon \xi_n(\omega) \nrightarrow \xi\}) = 0$.

Пример. Пусть ξ_n принимает значение n в рациональных точках числовой прямой и 0- в иррациональных. Тогда $\{\xi_n\} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$, так как мера множества рациональных чисел, где случайная величина расходится, — ноль.

Определение 7.2. Последовательность случайных величин $\{\xi_n\}$ *сходится* к случайной величине ξ *в среднем порядка* r, если r-ый момент их разности сходится к нулю.

$$\{\xi_n\} \xrightarrow{(r)} \xi$$
, если $\mathbb{E}(\xi_n - \xi)^r \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$.

Пример. Возьмем в качестве множества Ω окружность длины 1, событиями будут борелевские множества, а вероятность введем как меру Лебега. События A_n введем таким образом: A_1 — дуга длины 1/2, отложенная от какой-то точки против часовой стрелки. A_n — дуга длины $\frac{1}{n+1}$, отложенная против часовой стрелки от конца дуги A_{n-1} . Введем случайную величину: $\xi_n(\omega) = \mathbb{1}(\omega \in A_n)$ Покажем, что $\{\xi_n\}$ сходится к 0 в среднем любого положительного порядка.

$$\mathbb{E}(\xi_n - \xi)^r = \mathbb{E}\xi_n^r = \mathbb{E}\left(\mathbb{1}(\omega \in A_n)\right)^r = \mathbb{P}(A_n) = 1/n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Утверждение 7.3. Из сходимости в среднем, вообще говоря, не следует сходимость почти наверное.

Доказательство. В рассмотренном выше примере $\xi_n(\omega)$ не сходится ни в одной точке окружности. Действительно, так как ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, то для любой точки ω на окружности мы можем указать бесконечное число номеров n_k , таких что $\omega \in A_{n_k}$.

Утверждение 7.4. Из сходимости почти наверное, вообще говоря, не следует сходимость в среднем.

Доказательство. Рассмотрим отрезок [0,1], с событиями, являющимися борелевскими множествами и вероятностью, введенной как мера Лебега. Положим $\xi_n(\omega) = e^n \mathbb{1}(\omega \in [0,1/n])$. Тогда $\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$, но при этом $\forall r>0$ $\mathbb{E}\xi_n^r = e^{np}\mathbb{E}\mathbb{1}(\omega \in [0,1/n]) = e^{np}/n$, а эта величина стремится к бесконечности, значит, сходимости в среднем нет.

Введем еще один вид сходимости.

Определение 7.5. Последовательность случайных величин $\{\xi_n\}$ *сходится* к случайной величине ξ *по вероятности*, если для любого сколь угодно малого положительного ε вероятность таких событий, что модуль разности ξ_n и ξ больше ε , стремится к 0.

$$\{\xi_n\} \xrightarrow{\mathbb{P}} \xi$$
, если $\forall \varepsilon > 0$ $\mathbb{P}(\{\omega \colon |\xi_n(\omega) - \xi(\omega)| > \varepsilon\}) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$.

ЧО?! ЧЁ **ЭТО ТАКОЕ?!** На этом моменте может немного поплавиться мозг в попытках понять, чем сходимость по вероятности отличается от сходимости с вероятностью 1. Действительно, и там и там мы говорим, что вероятность тех событий, на которых случайная величина не сходится, равна нулю. Но разница в том, что в случае сходимости почти наверное мы сначала устремляем n к бесконечности, а потом считаем вероятность, событий, когда не сходится, а в случае сходимости по вероятности мы сначала посчитали вероятность для какого-то фиксированного n, а потом устремились к бесконечности.

Пример. Докажем, что та жуткая последовательность случайных величин на окружности сходится по вероятности к нулю. Действительно,

$$\mathbb{P}(\{\omega \colon |\xi_n(\omega) - 0| > \varepsilon\}) = \mathbb{P}(\{\omega \colon \xi_n(\omega) > \varepsilon\}) = \mathbb{P}(\{\omega \colon \xi_n(\omega) = 1\}) = 1/n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Утверждение 7.6. Только что рассмотренным примером мы доказали, что из сходимости по вероятности, вообще говоря, не следует сходимость почти наверное.

Утверждение 7.7. Из сходимости по вероятности, вообще говоря, не следует сходимость в среднем.

Доказательство. Для доказательства воспользуемся примером про отрезок. Докажем, что $\{\xi_n\} \stackrel{\mathbb{P}}{\to} 0$. Действительно, $\mathbb{P}\{\omega \colon \xi_n(\omega) > \varepsilon\} = 1/n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$. Отсутствие сходимости в среднем мы уже доказали.

Теорема 7.8. Из сходимости почти наверное следует сходимость по вероятности.

Доказательство. Сначала докажем, что
$$\{\xi_n\} \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi \iff \mathbb{P}\left(\sup_{k\geqslant n} |\xi_k - \xi| \geqslant \varepsilon\right) \to 0$$
. Положим $A_n^{\varepsilon} = \{\omega \colon |\xi_n - \xi| \geqslant \varepsilon\}$, $A^{\varepsilon} = \overline{\lim} \, A_n^{\varepsilon} \equiv \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k\geqslant n} A_k^{\varepsilon}$. Тогда:

$$\mathbb{P}\left(\left\{\omega\colon\xi_n(\omega)\not\to\xi\right\}\right)=0\quad\Leftrightarrow\quad\mathbb{P}\left(\bigcup_{\varepsilon>0}A^\varepsilon\right)=0\quad\Leftrightarrow\quad\mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}A^{1/m}\right)=0\quad\Leftrightarrow.$$

$$\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(A^{1/m}) = 0, m \geqslant 1 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(A^{\varepsilon}) = 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k^{\varepsilon}\right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}$$

$$\Leftrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\sup_{k\geqslant n}|\xi_k-\xi|\geqslant\varepsilon\right)\xrightarrow[n\to\infty]{}0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(|\xi_k-\xi|\geqslant\varepsilon\right)\to 0.$$

А последнее утверждение — это определение сходимости по вероятности.

ЧО?! ЧЁ **ЭТО ТАКОЕ?!** Совершенно жуткое доказательство, понимается методом вглядывания: если достаточно долго медитировать над каждой импликацией, то все переходы в конце концов станут понятными.

Теорема 7.9. Из сходимости в среднем следует сходимость по вероятности.

Доказательство. Утверждение теоремы практически сразу же следует из обобщенного неравенства Чебышева:

$$\mathbb{P}\left(|\xi_n - \xi| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{\mathbb{E}|\xi_n - \xi|^r}{\varepsilon^r}.$$

Переходя в неравенстве к пределу при $n \to \infty$, получаем требуемое.

Определение 7.10. Последовательность случайных величин $\{\xi_n\}$ *слабо сходится* к случайной величине ξ , если для любой непрерывной и ограниченной функции последовательность мат. ожиданий функций от ξ_n сходится к мат. ожиданию функции от ξ .

$$\{\xi_n\} \xrightarrow{w} \xi$$
, если $\forall f(x) \colon f(x) \in C$ и $|f(x)| \leqslant M$ $\mathbb{E}f(\xi_n) \to \mathbb{E}f(\xi)$.

Утверждение 7.11. Из сходимости по вероятности следует слабая сходимость.

Доказательство. Пусть $f(x)\colon |f(x)|\leqslant M.$ Также $\forall \varepsilon>0$ выберем N так, чтобы $\mathbb{P}|\xi|>N\leqslant \frac{\varepsilon}{4M}.$ Выберем δ так, чтобы $\forall |x|\leqslant N$ и $|x-y|\leqslant \delta$ было выполнено неравенство $|f(x)-f(y)|\leqslant \varepsilon/2.$ Тогда:


$$\mathbb{E}|f(\xi_n) - f(\xi)| = \mathbb{E}(|f(\xi_n) - f(\xi)|; |\xi_n - \xi| \leq \delta; |\xi| \leq N) + \\ \mathbb{E}(|f(\xi_n) - f(\xi)|; |\xi_n - \xi| \leq \delta; |\xi| > N) + \mathbb{E}(|f(\xi_n) - f(\xi)|; |\xi_n - \xi| > \delta)) \leq \\ \varepsilon/2 + \varepsilon/2 + 2M * \mathbb{P}(|\xi_n - \xi| > \delta) = \varepsilon + \mathbb{P}(|\xi_n - \xi| > \delta).$$

Но из сходимости по вероятности следует, что $\mathbb{P}(|\xi_n-\xi|>\delta)\to 0$, значит при $n\to\infty$ $\mathbb{P}(|\xi_n-\xi|>\delta)<\varepsilon$, тогда $\mathbb{E}|f(\xi_n)-f(\xi)|<2\varepsilon$, откуда в силу произвольного выбора ε и в силу того, что модуль числа не превосходит самого числа, получаем требуемое.

Определение 7.12. Последовательность случайных величин $\{\xi_n\}$ *сходится* к случайной величине ξ *по распределению*, если функции распределения $\{\xi_n\}$ сходятся к функции распределения ξ во всех точках, в которых предельная функция распределения непрерывна.

$$\{\xi_n\} \xrightarrow{d} \xi$$
, если $F_{\xi_n}(x) \to F_{\xi} \quad \forall x \colon F_{\xi}(x) \in C(x)$.

Пример. Пусть $\{\xi_n\}$ принимает значения 0 и $1-\frac{1}{n}$ с вероятностями $\frac{1}{2}$. Тогда функция распределения для случайной величины ξ_i выглядит так (Рис. 7.1):






Рис. 3: Функция распределения ξ_n при n=4

Рис. 4: Предельная функция




Рис. 5: Функция распределения ξ

Тогда предельная функция будет выглядеть так (Рис. 7.1). Заметим, что она вообще не является функцией распределения, так как в точке 1 нарушено условие непрерывности слева. Тогда рассмотрим случайную величину ξ , принимающую значение 0 и 1 с вероятностями 1/2, тогда ее функция распределения имеет вид (Рис. 7.1). Заметим,

что предельная функция и функция распределения ξ различаются только в точке 1, в которой $F_{\xi}(x)$ не является непрерывной, значит $\{\xi_n\} \stackrel{d}{\to} \xi$.

Утверждение 7.13. Сходимость по распределению эквивалентна слабой сходимости.

Утверждение 7.14. Если последовательность случайных величин $\{\xi_n\}$ сходится по распределению к вырожденной случайной величине $\xi \stackrel{\text{п.н.}}{\equiv} a$, то $\{\xi_n\}$ сходится к ξ по вероятности.

Доказательство. No.

А теперь докажем теорему, ради которой мы и городили все эти огороды сходимостей. Эта теорема впоследствии будет использоваться при доказательстве центральной предельной теоремы.


Теорема 7.15 (теорема Леви о непрерывности). 1. Пусть $\{\xi_n\} \stackrel{d}{\to} \xi$ и $f_n(t) := \mathbb{E}e^{it\xi_n}$. Тогда $\{f_n(t)\} \to f(t)$, где $f(t) = \mathbb{E}e^{it\xi}$.

2. Пусть теперь $f_n(t) := \mathbb{E} e^{it\xi_n}$. Тогда если $f_n(t) \to f(t) \ \ \, \forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) \in C(0)$, то f(t) является характеристической функцией некоторой случайной величины ξ , такой что $\{\xi_n\} \xrightarrow{d} \xi$.

Доказательство.

- 1. Как было показано выше, сходимость по распределению эквивалентна слабой сходимости. Положим в определении слабой сходимость функции $\varphi(x):=Re(e^{itx})$ и $\psi(x):=Im(e^{itx})$, тогда $\mathbb{E}\varphi(\xi_n)\to\mathbb{E}\varphi(\xi)$ и $\mathbb{E}\psi(\xi_n)\to\mathbb{E}\psi(\xi)$, откуда следует утверждение теоремы.
- 2. Ребята, не стоит вскрывать эту тему...

ЧО?! ЧЁ ЭТО ТАКОЕ?! А вот картинка, на которой схематично показано, что из чего следует.



7.2. Закон больших чисел

В этой части рассмотрим закон больших чисел. Причем сначала скажем, как он формулируется, а потом подсказываем его для различных исходных данных.

Определение 7.16. Пусть $\{\xi_n\}$ — последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, а $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_n$. Говорят, что $\{\xi_n\}$ удовлетворяет закону больших чисел (ЗБЧ), если $\frac{S_n}{n} \stackrel{\mathbb{P}}{\to} \mathbb{E}\xi_i$.

Пример. Пусть ξ_k независимы и равномерно распределены на отрезке [-1,1]. Тогда матожидание каждого слагаемого равно 0. Тогда

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{\mathbb{D}S_n}{\varepsilon^2} = \frac{\mathbb{D}\xi_1}{n\varepsilon^2} \to 0.$$

То есть $\frac{S_n}{n}$ сходится по вероятности к своему матожиданию, значит для данной последовательности случайных величин выполнен ЗБЧ.

Теорема 7.17 (ЗБЧ в форме Хинчина). Если $\{\xi_k\}$ — независимые одинаково распределенные случайные величины с конечным матождиданием, то для них выполнен ЗБЧ.

Доказательство. Первое желание, которое может возникнуть при виде данной теоремы— записать неравенство Чебышева, но для неравенства Чебышева нужно не только конечное матожидание, но и конечный второй момент, поэтому так не прокатит. Тогда мы воспользуемся тем, что если последовательность случайных величин сходится к числу, то сходимость по вероятности эквивалентна сходимости по распределению, и воспользуемся теоремой Леви о непрерывности.

$$f(t) := \mathbb{E}e^{it\xi_k} \quad \forall k = \overline{1 \dots n}.$$

Здесь нам не важно, для какой случайной величины считать харфункцию или матожидание, так как они все одинаково распределены.

$$f_n(t) := \mathbb{E}e^{it\frac{S_n}{n}} = \mathbb{E}e^{it\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}} = \prod_{k=1}^n \mathbb{E}e^{\frac{it\xi_k}{n}} = f^n\left(\frac{t}{n}\right).$$

Далее вспомним важной свойство харфункции: $a:=f'(0)=\mathbb{E}\xi_k$. Тогда:

$$f^n\left(\frac{t}{n}\right) = \left(1 + \frac{ita}{n} + \overline{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow[n \to \infty]{} e^{ita}.$$

Заметим, что e^{ita} непрерывна на всей действительной прямой и обращается в 1 при t=0. Значит по теореме о непрерывности e^{ita} представляет собой харфункцию некоторой случайной величины, к которой сходится по распределению

 $\frac{S_n}{n}$. Действительно, эта случайная величина $\xi \stackrel{\text{п.н.}}{\equiv} a$. Таким образом, имеем, что $\frac{s_n}{n} \stackrel{w}{\to} \mathbb{E} \xi_k$, но если предельная случайная величина вырождена, то сходимость по распределению эквивалентна сходимости по вероятности, значит $\frac{s_n}{n} \stackrel{\mathbb{P}}{\to} \mathbb{E} \xi_k$.

Лулзов ради закинем еще парочку ЗБЧ.

Теорема 7.18 (ЗБЧ в форме Чебышева). Пусть $\{\xi_k\}$ — последовательность некоррелированных случайных величин с равномерно ограниченной дисперсией. То есть $\sup_{k\in\mathbb{N}}\mathbb{D}\xi_k\leqslant C<\infty$. Тогда для данной последовательности случайных величин выполнен ЗБЧ.

Доказательство. Последовательно воспользуемся неравенством Чебышева, некоррелированостью случайных величин (а значит дисперсия суммы равна сумме дисперсий) и равномерной ограниченностью дисперсий.

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}\xi_k\right| \geqslant \varepsilon\right) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n}\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{\mathbb{D}S_n}{(n\varepsilon)^2} = \frac{1}{n^2\varepsilon^2} \sum_{k=1}^n \mathbb{D}\xi_k \leqslant \frac{C}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$

Замечание Условия теоремы можно ослабить: вместо некоррелированности потребовать, чтобы сумма ковариаций обращалась в 0, а вместо равномерной ограниченности константой можно потребовать, чтобы дисперсии росли строго медленнее, чем линейная функция.

Теорема 7.19 (Усиленный ЗБЧ (УЗБЧ) в форме Колмогорова). Если $\{\xi_k\}$ — независимые одинаково распределенные случайные величины с конечным матождиданием, то $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}\xi_k$.

Замечание Условия те же, что и на ЗБЧ в форме Хинчина, но сходимость уже не по вероятности, а почти наверное.

Доказательство. Все верно. Отвечаю.

ЧО?! ЧЁ **ЭТО ТАКОЕ?!** Собственно, а к чему будут сходиться средние арифметические, если нет матожидания?

Пример. Распределим $\{\xi_k\}$ по Коши с параметрами $C(0,\gamma)$ и посмотрим, что будет происходить со средними арифмитическими.

$$p_{\xi_k}(x) = \frac{1}{\pi \gamma \left(1 + \left(\frac{x}{\gamma}\right)^2\right)}, \quad f(t) := \mathbb{E}e^{it\xi_k} = e^{-\gamma|t|}.$$

$$f_n(t) := \mathbb{E}S_n = \mathbb{E}e^{it\sum_{k=1}^n \xi_k} = \prod_{k=1}^n \mathbb{E}e^{it\xi_k} = f^n(t) = e^{-\gamma n|t|} \implies p_{S_n}(t) = \frac{1}{\pi n\gamma \left(1 + \left(\frac{x}{n\gamma}\right)^2\right)}.$$

Теперь предположим, что последовательность $\{S_n\}$ сходится по вероятности к чему-то, и придем к противоречию. Пусть $\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n}-a\right|\geqslant \varepsilon\right)\to 0$. Тогда:

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - a\right| \geqslant \varepsilon\right) = \int_{n(a+\varepsilon)}^{+\infty} p(x)dx + \int_{-\infty}^{n(a-\varepsilon)} p(x)dx = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x}{\gamma n}\right)\Big|_{n(a+\varepsilon)}^{+\infty} + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x}{\gamma n}\right)\Big|_{-\infty}^{n(a-\varepsilon)} = \frac{1}{\pi} \left(\arctan\left(\frac{a-\varepsilon}{\gamma}\right) - \arctan\left(\frac{a+\varepsilon}{\gamma}\right)\right) \xrightarrow{p \to \infty} 0.$$

Таким образом, последовательность средних арифметических случайных величин, распределенных по Коши, не сходится по вероятности вообще ни к чему.

7.3. Центральная предельная теорема

С места в карьер:

Определение 7.20. Последовательность случайных величин $\{\xi_k\}$ удовлетворяет $U\Pi T$, если $\exists \{a_k\} \in \mathbb{R}, \{b_k\} > 0$, такие что

$$\frac{S_k - a_k}{b_k} \xrightarrow{d} \xi \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Разомнемся на чем-нибудь попроще.

Теорема 7.21. Пусть $\{\xi_k\}$ — норсв с конечным матожиданием и конечной ненулевой дисперсией. Тогда $\{\xi_k\}$ удовлетворяет ЦПТ, причем $a_n=\mathbb{E} S_n$, а $b_n=\sqrt{\mathbb{D} S_n}$, где $S_n=\sum\limits_{k=1}^n \xi_k$.

Замечание Здесь распределение $\frac{S_k - \mathbb{E} \xi_k}{\sqrt{\mathbb{D} \xi_k}}$ сходится к стандартному нормальному не абы как, а очень даже равномерно по x на всей действительной прямой.

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $\mathbb{E}\xi_k=0$ и $\mathbb{D}\xi_k=1$. Тогда

$$f(t):=\mathbb{E}e^{it\xi_k}=1+ita^{{m r}^0}-rac{t^2}{2}+\overline{o}\left(rac{1}{n}
ight).$$

$$f_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = \mathbb{E}e^{it\frac{S_n}{\sqrt{n}}} = \left(f\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + \overline{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow[n \to \infty]{} e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

Таким образом, харфункция центрированной нормированной случайной величины сходится слабо к харфункции стандартного нормального распределения, а значит, центрированная нормированная случайная величина сходится по распределению к $\mathcal{N}(0,1)$.

Зочем? Если вам уже стало плохо, то переживать не стоит — дальше будет еще хуже С этого момента положим:

- Случайные величины $\{\xi_k\}$ независимы и определены на одном вероятностном пространстве.
- $F_k(x) = \mathbb{P}(\xi_k < x)$.
- $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$.
- $a_k = \mathbb{E}\xi_k$, $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$.
- $b_k^2 = \mathbb{D}\xi_k$, $B_n^2 = \sum_{k=1}^n b_k^2$.

Теорема 7.22 (Ляпунова). Пусть $\mu_k^3 := \mathbb{E} \left| \xi_k - a_k \right|^3 < \infty, \quad M_n^3 := \sum_{k=1}^n \mu_k^3$. Пусть выполнено *условие Ляпунова*:

$$\frac{M_n^3}{B_n^3} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0 \tag{7.1}$$

Тогда $\{\xi_k\}$ удовлетворяет ЦПТ.

Теорема 7.23 (Линдеберга). Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда если $a_k < \infty$, $b_k < \infty$ и выполнено условие Линдеберга:

$$L_n(\varepsilon) = \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x-a_k| > \varepsilon B_n} (x - a_k)^2 dF_k(x) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0, \tag{7.2}$$

То $\{\xi_k\}$ удовлетворяет ЦПТ.

Замечание Если случайные величины одинаково распределены, то условие Линдеберга эквивалентно существованию дисперсии.

Определение 7.24. $\{\xi_k\}$ удовлетворяют *условию Феллера*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \max_{1 \le k \le n} \mathbb{P}\left(\frac{|\xi_k - a_k|}{B_n}\right) > \varepsilon \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$
 (7.3)

Теорема 7.25.

$$\begin{cases} \text{ЦПТ} \\ (7.3) \end{cases} \iff (7.2).$$

Доказательство. Покажем, что из (7.2) следует (7.3).

$$\max_{1\leqslant k\leqslant n}\mathbb{P}\left(\frac{|\xi_k-a_k|}{B_n}>\varepsilon\right)\leqslant \max_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{b_k^2}{\varepsilon^2B_n^2}=\max_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{b_k^2}{\varepsilon^2\left(b_1^2+\ldots+b_n^2\right)}.$$

$$\max_{1\leqslant k\leqslant n} \mathbb{P}\left(|\xi_k - a_k| > \varepsilon B_n\right) \leqslant \sum_{k=1}^n \mathbb{P}\left(|\xi_k - a_k| > \varepsilon B_n\right) = \sum_{k=1}^n \int_{|x - a_k| > \varepsilon B_n} 1dF_k(x) = \sum_{k=1}^n \int_{|x - a_k| > \varepsilon B_n} \frac{(x - a_k)^2}{(x - a_k)^2} dF_k(x) \leqslant \frac{1}{\varepsilon^2 B_n^2} \int_{|x - a_k| > \varepsilon B_n} (x - a_k)^2 dF_k(x) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$

Таким образом, условие Линдеберга влечет за собой условие Феллера.

Теорема 7.26. Условие Ляпунова (7.1) влечет за собой условие Линдеберга (7.2).

Доказательство.

$$L_n(\varepsilon) = \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x-a_k| > \varepsilon B_n} (x-a_k)^2 dF_k(x) = \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x-a_k| > \varepsilon B_n} \frac{|x-a_k|^3}{|x-a_k|} dF_k(x) \leqslant$$

$$\leqslant \frac{1}{\varepsilon B_n^3} \sum_{k=1}^n \int_{-\infty}^{+\infty} |x-a_k|^3 dF_k(x) = \frac{M_n^3}{\varepsilon B_n^3} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$

Теорема 7.27 (Неравенство Берри—Эссена). $\sup_{x} \left| \mathbb{P} \left(\frac{S_n - A_n}{B_n} < x \right) - \Phi(x) \right| \leqslant C \frac{M_n^3}{B_n^3}.$

Если случайные величины одинаково распределены, то правую часть можно переписать так:

$$C\frac{M_n^3}{B_n^3} = C_0 \frac{n\mu_k^3}{n^{3/2}b_k^3} = C_0 \frac{\mu_k^3}{b_k^3 \sqrt{n}}.$$

Константу C_0 уточняли, уточняли и в конце концов доуточнялись до $C_0 \geqslant \frac{\sqrt{10}+3}{6\sqrt{2\pi}}$. А потом доказали, что здесь вообще стоит строгое равенство.

Список литературы

- [1] Королев В. Ю. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2006. с. 160.
- [2] Гусев Н. А. Заметки к курсу: мера и интеграл Лебега. 2019. https://www.ngusev.ru/mt/mt-lectures.pdf.