

# Theorieheft


Bjarne Axmann

19. Dezember 2023

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 GRT</b>	<b>1</b>
1.1 Eintragen einer Funktion . . . . .	1
1.2 Anpassen des Fensterbereiches des Graphen . . . . .	1
1.3 Komplett Reset . . . . .	2
1.4 Einsetzen von Werten in eine Funktion . . . . .	2
1.5 Schnittpunkt ermitteln . . . . .	3
<b>2 Trigonometrie</b>	<b>4</b>
2.1 Geometrische Trigonometrie . . . . .	4
2.2 Berechnung der Seiten und des Winkels . . . . .	5
2.3 Trigonometrische Funktionen . . . . .	6
2.4 Überleitung zu trigonometrische Funktionen . . . . .	7
2.5 Normalform einer trigonometrischen Funktion . . . . .	7
2.6 Moddelierung der Sinus Funktion . . . . .	8
<b>3 Exponentialfunktionen</b>	<b>9</b>
3.1 Normalform . . . . .	9
3.1.1 Faktor $a$ - Startwert . . . . .	9
3.1.2 Basis $b$ - Wachstumsfaktor . . . . .	10
3.2 Prozentuale Zunahme . . . . .	11
3.3 Prozentuale Zunahme/Abnahme algorithmisch bestimmen . .	12

# GTR Anleitung



# 1 GRT

## 1.1 Eintragen einer Funktion

Mit dem Grafiktaschenrechner kann man sich die Graphen verschiedener Funktionen anzeigen lassen. Dazu geht man zuerst auf und trägt dort unter  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ , die gewünschten Funktionen ein. Funktionen, die gezeichnet werden sollen, müssen ausgewählt werden, indem auf das Gleichheitszeichen gedrückt wird und dieses schwarz hinterlegt bleibt.

```
NORMAL FIX3 AUTO REELL BOGENH MP  
BERECHNEN  
1:Wert  
2:Null  
3:minimum  
4:maximum  
5:Schnittpunkt  
6:dy/dx  
7: $\int f(x)dx$ 
```

## 1.2 Anpassen des Fensterbereiches des Graphen

Um das Window anzupassen, in dem der Graphen dargestellt wird, muss man zuerst **2nd** und **window** drücken. Anschließend unterscheidet man zwischen den Werten.

**Xmin** Dieser Wert bezeichnet den mindest Wert auf der X-Achse, der zu sehen sein wird

```
NORMAL FIX3 AUTO REELL BOGENH MP  
FENSTER  
Xmin=-10  
Xmax=10  
Xscl=1  
Ymin=-10  
Ymax=10  
Yscl=1  
Xres=1  
 $\Delta X=0.075757575757576$   
SpurSchritt=0.1515151515...
```

**Xmax** Dieser Wert bezeichnet den maximalen Wert, der auf der X-Achse zu sehen sein wird.

**Xscl** Dieser Wert bezeichnet die Schrittänge auf der X-Achse

**Ymin** Dieser Wert bezeichnet den minimal zu sehenden Y-Wert auf der Y-Achse

**Ymax** Dieser Wert bezeichnet den maximalen zu sehenden Y-Wert auf der Y-Achse

**Yscl** Dieser Wert bezeichnet die Schrittänge auf der Y-Achse

Beim dem Angeben der Werte ist darauf zu achten, dass jegliche negativen Werte nicht mit dem Rechenminus, sonder mit dem Vorzeichenminus angegeben werden. Wurde der Window Bereich eingestellt, kann man im Anschluss mit der Taste **graph** zu der Ansicht des Koordinatensystems wechseln. Ist der Graph nicht zu sehen, kann man auch über **zoom** und anschließend **zoomStandart** sich wieder die ursprüngliche Einstellung herstellen.

### 1.3 Komplett Reset

Sollte der Fall eines Fehlers auftreten, so ist das maximalinvasivste ein Reset des Taschenrechners, welcher durch die Tagenfolge **2nd** und **+**. Anschließend wählt man **reset** aus.



### 1.4 Einsetzen von Werten in eine Funktion

Mit den Tasten **2nd** und **trace** lässt sich das Menü zum Berechnen von verschiedenen Funktionsberechnungen aufrufen. Wählt man nun hier 1 , so kann man einen Wert in eine Funktion einsetzen für die Variable  $x$ . Die Dokumentation erfolgt hierbei wie folgt:




$$value(y_1, Wert) \rightarrow y = Wert$$

## 1.5 Schnittpunkt ermitteln

Mit den Tasten **2nd** und **trace** lässt sich das Menü zum berechnen von verschiedenen Funktionsberechnungen aufrufen. Wählt man 5, so kann man den Schnittpunkt von zwei Funktionen berechnen lassen. Hierfür muss man im ersten Schritt die erste Funktion auswählen und anschließend die zweiten und den ungefähren Schnittpunkt der beiden Funktionen.


$$\text{intersect}(y_1, y_2) \rightarrow x = y =$$



## 2 Trigonometrie

### 2.1 Geometrische Trigonometrie

Das Thema Trigonometrie in der Geometrie umfasst eine Reihe an verschiedenen Unterthemen. Hierbei spielt das rechtwinkelige Dreieck eine wesentliche Rolle und bestimmt somit auch die Wurzeln der Trigonometrie. Bei der geometrischen Trigonometrie geht es vorwiegend um das Bestimmen von Seitenlängen oder Winkeln.



**A, B, C** Die Ecken eines rechtwinkeligen Dreiecks sind mit großen Buchstaben gekennzeichnet

**a,b,c** Die gegenüberliegenden Seiten sind mit dem jeweils gleichen Buchstab in klein gekennzeichnet Stellen jeweils die Winkel zwischen den anliegenden Seiten dar und ergeben zusammen 180 Grad. Die Gegenkathete stellt die Höhe des Dreiecks dar, während die Ankathete die Seite ist, die am rechten Winkel und anliegt

**Hypotenuse** Die Hypotenuse stellt im Dreieck die Seite  $b$  dar. Sie ist die längste Seite und immer gegenüber von rechten Winkel, wobei sie nie an ihm anliegt.

**Ankathete** Die Ankathete ist die Seite  $c$  in einem Dreieck und liegt immer am rechten Winkel an. Sie bildet mit der Gegenkathete den rechten Winkel und ist hierbei immer kürzer als die Hypotenuse

**Gegenkathete** Die Gegenkathete beschreibt in einem Dreieck die Seite  $a$  und liegt direkt an dem rechten Winkel, den sie mit der Ankathete bildet.

## 2.2 Berechnung der Seiten und des Winkels

Um eine Berechnung der Seiten durchführen zu können, muss verwendet man folgende Formeln:

**Sinus**

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$$


**Cosinus**

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$$

**Tangens**


$$\tan(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$

Um einen ersten Anhaltspunkt zu schaffen, kann man sich an dem folgenden Algorythmus orientieren.



## 2.3 Trigonometrische Funktionen

Auch in der Analyses spielt die Trigonometrie einen wichtige Rolle. Sie ermöglicht es periodische Prozesse darzustellen und mit ihnen zu rechnen. So lassen sich Sinus, Cosinus und Tangens jeweils im Koordinatensystem herleiten am Einheitskreis.



So stellt Sinus die Höhe der Gegenkathete in Abhängigkeit von dem Bogenmass, welches mit Hilfe des Winkels Alpha berechnet wird. Cosinus hingegen stellt die Ankathete in Abhängigkeit des Bogenmasses dar. Hierbei orientieren sich die Eckpunkt jeweils an dem Einheitskreis und laufen auf diesem gegen den Uhrzeigersinn. Hierdurch entsteht die wellenförmige Ausprägung des Graphen. Da Sinus die Höhe der Gegenkathete darstellt in Abhängigkeit von dem Bogenmass befindet sich die dargestellte Höhe der Gegenkathete auf einer Höhe von  $\pi$  auf der X-Achse.

**Begründung der Periodenlänge** Durch den Einheitskreis wird die Periodenlänge bestimmt, da das Bogenmass auf der X-Achse dargestellt wird. So ist eine halbe Umrundung des Kreises genau ein  $\pi$  lang.

## 2.4 Überleitung zu trigonometrische Funktionen

Aufgrund der Veränderung der verschiedenen Seitenlängen des rechtwinkeligen Dreiecks, welche durch die jeweilige trigonometrische Funktion dargestellt wird und abhängt von dem Winkel  $\alpha$  ist, entsteht die pregnante Form von Sinus und Cosinus.

## 2.5 Normalform einer trigonometrischen Funktion

Ähnlich wie quadratische Funktionen oder lineare Funktionen gibt es ebenfalls einen Normalform der Sinus Funktion.

$$a \cdot \sin(b(x + d)) + e$$

a: Streckfaktor auf der X-Achse(Amplitude)

b: Streckfaktor auf der Y-Achse (Periodenlänge)

d: Verschiebung auf der X-Achse


e: Verschiebung auf der Y-Achse

## 2.6 Moddelierung der Sinus Funktion

Für die Moddelierung einer Sinus oder Cosinus Funktion kann man wie folgt vorgehen.


Periode bestimmen

Schreibweise  $b : \frac{2\pi}{b}$



Amplitude bestimmen

$$a : \frac{\text{minimal Wert} - \text{maximal Wert}}{2}$$



Y-Achsenverschiebung

$$e : \frac{\text{maximal Wert} + \text{minimal Wert}}{2}$$

Einsetzen und auflösen

$$\begin{aligned} P(x_1, f(x_1)) \\ s(x) = a(\sin(b(x - d))) + e \end{aligned}$$

P in f

$$\begin{aligned} f(x_1) = a(\sin(b(x_1 - d))) + e \\ \text{Loese nach } d \end{aligned}$$

### 3 Exponentialfunktionen

Eine Exponentialfunktion stellt einen exponentiell Verlauf eines Graphen dar.

Beispiel einer Exponentialfunktion




Abbildung 1: Funktionsgraph von  $f(x) = 2^x$

#### 3.1 Normalform

Hierbei folgt einer Exponentialfunktion der folgenden Form:

$$f(x) = a \cdot b^x$$

Wobei  $b > 0 \wedge b \neq 0$  sein muss.

$a$  wird hierbei als Startwert bezeichnet. Innermathematisch spricht man von  $a$  als Streckfaktor und von  $b$  als Wachstumsfaktor.

##### 3.1.1 Faktor $a$ - Startwert

Der Koeffizient  $a$  stellt bei einer exponentiell verlaufenden Funktion den Startwert dar und zugleich auch Streckfaktor der Funktion. Er wird für jedes  $x$  immer mit der Basis  $b$  multipliziert.

**Beispiel** sei  $-0.5 \leq b \geq 2$  und  $-1 \leq a \geq 1$  für  $f(x) = ab^x$

$$\begin{array}{lll} a : -1 & a : 0 & .a : 1 \\ x : -1 & x : 0 & x : 1 \\ b : -0.5 & b : -0.5 & b : -0.5 \end{array}$$

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1) \cdot (-0.5)^{-1} & f(0) &= 0 \cdot 0.5^0 & f(1) &= 1 \cdot (-0.5)^1 \\ &= 2 & &= 0 & &= -0.5 \end{aligned}$$

### 3.1.2 Basis $b$ - Wachstumsfaktor

Die Basis  $b$  ist hierbei von großer Bedeutung, da diese mit dem  $x$  für jedes  $x$  multipliziert wird. Da bei exponentiell Verläufen schnell das Vielfache der Basis erreicht wird, braucht der Wert von  $b$  nur sehr gering sein, um eine große Auswirkung zu haben. Ebenfalls hat  $b$  eine große Auswirkung den Verlauf in Bezug auf den Schnittpunkt mit der Y-Achse.  $b$  ist hauptverantwortlich für diese, da durch  $x$  die Anzahl der Multiplikationen mit sich selbst bestimmt wird.

**Beispiel** sei  $-0.5 \leq b \geq 2$  und  $-1 \leq x \leq 2$  für  $f(x) = b^x$

$$\begin{array}{lll} x : -1 & x : 0 & x : 1 \\ b : -0.5 & b : -0.5 & b : -0.5 \\ f(-1) &= -0.5^{-1} & f(0) &= a - 0.5^0 & f(1) &= -0.5^1 \\ &= -2 & &= 1 & &= -0.5 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} x : -1 & x : 0 & x : 1 \\ b : 0 & b : 0 & b : 0 \\ f(-1) &= 0^{-1} & f(0) &= 0^0 & f(1) &= 0^1 \\ &= \infty & &= 1 & &= 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
x : -1 & x : 0 & x : 1 \\
b : 1 & b : 1 & b : 1 \\
f(-1) = 1^{-1} & f(0) = 1^0 & f(1) = 1^1 \\
= 1 & = 1 & = 1
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
x : -1 & x : 0 & x : 1 \\
b : 2 & b : 2 & b : 2 \\
f(-1) = 2^{-1} & f(0) = 2^0 & f(1) = 2^1 \\
= 0.5 & = 1 & = 2
\end{array}$$

An dem Beispiel kann man sehen, dass egal welche Zahl die Basis  $b$  annimmt es beim Einsetzen von 0 für  $x$  immer zu 1 kommt. Auffällig ist hierbei, dass setzt man für  $b : 1$  ein, so erhält man zu jedem  $x$  immer den Wert 1. Dies ist die Begründung für die Schnittstelle mit der Y-Achse bei 1, wenn  $a = 1$  ist. Setzt man nun für  $b$  einen Wert ein, der größer als 1 ist, so verändert sich etwas. Die Basis  $b$  wird für  $x$  mit sich selber multipliziert. Nimmt  $b$  nun einen Wert von 1.01 an, so wird wie folgt für  $x = 3$  gerechnet.

$$\begin{aligned}
& \underbrace{1.01}_1 \cdot \underbrace{1.01}_2 \cdot \underbrace{1.01}_3 \\
& = 1.030301
\end{aligned}$$

Die Differenz zwischen 1 und  $b$  wird vervielfacht. Alleine diese kleine Differenz reicht aus, um eine deutliche Ausprägung zu verursachen in dem Graphen von  $f(x)$ .

### 3.2 Prozentuale Zunahme

Einen exponentiellen Verlauf kann man unter anderem an einer prozentualen Veränderung erkennen. So lässt sich sagen, dass sei  $b > 1$  eine prozentuale Steigung der Differenz zwischen 1 und dem Wert, den  $b$  annimmt bestimmen. Nimmt man an, dass sei  $b = 1.01$ , so ist 0.1 gleich 1% von 1 und besitzt somit eine prozentuale Zunahme von 1%. Überträgt man diesen Sachverhalt auf eine weitere Basis, welche  $b > 1$  erfüllt, so lässt sich ebenfalls der Übertrag als prozentuale Steigung definieren.

**Beispiel** Sei  $b \in \{x : x \in \mathbb{R}, x > 1\}$

$$f(x) = 1.04^x \Rightarrow 4\%$$

So folgt aus  $b = 1.04$ , dass eine Zunahme von 4% vorliegt.

$$f(x) = 1.5^x \Rightarrow 50\%$$

So folgt aus  $b = 1.5$ , dass eine Zunahme von 50% vorliegt.

$$f(x) = 1.9^x \Rightarrow 90\%$$

So folgt aus  $b = 1.9$ , dass eine Zunahme von 90% vorliegt.

$$f(x) = 2.6^x \Rightarrow 160\%$$

So folgt aus  $b = 2.6$ , dass eine Zunahme von 160% vorliegt, da sich eine prozentuale Zunahme nur für die Differenz zwischen  $b$  und  $b = 1$  ausprägt.

$$f(x) = 0.8^x \Rightarrow 20\%$$

So folgt aus  $b = 0.8$ , dass eine Abnahme von 20% vorliegt. Zu dieser Annahme kommt man, indem man sich überlegt, dass  $b = 1 = 100\%$  sind. Hat man nun nur  $b = 0.8$  anstelle von  $b = 1$ , so ergibt sich hieraus die Verringerung von 20%

### 3.3 Prozentuale Zunahme/Abnahme algorithmisch bestimmen

Um die Berechnung der prozentualen Änderung des Graphen zu bestimmen kann man algorythmisch vorgehen.

